COMMONWEALTH MYCOLOGICAL INSTITUTE
23 OCT 1973

13
CMI
5852

BULLETIN TRIMESTRIEL
DE LA

SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DE FRANCE

•

Pour le progrès et la diffusion
des connaissances relatives
aux champignons

Reconnue d'utilité publique
par Décret du 20 Mars 1929

Tables des années 1925 à 1954
Tomes XLI à LXX

HSP
RAM
MW
S

Supplément au fascicule 4
du Tome LXX (1954)

36, rue Geoffroy-Saint-Hilaire - PARIS-Ve

MYCOLOGICAL
27 OCT 1972
10/5/73

BULLETIN TRIMESTRIEL

DE LA

SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE

DE FRANCE

•

Tables des années 1925 à 1954
Tomes XLI à LXX

36, rue Geoffroy-Saint-Hilaire - PARIS-Ve

TABLE ALPHABETIQUE DES AUTEURS

de Notes et Mémoires

publiés du Tome XLI (1925) au Tome LXX (1954)

du

BULLETIN DE LA SOCIETE MYCOLOGIQUE DE FRANCE.

ABBADIE (F.). - Voir BOIDIN (J.) et ABBADIE (F.). 1954, 353.
AGGERY (Mlle). - Voir NICOLAS (G.) et AGGERY (Mlle). 1928, 210, 215 et 301. - 1929, 295, 297. - 1930, 84. - 1934, 115. - 1938, 115. - 1939, 118. - 1951, 419. - 1954, 65.
ALEXANDRI (A.V.). - Observations critiques sur le Battarea phalloides (Dicks.) Pers. 1934, 240.
ARNAUD (G.). - Les " boucles mycéliennes " des Eumycètes et la philogénie des Urédinées. 1951, 173.
- Mycologie concrète : Genera I. 1952, 181. Genera II. 1953, 265.
- Technique microscopique élémentaire. 1954, 93.
ARNAUD (G.) et BARTHELET (J.). - Les microconidies dans le genre Sclerotinia. 1936, 63.
ARTHUR (J.C.). - Terminologie des Urédinales. 1934, 130.
ASTIS (Ed. d'). - Voir MAUBLANC (A.) et d'ASTIS (Ed.). 1938, 67.
AYMONIN (V.). - Le Clathrus cancellatus Tour. en Haute-Marne. 1927, 265.
AYMONIN (V.) et Dr CORDIER. - Note sur un cas d'empoisonnement par champignon comestible cru. 1926, 245.
AZOULAY (Dr L.). - Les empoisonnements par champignons en 1924. 1925, 407.
- Les empoisonnements par champignons en 1925. 1925, 478.

BARBIER (M.). - Agarics des environs de Dijon (pl. VII). 1927, 213.
- Suggestions. 1928, 365.
- Glanes mycologiques sur le quatrième fascicule des " Icones selectae Fungorum " de MM. Konrad et Maublanc. 1929, 249.
BARRY (J.P.). - Voir KUNHOLTZ-LORDAT (G.) et BARRY (J.P.). 1949, 121.
BARTHELET (J.). - Voir ARNAUD (G.) et BARTHELET (J.). 1936, 63.
BATAILLE (F.). - Notes sur deux Champignons. 1925, 71.
- Des variétés de Champignons à chapeau blanc. 1925, 472.
- Réactions colorées caractéristiques produites par la solution aqueuse de potasse sur Amanita virosa et sur Lactarius vellereus. 1926, 244.
- Réactions chimiques sur quelques Champignons. 1931, 106.
- Une Lépiote nouvelle : Lepiota cretini. 1931, 108.
- Caractères chimiques et propriétés médicales du lait de Lactaire poivré. 1933, 126.
- Quelques réactions chimico-fongiques. 1933, 439.
- Parenté chimique de la Russula xerampelina avec le Lactarius volemus. 1938, 253.

BATTETA (V.). - Marasmius epodius Bres. 1934, 67.
- Clavaria mairei nov. sp. 1938, 44.
BEAUSEIGNEUR (A.). - Champignons nouveaux observés dans les Landes. Ière série. Basidiomycètes (pl. XXX-XXXI). 1925, 463.
BEAUVERIE (J.). - Sur un Zygosaccharomyces de la datte isohétérogame. 1929, 153.
BECKER (G.). - Frédéric Bataille (1850-1946). 1950, 173.
BERNAUX (P.). - Contribution à l'étude de la rouille du Carthame (Puccinia carthami Corda.). 1952, 327.
- Notes de pathologie végétale méditerranéenne. 1952, 386.
BERTRAM (G.). - Cas d'empoisonnement par Amanita pantherina survenu à Héricourt-en-Caux (Seine Inférieure) le 29 août 1945. 1945, 65.
BIZETTE (Dr Ed.). - Traitement d'une intoxication fongique. 1949, 168.
BLANCHET (G.). - Voir KUNHOLTZ-LORDAT (G.) et BLANCHET (G.). 1949, 66.
BLUM (J.). - Note sur l'utilisation de la couleur des spores pour la détermination des Russules (I). 1950, 73. - (II), 1951, 86.
- Quelques espèces collectives de Russules (Première note). 1951, 163. - (Deuxième note), 1952, 224.
- Les Russules âcres à sporée jaune. 1953, 57.
- Russules rares ou nouvelles. 1953, 429.
- Sur les Russules douces à sporée jaune. 1954, 384.
BOIDIN (J.). - Sur l'existence de races interstériles chez Gloeocystidium tenue (Pat.) ; étude morphologique et comportement nucléaire de leurs cultures. 1950, 204.
BOIDIN (J.) et ABBADIE (F.). - Les levures des liqueurs tannantes végétales ; leur action sur les tanins pyrogalliques. 1954, 353.
BOURDOT (Abbé H.). - Amédée Galzin. 1925, 333.
- Hyménomycètes nouveaux ou peu connus. (Pl. XXV), 1932, 204.
BOURDOT (Abbé H.) et GALZIN (A.). - Hyménomycètes de France (Porés). 1925, 98 et 145.
BOURCEOIS (G.). - Aperçu sur la consommation des Champignons au cours des deux dernières années à Dijon. 1929, 189.
BOURSIER (J.). - Leucopaxillus nov. gen. 1925, 391.
- Voir KUHNER (R.) et BOURSIER (J.). 1929, 264. - 1932, 118.
BOURSIER (J.) et KUHNER (R.). - Notes sur le genre Inocybe. 1928, 170.
BOUSSET. - A propos de Clitocybe rivulosa Fr. et de quelques confusions possibles. 1938, 12.
- Un nouveau Basidiomycète à acide cyanhydrique. 1939, 123.
BRANDZA (M.). - Les Myxomycètes de Neamtz (Moldavie). (Pl. XIV-XVII). 1928, 249.
BREBINAUD (P.). - Contribution à la révision des Agaricinées, Clytocybe inornata Sow. 1925, 73. - (Suite). 1926, 121.
- Bolets à pores rouges et Russules rouges. 1927, 132.
- Voir CROZALS (A. de) et BREBINAUD (P.). 1927, 207.
- Armillaria constricta Fr. 1929, 304.
- Lepiota excoriata Schaeff. Ses véritables caractères et ses particularités. 1930, 78.
- Révision de quelques Hyménomycètes. 1931, 89.
BRIDE (A.) et METROD (G.). - Panaeolus teutonicus nov. sp. 1950, 106.
BRUYLANTS (Mlle J.). - Inocybe geophylla var. lateritia. (Pl. VIII). 1952, 369.
BUCHET (S.). - De la présence en France du Lycogala conicum Pers. 1933, 128.

- Fuligo megaspora Sturgis, Myxomycète nouveau pour la France. 1936, 337.
- Nouvelle récolte en France de Trichamphora pezizoides Jungh. 1939, 114.
- Contribution à la Flore mycologique de la Chine septentrionale. I, Myxomycètes récoltés par le Père Em. Lirent (1916-1935). 1939, 220.
- Les Myxomycètes pyrénéens de l'herbier Doussans. 1940, 125.
- Nouveaux matériaux pour la flore française des Myxomycètes. 1941, 54.
- Les Myxomycètes de l'herbier Le Sourd. 1943, 41.
BUCHLI (Harro). Voir HEIM (R.), BUCHLI (H.), DUCHE (J.) et LABOUREUR (P.). 1951, 331.
BUGNON (F.) et PETITBERGHIEN (A.). - Sur la présence aux environs de Dijon du Gastrosporium simplex Matt. 1949, 63.
BURET (Dr F.). - Rapport sur le traitement de l'empoisonnement phalloïdien par l'estomac et le cerveau crus de lapin d'après la méthode du professeur Limousin. 1934, 124.
BURLET (F.) et GROSCOLAS. - Observations sur la présence du Pleurotus eryngii à Saint-Jean-de-Belleville en Tarentaise (Savoie). 1925, 475.
BUTIGNOT. - Une anomalie curieuse de Cortinarius infractus (Pers.). 1932, 90.

CANTOURNET (J.). - Contribution à la flore mycologique de l'Afrique équatoriale. 1948, 166.
CARINI (C.). - L'Amanita espera est inoffensive. 1930, 213.
CEJP (Dr K.). - Sapromyces androgynus Thaxter en Europe et étude de l'espèce Sapromyces reinschii (Schroeter) Fritsch. (Pl. X et XI). 1936, 370.
- Sur les affinités des Blatocladiaceae. Révision du genre Gonapodia. Sa position systématique. 1946, 246.
CENDRIER (P.). - Sur des formes anormales de Tricholoma terreum. 1936, 377.
CHADEFAUD (M.). - Le cycle et les sporophytes des Ascomycètes. 1953, 199.
- Sur les asques de deux Dothidéales. 1954, 99.
CHALAUD (G.). - Voir NICOLAS (G.) et CHALAUD (G.). 1937, 167.
CHANDURI (H.) et SINGH (J.). - Une nouvelle maladie du Grenadier (Punica granatum). (Pl. VIII). 1934, 153.
CHAUVIN (E.). - Sur la toxicité d'Amanita verna. 1925, 87.
- Note sur un Marasme rare : Marasmius varicosus. 1925, 394.
- Amanita porphyria A. et S. est-elle vénéneuse ? 1925, 476.
- Considérations sur un empoisonnement faussement attribué à Amanita citrina. 1928, 124.
- Sur la non-toxicité d'Amanita porphyria A. et S. 1927, 298.
- Sur la prétendue toxicité d'Amanita citrina. 1926, 196.
CHAZE (J.). - Essais de culture d'une Saprolégniacée. 1925, 256.
CHOISY (M.). - Sur la morphologie des hyphes ascogènes dans le genre Lecidea (Lichens). 1927, 209.
- Sur le phylétisme des Ascomycètes du genre Cladonia (Lichens). 1927, 267.
- Réponse à Monsieur Sauger. 1928, 370.
- La morphologie du genre Cladonia, Lichen Discomycète. 1929, 184.

CHOISY (M.). - La nomenclature générique des Umbilicariaceae (Lichens Ascomycètes). 1952, 141.
- La nomenclature générique des Endocarpaceae. 1954, 162.
CODINA (J.). - Empoisonnement collectif par l'Amanita phalloides. 1928, 217.
CODINAS-VINAS. - A propos du Polyporus tunetanus Patouillard. 1925, 82.
COOK (W.R. Ivimey). - Quelques observations sur le genre Ligniera. 1928, 105.
CORDIER (Dr). - Voir AYMONIN (V.) et CORDIER (Dr). 1926, 245.
COSTANTIN (J. et DUFOUR (L.). - Note sur le Tricholoma pseudoacerbum Cost. et Duf. 1927, 117.
CROZALS (A. de). - Voir GRELET (Abbé J.) et CROZALS (A. de). 1928, 336.
CROZALS (A. de) et BREBINAUD (P.). - Contribution à la révision des Agaricinées. 1927, 207.

DARIMONT (F.), HERREGODS (M.) et IMLER (L.). - Agaricus (Tubaria) stagninus Fries et Galerina ? stagnina sensu Kühner. 1950, 31.
DAUTREY (P.). - Voir FOLEY (H.) et DAUTREY (P.). 1925, 316.
DAVY de VIRVILLE (Ad.). - Léon Dufour (1862-1942). 1942, 200.
DELECLUZE (R.). - Quelques Champignons commensaux du Chêne-liège au Maroc. 1937, 134.
DEMANGE. - A propos du Theatrum fungorum de Van Sterbeeck. 1928, 375.
DENNIS (R.W.G.). - Les Agaricales de l'Ile de la Trinité : Rhodosporae-ochrosporae. (Pl. II-IV). 1953, 145 et 350.
DERX (H.G.). - L'hétérothallie dans le genre Penicillium (note préliminaire). 1925, 375.
DOMINIK (T.) et MOROWSKI (M.). - Observations sur Ithyphallus impudicus (L.) Fr. et Ithyphallus imperialis Schulzer. 1935, 341.
DOP (P.). - Voir NICOLAS (G.) et DOP (P.). 1926, 194.
DUCHE (J.). - Voir HEIM (R.), BUCHLI (H.), DUCHE (J.) et LABOUREUR (P.). 1951, 331.
DUCOS (P.). - Sur quelques Pleospora d'Auvergne. 1937, 169.
DUFOUR (L.). - Voir COSTANTIN (J.) et DUFOUR (L.). 1927, 117.
DUFRENOY (J.). - Levures de la fermentation, en eau de mer, des Cédrats de Corse. 1927, 272.
DUMEE (P.). - Notes de mycologie pratique. 1926, 170.
- Notes sur les Tricholoma acerbum, guernisaci et militare. 1927, 263.
DUMEE (P.), JOACHIM (L.) et LECLAIR (A.). - Notes de mycologie pratique (suite). 1925, 77.
DUMEE (P.) et LECLAIR (A.). - Observations sur le Boletus pachypus Fr., candidans = albidus Roques. 1927, 205.
- - - Note sur l'Amanita ampla Pers. (excelsa) Fr. 1927, 259.
DUPAIN (V.). - Remarques sur une Amanite récoltée dans le bois de Fouilloux près La Mothe-Saint-Héray. 1928, 112.
- Variété sylvestre de Russula seperina Dupain. 1928, 115.
DUPIAS (G.). - Une Urédinée nouvelle : Puccinia milii-effusi. 1945, 61.
- Une Urédinée hétéroxine nouvelle parasite du Seigle. 1948, 180.
- Contribution à la flore urédinologique du Sud-Ouest de la France (3e note). 1951, 50.
- Etude expérimentale d'Urédinées hétéroxines (4e note). 1953, 220.

FAVRE (J.). - Voir KONRAD (P.) et FAVRE (J.). 1935, 117.
- Champignons rares ou peu connus des Hauts-marais jurassiens. 1936, 129. - 1937, 271. - 1939, 196.
- Marasmius hariolorum, espèce souvent confondue avec Marasmius confluens. 1951, 199.
- Antinoa acuum Vel. 1951, 205.
FAVRE (J.) et MAIRE (R.). - Sur un Naucoria des tourbières jurassiennes. 1937, 267.
FAVRE (J.) et SCHWEERS (A.C.S.). - Une Omphale palustre nouvelle. 1942, 105.
FENAROLI (L.). - Un nouvel hôte de l'Ustilago ischaemi Fuck. 1927, 280.
FOEX (Et.). - Notes sur quelques Erysiphacées. (Pl. XII-XXV). 1925, 417.
FOEX (Et.) et ROSELLA. - Sur une forme endoconidienne accompagnant un sclérote constitué dans un épi de blé. 1928, 349.
FOLEY (Dr H.) et DAUTREY (P.). - Sur deux cas d'empoisonnement par Entoloma lividum Fries. 1925, 316.
FRON et GAILLAT (Mlle). - Contribution à l'étude du genre Ligniera. (Pl. X). 1925, 388.

GAILLAT (Mlle). - Voir FRON et GAILLAT (Mlle). 1925, 388.
GALZIN (A.). - Voir BOURDOT (Abbé) et GALZIN (A.). 1925, 98 et 145.
GENTY (P.) et LEMOINE (J.L.). - Addition à la Flore mycologique de la Côte-d'Or. 1947, 208.
GESLIN (M.). - L'Amanita phalloides et le rat. 1950, 246.
GILBERT (E.J.). - Notules sur les Amanites (Deuxième série). (Pl. VII). 1925, 287. - (Troisième série). 1926, 257. - (Quatrième série). 1928, 155. - (Cinquième série). 1929, 129. - (Sixième série). 1930, 157.
- Bribes mycologiques (2e série). (Pl. IV). 1926, 62. - (3e série). 1928, 225. - (5e série). 1949, 34.
- Suggestions. 1927, 300.
- L'emploi des vapeurs d'iode en Mycologie. 1929, 141.
- Histoire critique du genre Pilosace. 1930, 74.
- Russula rhodella, nov.sp. (Pl. XII). 1932, 109.
- Osmologie mycologique. 1932, 241.
- Nolanea rhodoura nov. sp. (Pl. XI). 1933, 253.
- Les variations odorantes des Champignons. 1934, 25.
- Clitocybe osmophora nov. sp. 1935, 115.
- Notules sur les Bolets (Première série). 1936, 249. - (Deuxième série). 1940, 120.
- Un esprit. Une oeuvre: Hubert Bourdot (1861-1937). 1939, 137.
- Un mycologue français : Léon Joachim (1873-1945). 1946, 125.
- Essai de terminologie des organes véliformes et annuliformes des Agaricales et des Bolétales. 1947, 42.
- Une oeuvre. Un esprit : Lucien Quélet (1832-1899). 1949, 5.
- Mycenastrum corium (Guersent) Desvaux. (Pl. I et II). 1950, 101.
- Un esprit. Une oeuvre : Bulliard (Jean-Baptiste François dit Pierre) (1752-1793). (Pl. I-VI). 1952, 5.
GILBERT (E.J.) et KUHNER (R.). - Recherches sur les spores des Amanites. 1928, 149.
GILBERT (E.J.) et LECLAIR (A.). - Notules sur les Bolets (Troisième série). 1942, 170.

GINDRE (J.). - Empoisonnements par les Champignons en Franche-Comté. 1934, 134.
GIRARD (R. et Y.). - Voir HEINEMANN (P.) avec la collaboration de R. et Y. GIRARD. 1949, 41.
GRELET (Abbé L.J.). - Discomycètes nouveaux (2 fig. texte). 1925, 83. - (Deuxième série). (Pl. VIII). 1926, 203.
GRELET (Abbé L.J.) et CROZALS (A. de). - Discomycètes nouveaux. (Troisième série). (Pl. XXI). 1928, 336.
GROSCOLAS. - Présence de l'Amanita ceasarea Scop. dans l'Est de la France (département de la Haute-Saône). 1925, 406.
- Voir BURLET et GROSCOLAS. 1925, 475.
GUFFROY (Ch.). - Les Basidiomycètes de la région parisienne. 1926, 295.
- Quelques champignons d'Huelgoat et de ses bois. 1927, 293.
- Premier supplément au catalogue des Basidiomycètes de la région parisienne. 1934, 136. - (Deuxième supplément). 1940, 71.
- Glanures mycologiques, II. 1939, 159.
GUILLIERMOND (A.). - Etude cytologique et taxinomique sur les levures du genre Sporobolomyces. (Pl. X). 1927, 245.
GUYOT (A.L.). - Contribution à l'étude des Cryptogames parasites de la France septentrionale. I. (Avec la collaboration de MM. MASSENOT, J. MONTEGUT et A. SACCAS). 1946, 69.
- Contribution à l'étude des Cryptogames parasites du Sud-Est de la France (avec la collaboration de MM. M. MASSENOT et J. MONTEGUT). 1949, 37.
GUYOT (A.L.), MASSENOT (M.) et MONTEGUT (J.). - A propos de Leptosphaeria niesslana Rabh. 1948, 101.
GUYOTJEANNIN (Ch.). - L'emploi de colorants basiques pour la coloration d'ascospores de levures en culture sur lame. 1950, 41.

HEIM (R.). - Fungi brigantiani, I et III. (Pl. XXVII-XXIX). 1925, 439.
- Fungi brigantiani (Deuxième série). 1927, 59.
- Louis Mangin (1852-1937). 1938, 11.
- Histoire de Polyporus rhizomorpha Montagne. (Pl. I-II). 1941, 2.
- Louis Corbière (1850-1941). 1942, 5.
- Deux Hygrophores nouveaux du Jura. 1947, 127.
- Volvaria esculenta Massee. (Pl. I-II). 1947, 121.
- A propos de deux Amanites : Variations sur un thème connu. 1950, 5.
- Mémoire sur l'Antennopsis, ectoparasite du Termite de Saintonge. (Avec la collaboration de MM. BUCHLI (H.), DUCHE (J.) et LABOUREUR (P.).(Pl. I-IV). 1951, 331.
- Quelques Ascomycètes remarquables. I, Le genre Hypocreopsis en France. (Pl. VII). 1952, 359. - II, Le genre Ascopolyporus en Amérique centrale. (Pl. V). 1953, 417.
HEIM (R.) et REMY (L.). - Fungi brigantiani, IV. 1925, 458.
- - Fungi brigantiani. Troisième partie. (Pl. IX-X). 1932, 53.
HEIM (R.) et ROMAGNESI (H.). - Un nouvel Inocybe de la stirpe dulcamara. (Pl. VII). 1931, 250.
- - Notes systématiques sur quelques Agarics de la Flore française. (Pl. IX-XI). 1934, 162.
HEINEMANN (P.). - Un nouveau Basidiomycète à acide cyanhydrique : Cantharellus carbonarius. - Rhodopaxillus nudus en dégage-t-il ? 1939, 121.
- Observations sur les Basidiomycètes à acide cyanhy-

drique. 1942, 99.
- Emploi de la paraphénylénediamine dans la détermination des Russules. (Avec la collaboration de R. et Y. GIRARD). 1949, 41.
- Etudes sur le genre Agaricus Fr. s. stricto. 1952, 382.
HEINEMANN (P.) et JOSSERAND (M.). - Coprinus erythrocephalus et Coprinus dilectus. (Pl. III). 1941, 36.
HENRY (Dr R.). - Un nouveau Cortinaire du groupe anomalus Fr. : Cortinarius (Dermocybe) persoonii nov. sp. 1931. 1932, 325.
- Cortinarius (Telamonia) paleaceus Fr. 1933, 207.
- Un nouveau Cortinaire du groupe des Scauri : Cortinarius (Phlegmacium) dionysae nov. sp. (Pl X). 1933, 230.
- Un Cortinaire peu connu : Cortinarius (Inoloma) finitimus Weinm. (non Britzelmayr) comme forme de Cortinarius traganus Fr. 1934, 79.
- Cortinarius (Telamonia) hemetrichus Pers. 1934, 85.
- - - torvus. 1934, 226.
- - - bivelus. 1934, 234.
- Etude de deux Myxacium. I, Cortinarius mucosus Bull. ; II, Cortinarius mucifluus Fr. in Hym. Eur. 1934, 278.
- Etude de quelques Cortinaires du groupe des Scauri. Deux espèces nouvelles. (Pl. I-II). 1935, 34.
- Etude de quelques Cortinaires. 1935, 205 et 317. - 1936, 85. - 1937, 49.
- Nouvelle étude de quelques Scauri. (Pl. II). 1936, 147.
- Révision de quelques Phlegmacia appartenant au groupe des Cliduchi et des Elastici. 1936, 279.
- Description de quelques Dermocybes du groupe anomalus Fr. 1937, 143.
- Etude de trois Inolomas et de trois Hydrocybes dont deux nouveaux. 1937, 301.
- Révision des Cortinaires (suite). 1938, 29.
- Etude de quelques Telamonia. 1938, 89.
- Suite à l'étude des Myxacia. 1938, 226.
- Suite et complément à l'étude des Phlegmacia. 1939, 61 et 166.
- Les Cortinaires du groupe cinnamomeus. 1939, 284.
- Suite à l'étude du genre Hydrocybe. 1940, 85.
- Quelques Cortinaires "hinnuloïdes" (Telamonias,Hydrotelamonias et Hydrocybes hinnuloïdes). 1941, 17.
- Cortinaires nouveaux ou rares de la Flore française. 1943, 52. - 1944, 64.
- Les Cortinaires. Mise au point sur quelques espèces critiques. 1946, 204.
- De Cortinarius bivelus Fries à Cortinarius armeniacus Fries, quelques Cortinaires "privignoïdes". 1948, 33.
- Les Myxacia. 1950, 139.
- Les Scauri. 1951, 225.
HERREGODS (M.). - Voir DARIMONT (F.), HERREGODS (M.) et IMLER (L.). 1950, 31.
- Les Galera de l'Herbarium lugdunum-batavum. 1951, 140.
- La réaction à l'ammoniaque chez Conocybe tenera. 1951, 159.
- La villosité chez les Conocybes de la section capitatae (Kühner). 1952, 258.
HILLIER (L.). - Le Clitocybe gyrans Fries dans les environs de Besançon. 1926, 188.
HUIJSMAN (H.S.C.). - Cotylidia carpathica (Pilat) comb. 1954, 57.

HUMBLOT (H.). - Essai d'étude des Champignons supérieurs. 1926, 73.
- Note sur deux espèces américaines récoltées aux environs de Paris. (Pl. V). 1926, 75.

IMLER (L.). - Remarques sur les Russules adusta Fr. ex Pers. et albonigra Fr. 1928, 348.
- Crepidotus palmatus (sensu Bresadola) et Psilocybe spadicea (sensu Ricken et Konrad-Maublanc) sont identiques. 1933, 122.
- L'espèce en Mycologie. 1934, 30.
- Amanita abietum Gilbert. (Pl. VII). 1934, 111.
- Remarques sur le genre Krombholzia. Les tribulations d'un jeune mycologue à la recherche du vrai Boletus scaber. 1934, 301.
- L'Hygrophorus aureus Arrhen. n'est qu'une variété méconnue de l'Hygrophorus hypothejus Fr. (Pl. XII). 1934, 304.
- Remarques sur un Boletus queletii Schulz. à pied réticulé. 1934, 307.
- Notes mycologiques. 1935, 427.
- L'espèce et sa variété en mycologie. 1936, 300.
- Nouvelles remarques sur le genre Krombolziella R. Maire. 1938, 55.
- Coprinus boudieri Quélet croissant en fascicules sur l'écorce d'un Hêtre vivant. (Pl. II). 1938, 122.
- Notice sur les mycophages. 1938, 1.
- Notice sur les mycophiles. Coprinus micaceus et Coprinus tergiversans. 1938, 9.
- Notice pour les mycophiles. 1942, 108.
- L'ornementation des spores de Russula laurocerasi est de nature toute constructive. 1947, 89.
- L'espèce et l'individu en mycologie. 1947, 91.
- La planche mycologique. 1947, 93.
- Amanita ampla (sensu Gilbert) et les mycologues. 1948, 193.
- Nouvelles remarques sur la couleur du chapeau (cutis) des Amanites en rapport avec la propriété amyloïde de leurs spores. 1948, 50.
- Réflexions sur quelques idées de M. Romagnesi concernant la systématique des Champignons supérieurs. 1948, 200.
- Amanita pantherina f.s. abietum Gilbert. Une mise au point. 1949, 152.
- Un Tylopilus felleus extraordinaire. 1949, 183.
- Notes critiques. 1949, 185. - 1952, 263. - 1953, 130 et 248.
- Recherches sur les Bolets. (Pl. III). 1950, 177.
- Voir DARIMONT (F.), HERREGODS (M.) et IMLER (L.). 1950, 31.
- Réponse au libre propos de M. Joguet concernant "Amanita abietum". 1951, 216.
- Remarques sur les Panaeolus. 1951, 438.
- Quelques considérations sur les odeurs des Champignons. 1952, 400.
- René Maire. Souvenirs. 1953, 50.
- Une mise au point sur la conception de la variété en mycologie. 1953, 343.

JACQUIOT (C.). - Maladie de la suie du Sycomore (Acer pseudo-platanus L.). Etude anatomique du bois. 1951, 436.
JAHANDIEZ (E.) et NARDI (R.). - André de Crozals (1861-1932). 1933, 177.

JAWORSKI (J.). - Voir SIEMASZKO (W.) et JAWORSKI (J.). 1938, 245.
JOACHIM (L.). - Voir DUMEE (P.), JOACHIM (L.) et LECLAIR (A.). 1925, 77.
- Un ouvrage mycologique peu connu. 1929, 300.
- Paul Dumée (1849-1930). 1930, 151.
- Notice biographique de M. E. Dutertre (1860-1931). 1931, 228.
- Russula pseudo-violacea Joach. sp. nov. (Pl. VIII). 1931, 256.
- Notes sur quelques apports intéressants faits à l'Herbier mycologique. 1938, 19.
- Note sur quelques champignons intéressants récoltés ou reçus. 1944, 79.
JOGUET (R.). - Sur un Cortinaire critique (Cortinarius prasinus var. nov. odoratus). 1949, 180.
- Libre propos d'un amateur. 1950, 244.
- A propos de Boletus satanas. 1951, 427.
- Sur la comestibilité de quelques Bolets considérés comme suspects. 1952, 408.
- A propos de la toxicité de l'Amanita muscaria dite Amanite tue-mouches ou fausse oronge. 1953, 451.
- Sur l'odeur de l'Ithyphallus impudicus. 1954, 430.
JOSSERAND (M.). - Quelques exemples de variations chez les spores d'Agaricinées. 1927, 142.
- Projection de spores chez une Agaricacée. 1928, 208.
- A propos de Russula xerampelina Sch. et de Russula fusca Q. 1928, 343.
- Note sur Russula integra L. Fr. 1929, 278.
- Note sur deux Mycènes : Mycena flavo-alba (Fr.) Q. et Mycena floridula (Fr.) Q. (Pl. I). 1930, 38.
- Note sur Russula fusca Quél. et Russula mustelina Fr. 1930, 195.
- Sur la nature de la trame dans les genres Paxillus et Phylloporus. (Pl. XIII). 1932, 112.
- Sur la sensibilité du Lapin à l'Amanite phalloïde absorbée par les voies digestives. 1932, 336.
- Notes critiques sur quelques Champignons de la région lyonnaise (Ière série). 1933, 340. - (2e série).(Pl. VI). 1937, 175. - (3e série). (Pl. I). 1943, 5. - (4e série). 1948, 5.
- Remarques pratiques sur la constitution d'herbiers de Champignons charnus. 1934, 310.
- Voir KONRAD (P.) et JOSSERAND (M.). - 1934, 253. - 1935, 258.
- Voir KÜHNER (R.) et JOSSERAND (M.). 1934, 53. - 1944, 19.
- Description d'une Collybie exotique récoltée en France : Collybia cycadicola sp. nov. 1935, 243.
- Sur le dimorphisme des cheilocystides. 1936, 102.
- Description de Coprinus boudieri Q. 1938, 127.
- Etude sur l'ornementation sporique des Lactaires et de quelques autres espèces à spores amyloïdes. (Pl. I-XII). 1940, 7.
- Voir HEINEMANN (P.) et JOSSERAND (M.). 1941, 36.
- Etude sur quelques Coprins. Description de deux espèces nouvelles. (Pl. I et I bis). 1944, 5.
- Remarques moroses sur la notion d'espèce en mycologie. 1951, 422.
JOSSERAND (M.) et KÜHNER (R.). - Un Marasme peu connu : Marasmius

torquescens Q. 1933, 218.

KILLIAN (Ch.). - Le Cylindrosporium heraclei (Lib.) v.Höhnel, parasite du Heracleum spondylium L. (Pl. III-VI). 1925, 278.
- Caractères morphologiques et culturaux du Vermicularia eryngii (Corda) Fuckel. (Pl. I-III). 1926, 51.
- Observations sur Ustulina vulgaris Tul. cultivé en milieux artificiels. (Pl. I et II). 1927, 35.
- Le Phyllachora podagrariae (Roth) Karst., parasite de l'Aegopodium podagraria. (Pl. III et IV). 1927, 41.
- Le cycle évolutif du Fusicladium depressum Berk. et Br. et du Fusicladium aronici Sacc. (Pl.XIII à XVI). 1927, 282.
- Un parasite nouveau des feuilles d'Aronia rotundifolia Pers., le Gloeosporium aroniae n. sp. (Pl. XII et XIII). 1928, 241.
- Nouvelles contributions à l'étude biologique du genre Ramularia. Sur deux Ramularia parasites du Veronica. (Pl. XVIII et XIX). 1928, 317.
- Etude biologique du Xylaria sicula Passer.et Beltr. (Pl. I-II). 1929, 78.
- Développement et biologie du Ramularia repentis Oud. (Pl. IV et V). 1929, 145.

KILLIAN (Ch.) et LIKHITE (V.N.). - A propos d'un parasite du Cornus sanguinea L., l'Asteroma corni Desm. des auteurs. (Pl. X-XII). 1926, 116.

KILLIAN (Ch.) et WERNER (R.G.). - Observations sur l'Illosporium carneum Fries. (Pl. VIII). 1925, 382.
- - L'Ectostroma liriodendri Fr. des auteurs, maladie pseudo-cryptogamique du Liriodendron tulipifera. (Pl. VI et VII). 1928, 63.

KONRAD (P.). - Notes critiques sur quelques Champignons du Jura. (Deuxième série). 1925, 33. - (Troisième série). 1927, 145. - (Quatrième série). 1929, 35. - (Cinquième série). 1931, 129. - (Sixième série). 1936, 35.
- Voir LAGARDE (J.) et KONRAD (P.). 1927, 211.
- Les Lactaires. Notes critiques et essai de classification. 1935, 160.

KONRAD (P.) et FAVRE (J.). - Quelques champignons des Hauts-marais tourbeux du Jura. 1933, 181. - 1935, 117.

KONRAD (P.) et JOSSERAND (M.). - Notes sur la classification des Russules. 1934, 253. - 1935, 258.

KRASSILNIKOV (N.-A.). - Voir NADSON (G.A.) et KRASSILNIKOV (N.A.). 1927, 232.

KÜHNER (R.). - A propos de deux nouvelles espèces d'Agaricacées. 1926, 227.
- Notes mycologiques. 1927, 107.
- Notes sur le Lentinus variabilis Schulz. (Pl. XX). 1928, 331.
- Lactarius subalpinus nov. sp. (Pl. XXII). 1928, 379.
- Voir BOURSIER (J.) et KÜHNER (R.). 1928, 170.
- Voir GILBERT (E.) et KÜHNER (R.). 1928, 149.
- Description de quelques espèces nouvelles de Naucoria du groupe Alnicola. 1931, 237.
- Notes sur le genre Inocybe. Les Inocybes goniosporés (fin). 1933, 81.
- Voir JOSSERAND (M.) et KÜHNER (R.). 1933, 218.
- Un faux Inocybe : Inocybe whitei B. et Br. au sens de Velenovsky. 1934, 72.
- Voir MAIRE (R.) et KÜHNER (R.). 1935, 192.
- Observations sur le genre Hypholoma. 1936, 9.
- Quelques mots sur la classification des Agarics Ian-

thinosporés et Melanosporés. 1936, 31.
- Recherches sur le genre Lepiota. 1936, 177.
- Recherches morphologiques et caryologiques sur le mycélium de quelques Agaricales en culture pure. 1946, 135.
- Agaricus (Clitocybe) hirneolus Fries, champignon souvent méconnu en France aujourd'hui et la tribu nouvelle des Orcellés. 1946, 183.
- Nouvelles observations sur la culture pure des Homobasidiées et sur les particularités de leur mycélium secondaire. 1947, 133.
- Caractères mycéliens et polarité sexuelle de Galera mycenopsis. 1949, 155.
- René Maire (1878-1949). 1953, 7.
- L'amphythallie et ses causes dans la forme bisporique tétrapolaire de Clitocybe lituus Fr. 1953, 307.
KÜHNER (R.) et BOURSIER (J.). - La forme des spores chez les Agarics rhodo-goniosporés (genre Rhodophyllus Quél.). 1929, 264.
- - - Notes sur le genre Inocybe. I, Les Inocybes goniosporés (suite). 1932, 118.
KÜHNER (R.) et JOSSERAND (M.). - Description de quelques espèces du groupe Coprinus pliatilis (Curt.) Fr. 1934, 53.
- - - Etude de quatre Coprins du groupe "lagopus". 1944, 19.
KÜHNER (R.) et MAIRE (R.). - Etude de la réaction de la membrane sporique à l'iode dans les divers genres d'Agarics leucosporés. 1934, 9.
KÜHNER (R.) et ROMAGNESI (H.). - Compléments à la Flore analytique. II, Espèces nouvelles ou critiques de Lactarius. 1953, 361.
KÜHNER (R.) et YEN (H.C.). - Différences morphologiques entre plusieurs souches de Coprins de la section micacei et confrontation de leurs haplontes. 1947, 159.
- - - Les bizarreries mycéliennes de Merulius rufus Pers. (Pl. III-VI). 1947, 169 et 213.
KUNHOLTZ-LORDAT (G.). - Puccinia xanthii Schw. 1942, 192.
- - Essai de biologie des spores du diplonte chez les Urédinées. 1943, 78.
- - Sur un mode de formation des "conidies" d'Urédinées (rouille du Mahonia). 1944, 47.
- - Glanes phytopathologiques (Hyphales). 1948, 119.
KUNHOLTZ-LORDAT (G.) et BARRY (J.P.). - Quelques Micromycètes parasites intéressants du Sud de la France. 1949, 121.
KUNHOLTZ-LORDAT (G.) et BLANCHET (G.). - A propos de Puccinia laguri-chamaemoly R. Maire. 1949, 66.

LABOUREUR (P.). - Voir HEIM (R.), BUCHLI (H.), DUCHE (J.) et LABOUREUR (P.). 1951, 331.
LAGARDE (J.). - Aleuria Fuckel et Aleuria Boudier. 1925, 395.
- A propos du Peziza olivacea Quél. 1925, 398.
- et KONRAD (P.). - Une question de nomenclature : Morchella hybrida ou Morchella semilibera. 1927, 211.
LAMBIN (Mlle S.). - Louis-Charles Lutz (1871-1952). 1954, 51.
LANGERON (Dr M.). - A propos du traitement des intoxications fongiques. 1945, 14.
LECLAIR (A.). - Voir DUMEE (P.), JOACHIM (L.) et LECLAIR (A.). 1925, 77.
- Voir DUMEE (P.) et LECLAIR (A.). 1927, 205.
- Russula aquosa Leclair, nov. sp. (Pl. XXXIV). 1932, 303.
- Voir GILBERT (E.J.) et LECLAIR (A.). 1942, 170.

LE GAL (Mme M.). - Lamprospora polytrichii (Fr. ex Schum.). 1940, 39.
- Observations sur Sarcoscypha coccinea. 1941, 50.
- Contribution à l'étude des Ciliaria. 1945, 47. - 1946, 241.
- Un pseudo Discomycète : Leotia batailleana Bres. 1946, 50.
- L'abbé Louis Grelet (1870-1945). 1946, 103.
- Les Discomycètes suboperculés. 1946, 218.
- Un Bolet du groupe purpureus : Boletus lupinus sensu Bresadola non Fries, nec Auct. Gall. (Pl. II et III). 1948, 203.
- Voir ROMAGNESI (H.) et LE GAL (Mme M.). 1949, 132.
- Observations sur Boletus dupainii Boud. 1950, 96.
- Observations sur Sarcosoma orientale Pat. et Sarcoma rufum (Schw.) Rehm. 1951, 101.
- Etude critique sur les Discomycètes récoltés en Suisse au cours de la Session de 1953. 1954, 185.
LEMOINE (J.L.). - Voir GENTY (P.) et LEMOINE (J.L.). 1947, 208.
LENOBLE. - Sur un empoisonnement à symptômes phalloïdiens survenu à Lorris (Loiret) les 23-27 octobre 1943. Deux victimes, deux morts. 1943, 35.
LEPESME (P.). - Révision des Rhachomyces paléarctiques (Laboulbéniacées). (Pl. II-VI). 1942, 57.
- Une nouvelle Laboulbéniacée de France. 1942, 190.
LEPESME (P.) et TEMPERE (G.). - Description d'un Rhachomyces nouveau des Basses-Pyrénées (Laboulbéniacées). 1947, 205.
LEVESQUE (Dr R.). - Etude d'une intoxication mortelle à syndrome phalloïdien en automne 1943 dans la Drôme. 1943, 72.
LIKHITE (V.N.). - Voir KILLIAN (Ch.) et LIKHITE (V.N.). 1926, 216.
LIOU (Tchen Ngo). - Sur deux Endophyllum et un AEcidium nouveaux. 1929, 106.
- - Note sur deux Urédinées nouvelles du genre Uromyces. 1929, 121.
- - Note sur quelques Urédinées peu connues ou critiques récoltées dans le Midi, le Centre et l'Est de la France. 1929, 197.
LISTE GENERALE DES MEMBRES. - 1925, 5. - 1926, 5. - 1928, 5. - 1929, 5. - 1930, 5. - 1931, 5. - 1933, 5. - 1935, 5. - 1937, 5. - 1939, 5. - 1947, 5. - 1951, 5. - 1954, 5.
- - - (Modifications). - 1927, 5. - 1934, 5. - 1936, 5. - 1938, 5. - 1940, 5.
LOCQUIN (M.). - La disposition des micelles calloso-pectiques dans les membranes des spores de quelques Basidiomycètes. (Pl. II). 1943, 44.
- Une curieuse formation du vacuome chez Pluteus umbrosus Fr. ex Rick. 1943, 37.
- Notes sur les Lépiotes, I. (Pl. II). 1944, 38.
- Structure et développement des spores de Coprinus narcoticus. 1944, 43.
- Voir ROMAGNESI (H.) et LOCQUIN (M.). 1944, 52.
- Etudes sur le genre Coprinus. I, Quelques Coprins fimicoles. 1947, 75.
- Pierre-Ernest Pinoy (1873-1948). 1949, 93.
- Le genre Cystoderma Fayod. Etude des espèces françaises. 1951, 65.
- Mécanisme et valeur systématique des réactions à l'iode et au bleu de crésyle des parois sporiques chez les Champignons. 1951, 383.

- Première liste des espèces décrites dans le genre Lepiota sensu lato ou y ayant été placées ultérieurement. 1951, 365.
- Sur la non-validité de quelques genres d'Agaricales. 1952, 165.
- L'emploi des filtres interférentiels en mycologie. 1952, 170.
- Nouveau réactif pour l'étude des structures membranaires fines chez les Champignons. 1952, 172.
- Une nouvelle espèce de Lépiote : Leucoagaricus ianthinophaeus Locquin sp. nov. 1952, 175.
- Iconographie des Lépiotes. Listes interprétatives et synonymiques. 1952, 267.
- Les colorations et les pigments chez les Champignons supérieurs. 1953, 326.
- Recherches sur l'organisation et le développement des Agarics, des Bolets et des Clavaires. 1953, 389.

LONGUET (Dr Edg.). - Empoisonnement par l'Amanita phalloides. 1925, 94.

LUC (M.). - Structure et développement de deux Dothidéales : Systremans natans (Tode) Th. et Syd. et Bertia moriformis (Tode) de Not. 1952, 149.

LÜTZ (L.). - Sur la culture des Champignons Hyménomycètes en milieu artificiel. 1925, 310.
- Sur la spécificité de quelques Hyménomycètes épiphytes vis-à-vis de leurs supports. 1925, 345.
- Sur une prolifération des carpophores chez le Pleurotus eryngii en culture pure. 1925, 468.
- Sur l'Armillaria mellea Vahl. en culture artificielle. 1928, 326.
- Sur l'influence exercée par le support sur les caractères morphologiques du Polypore du Bouleau. Contribution à l'étude du tanin antioxygène. 1928, 328.
- Nouvelles expériences sur la spécificité des Champignons Hyménomycètes lignicoles vis-à-vis de leurs supports. Sur la spécificité du Corticium quercinum. 1929, 261.
- Les champignons du genre Xanthochrous, agents de destruction des bois sur pied ou abattus. 1933, 377.
- Sur la dégénérescence gommeuse des bois dans la nature. 1935, 348.
- Sur la conservation des mycéliums de Champignons lignicoles par les éléments du sol. 1937, 45.

MAGROU (J.). - Julien Costantin (1857-1936). 1937, 245.

MAGROU (J.) et MARNEFFE (H.). - Sur une Stilbacée nouvelle : Sphaerocybe concentrica n. g. nov. sp. et sur le déterminisme de sa sporulation. (Pl. I et II). 1945, 5.

MAHEU (J.). - La Mycologie obscuricole souterraine américaine (Caverne de City-cave, Etat de Kentucky, Etats-Unis). 1926, 130.
- Deux expertises relatives à des empoisonnements par champignons secs. 1926, 139.

MAIRE (Dr R.). - François Vincens (1880-1925). 1926, 35.
- Etudes mycologiques (Fascicule 3). 1926, 40.
- Remarques sur les causes de divergences entre les auteurs au sujet des dimensions des spores. 1926, 43.
- Diagnose de champignons inédits de l'Afrique du Nord. (Pl. I à V). 1928, 37.
- Errata à la note précédente. 1928, 380.
- Ernest-René Peltereau (1842-1928). 1929, 257.
- Sur le Tuber moltii E. Desl. 1930, 149.

- Etudes mycologiques (Fascicule 4). (Pl. X). 1930, 215.
- Sur la nocivité de l'Entoloma rhodopolium Fr. Quél. 1931, 87.
- Voir KÜHNER (R.) et MAIRE (R.). 1934, 9.
- Un nouveau Xerula. 1937, 265.
- Voir FAVRE (J.) et MAIRE (R.). 1937, 267.
MAIRE (Dr R.) et KÜHNER (R.). - Deux Agarics ochrosporés peu connus. (Pl. III). 1935, 192.
MALENÇON (G.). - Quelques espèces inédites de Discomycètes. (Pl. VI). 1927, 95.
- Lettre ouverte à M. Gilbert à propos de ses " Suggestions ". 1928, 147.
- Ustilago abstrusa sp. nov. Ustilaginée nouvelle sur Juncus. 1929, 252.
- Voir MAUBLANC (A.) et MALENCON (G.). 1930, 43.
- Considérations sur les spores des Russules et des Lactaires. (Pl. IV). 1931, 72.
- A propos de Battarrea guicciardiniana Ces. 1935, 277.
- Dodgea occidentalis Malençon, nouveau genre et nouvelle espèce de Rhizopogoneae. 1938, 193.
- Champignons rares ou nouveaux du Maroc français. (Pl. I). 1939, 34.
- Notes critiques sur quelques Hyménomycètes d'Europe et d'Afrique du Nord. (Pl. I). 1942, 14.
- Prodrome d'une flore mycologique du Moyen-Atlas. (Première contribution). 1952, 297. - (Deuxième contribution). 1954, 119.
- Le Coniodyctium chevalieri Har. et Pat., sa nature et ses affinités. 1953, 77.
MALENÇON (G.) et ROMAGNESI (H.). - Le complexe " Psathyra corrugis ss. Ricken ". (Pl. I). 1953, 101.
MANGENOT (Fr.). - Sur les Myxomycètes d'Argonne. 1949, 76.
MANGIN (L.). - N. Patouillard (1854-1926). Notice nécrologique. 1927, 8.
MARNEFFE (H.). - Voir MAGROU (J.) et MARNEFFE (H.). 1945, 5.
MARTENS (P.). - L'origine du crochet et de l'anse d'anastomose chez les Champignons supérieurs. 1932, 259.
- Les Ascomycètes à asques polyspores. 1936, 379.
MARTIN-CLAUDE (A.). - Les Champignons sur les marchés de Paris en 1928. 1929, 195.
- - Les Champignons sur le marché de Paris en 1929 et 1930. 1931, 211.
MARTIN-SANS (E.). - Les empoisonnements dans le Sud-Ouest en 1925. 1925, 492. - En 1926. 1927, 122. - En 1927. 1928, 121. - En 1928 et 1929. 1930, 91.
- - Position anormale d'une portion de l'hyménium chez deux exemplaires de Russula virescens (Sch.) Fr. 1926, 247.
- - Une localité pyrénéenne d'Amanita umbrinolutea Secr. 1928, 117.
- - Troubles gastriques après l'ingestion de Marasmius oreades. 1933, 440.
- - Anomalies chez quelques champignons. 1936, 363.
- - Panus stipticus Bull. Fr. var. pluriceps n. v. avec formes coalescentes, columnées et coralloïdes. 1938, 63.
MARTIN-SANS (E.) et MATHOU (Mlle Th.). - Note sur le Melanogaster variegatus (Vitt.) Tul. var. broomeianus (Berk.) Tul. (Pl. XXIII). 1932, 190.

MASSENOT (M.). - Voir GUYOT (A.L.), MASSENOT (M.) et MONTEGUT (J.) 1948, 101.
- Quelques récoltes d'Ustilaginales. 1953, 403.
MASSENOT (M.) et MONTEGUT (J.). - Sur deux Amanites croissant dans le parc de Grignon. 1954, 426.
MATHOU (Mlle Th.). - Voir MARTIN-SANS (E.) et MATHOU (Mlle Th.). 1932, 190.
MATIROLLO (O.). - Glanules hydnologiques françaises. 1938, 23.
MAUBLANC (A.). - A propos de l'Amanita abietum. 1951, 217.
- Paul Konrad (1877-1948). 1951, 329.
MAUBLANC (A.) et ASTIS (Ed. d'). - Tricholoma albatum Quélet. 1938, 67.
MAUBLANC (A.) et MALENÇON (G.). - Recherches sur le Battarrea guiciardidiana Ges.. (Pl. II-V). 1930, 43.
MAUBLANC (A.) et ROGER (L.). - Une nouvelle rouille du Caféier au Cameroun. 1934, 193.
- - Sur deux espèces du genre Cookeina en Afrique. 1938, 111.
MAURY (M.). - Florule cryptogamique de la Champagne crayeuse (Myxomycètes, Siphomycètes, Urédinées et Ustilaginées). 1931, 157.
- Discomycètes récoltés dans la Marne pendant les années de 1900 à 1913. 1931, 244.
MAYOR (E.). - Herborisations mycologiques dans les Monts de Lacaume (Tarn). I. 1928, 79. - II. 1931, 258. - III. 1934, 293.
- Herborisations mycologiques dans la région de Chamonix (Haute-Savoie). 1929, 171.
- Contribution à l'étude de la flore mycologique de la France. 1949, 44.
MAYOR (E.) et VIENNOT-BOURGIN (G.). - Contribution à la connaissance des Micromycètes de la Côte d'Ivoire. 1951, 113.
- - - Puccinia flahaultii Mayor et Viennot-Bourgin sp. nov. sur Geranium macrorhizum L. 1954, 432.
MELZER (V.). - A propos de la Note sur Russula paludosa. 1925, 313.
- Note sur Amanitopsis crocea Quél. 1928, 341.
- Russula helodes sp. nov. (Pl. VI). 1929, 284.
- Russula subfoetens Smith. (Pl. XXIV). 1932, 196.
- A propos de Russula subfoetens Smith. (Correction et complément). 1933, 166.
- Russula venosa Velenovsky (betulina Melzer). (Pl. IV). 1934, 64.
- Contribution à l'étude microscopique des Russules. 1934, 218.
- Contribution à l'étude des spores dans les genres Russula et Lactarius. 1951, 99.
MELZER (V.) et ZVARA (Y.). - Russula xerampelina. (Pl. XI et XII). 1927, 275.
- - Ceské holubinky (Russulae Bohemiae). 1928, 135.
- - Russula sardonia Fr. (Pl. VIII). 1928, 190.
- - A propos de Russula adusta Pers. et de Russula albonigra Krkz. 1929, 287.
METROD (G.). - Coloration par l'iode des spores des Lépiotes. 1932, 324.
- Les coupes microscopiques. 1937, 47.
- Stropharia ferrii Bresadola. 1937, 237.
- Coprinus funariarum nov. sp. 1937, 346.
- Hygrophorus tephroleucus (Fries ex Persoon) sensu Bresadola. 1938, 72.
- Clitocybe sinopica (Fries) Quélet var. microspora. 1938, 73.

METROD (G.). - Description d'espèces du genre Clitocybe. (Pl. II). 1939, 99.
- Description de Galera. 1940, 46.
- Description de Cortinaires rares. (Pl. III). 1944, 60.
- Révision des Clitocybes. (Pl. II). 1946, 42. - (Suite). (Pl. V). 1951, 387.
- Essai sur le genre Melanoleuca Patouillard emend. (Pl. I). 1948, 141.
- Une petite session mycologique en Suisse. 1950, 233.
- Voir BRIDE (A.) et METROD (G.). 1950, 106.
- Sur le genre Xerula R. Maire. 1952, 178.
- Mycena viscosissima nov. sp. 1953, 128.
- Marasmes nouveaux. 1954, 157.
MÖLLER (F.H.) et SCHAEFFER (J.). - Le complexe Russula alutacea. (Pl. V). 1935, 104.
MONCHOT (E.). - La bibliothèque de la Société Mycologique de France. 1938, 8, 15 et 17.
MONTEGUT (J.). - Voir GUYOT (A.L.), MASSENOT (M.) et MONTEGUT (J.). 1948, 101.
- Voir MASSENOT (M.) et MONTEGUT (J.). 1954, 426.
MORAWSKI (M.). - Voir DOMINIK (T.) et MORAWSKI (M.). 1935, 341.
MOREAU (Cl.). - Un Ascomycète nouveau : Melanospora brevirostrata nov. sp. 1945, 53.
- (Cl. et Mir.). - Sur les genres Alternaria et Stemphylium. 1947, 58.
- - Quelques précisions sur la nomenclature des Milaconiées proches des Pestalozzia. 1948, 187.
- - Une curieuse Mucorinée : Choanephora cucurbitarum (Berk. et Rav.) Thaxter. 1950, 222.
- - La "suie" des Sycomores à Paris. 1951, 404.
MOREAU (F.). - Gallowaya, un rameau endophyllien des Coléosporiées. 1926, 175.
- Sur deux champignons parasites des Saprolégniacées. 1939, 95.
- Le mycélium secondaire chez les Ascomycètes. 1950, 114.
MOREAU (M. et Mme F.). - Crochets et anses ascogènes. 1925, 469.
- - La signification du podétion des Cladonia. 1926, 249.
- - Le Boletus sulfureus Fr. en Auvergne. 1926, 255.
- - Observations mycologiques en Auvergne (1927). 1928, 69.
- - A propos de la signification du podétion des Cladonia. (Réponse à M. Choisy). 1928, 206.
- - Note sur Clitocybe ectypa Fr. non Bres. 1929, 93.
- - Contribution à l'étude des Russules de la région de Besse (Puy-de-Dôme). I, 1929, 96. - II, 1930, 127.
- - Un hyménium supplémentaire sur le pied d'une Russule. 1930, 193.
- - L'action des eaux minérales sur le développement des Saprolégniées. 1936, 60.
- - Sur un nouveau champignon à collerette, Coleomyces rufus nov. gen. nov. sp. ad interim. 1937, 33.
- - Bulgarine et pariétine. 1937, 39.
- - Sur la théorie hormonale de la formation des périthèces des Ascomycètes. 1937, 297.

MOREAU (M. et Mme F.). - Contribution à l'étude de la microflore fongique des eaux douces de Normandie. 1948, 223.
- - Sur le Solorina octospora Arnold. 1950, 165.
MOREAU (Mme Mir.). - Un Pyrénomycète coprophile nouveau : Gnomonia fimicola nov. sp. 1948, 238.
- Quelques Mucorinées de Madagascar. 1949, 142.
MOREAU (F.) et MORUZI (Mlle C.). - Sur quelques variations de la fertilité chez les Neurospora hétérothalliques. 1933, 204.
MORQUER (R.). - Sur quelques Hyménomycètes épixyles récoltés dans les vallées pyrénéennes et leur développement exceptionnel à haute altitude. 1926, 186.
- Dactylium dendroides Fr. et Dactylium macrosporum (Link.) Sacc. constituent-ils deux espèces distinctes ? 1928, 304.
MORUZI (C.). - Sur une maladie du Champignon de couche causée par un Monilia. 1930, 143.
- Voir MOREAU (F.) et MORUZI (Mlle C.). 1933, 204.
MOSER (Meinhard). - Note sur une espèce boréale du genre Stropharia trouvée dans le Tyrol. (Pl. I). 1949, 175.
MOSSERAY (R.). - Aspergillus niger van Tieghem : espèce hétérogène. 1934, 120.
MOYNOT. - A propos du Clitocybe dealbata et cerrussata. 1938, 11.

NADSON (G.A.) et KRASSILNIKOV (N.A.). - La levure du nectar des fleurs : Anthomyces reukaufii Gmess. (Pl. VIII et IX). 1927, 232.
NAOUMOFF (N.). - Le professeur A. de Jaczewski. (Notice nécrologique). 1932, 91.
NARDI (R.). - Observations sur la caryocynèse chez quelques Ascomycètes. (Pl. VI-VIII). 1930, 97.
- Sur la constitution chimique de la membrane cellulaire des Champignons. 1931, 113.
- Voir JAHANDIEZ (E.) et NARDI (R.). 1933, 177.
NICOLAS (G.). - Note sur la présence de l'Amanita caesarea dans l'Est de la France (département du Doubs). 1925, 96.
- Note complémentaire sur la présence de l'Oronge vraie dans le département du Doubs et remarques sur son existence dans la Manche. 1925, 404.
- Urnula melastoma (Sow.) Boudier dans le Sud-Ouest. 1925, 474.
- Un nouvel hôte de Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. 1926, 190.
- Un nouvel hôte d'Ungulina fraxinea (Bull.). 1926, 194.
- Sur un Pythium parasite du Marchantia polymorpha L. 1927, 119.
- Sur la présence de Geaster fornicatus (Huds.) Fries dans la Haute-Garonne. 1931, 112.
- Présence de deux Polyporacées sur Sophora japonica L. 1935, 242.
- Observations mycologiques dans la région toulousaine. 1936, 57.
- Observations sur Puccinia mirabilissima Peck. Sa présence dans la région toulousaine. 1936, 239.
- Sur l'extension de deux Puccinia : P. mirabilissima Peck. et P. antirrhini Dietel et Holway. en France. 1937, 165.
- Présence d'Ungulina fomentaria (Fr.) Pat. sur le Platane et sa croissance rapide. 1938, 69.
- Contribution à l'étude de la flore mycologique des Pyrénées Orientales d'après les récoltes de Conill de 1935 à 1939. 1950, 43.

NICOLAS (G.) et AGGERY (Mlle). - Note sur deux Phyllosticta parasites de plantes ornementales. 1928, 210.
- - Observations sur deux champignons de l'Agave americana L. 1928, 215.
- - Un Cycloconium parasite de Phillyrea augustifolia L. 1928, 301.
- - Remarques sur Cycloconium phillyrea Nic. et Agg. 1929, 295.
- - Observations sur Stagonospora crini Bubak et Kabat. 1929, 297.
- - Phyllosticta ambiguella Sacc. est réellement parasite du Ficus rubiginosa Desf. 1930, 84.
- - Observations sur un parasite du Citrullus vulgaris Schrader. 1934, 115.
- - Sur une Péronosporacée parasite de Rhinanthus crista-galli L. 1938, 115.
- - Un Septoria nouveau parasite de la Carotte. 1939, 118.
- - Sur un mode d'action très particulier de Cystopus bliti (Biv.-Bern.) Lév. 1951, 419.
- - Deuxième contribution à l'étude de la flore mycologique des Pyrénées Orientales. 1954, 65.
NICOLAS (G.) et CHALAUD (G.). - Un nouveau cas certain de pourridié dû à Ithyphallus impudicus (L.) Fries. 1937, 167.
NICOLAS (G.) et DOP (P.). - Un parasite du Melon du Malabar. 1926, 194.
NICOT-TOULOUSE (Jacqueline). - Sur quelques Papulospora du sol. 1948, 209.
- - - Cunninghamella echinulata Thaxter et C. elegans Lendner. 1950, 21.
- - - Deux Phoma isolés sur un plâtre humide. 1952, 352.
NIOLLE (P.). - Quatre Russules nouvelles pour la France. 1938, 2.
- Contribution d'amateur au problème Russula luteotacta. 1939, 324.
- Notes sur quelques Russules. 1944, 101.
- Notes mycologiques. 1948, 252.
- Russula puellaris Fries dans la littérature. 1949, 85.

ODDOUX (L.). - Note sur la constitution des dicaryons du carpophore et la germination des oïdies de Collybia velutipes (Fr. ex Curt.). 1953, 234 et 350.
OFFNER (J.). - Nocivité de l'Entoloma rhodopolium (Fr.) Q. 1930, 86.
- Sur les Terfez à propos d'un article récent. 1950, 109.

PARROT (A.G.). - Champignons du pays basque (1ère contribution). 1946, 86. - (2e contribution). 1947, 39. - (3e contribution). 1948, 246. - (4e contribution). 1951, 81. - (5e contribution). 1954, 420.
PASTY (Mme). - Action antifongique de la dibromomercurifluorescéine sur Venturia inaequalis (Cooke) Aderh. et sur Phytophtora infestans (Mont.) de Bary. 1954, 63.
PATOUILLARD (N.). - Quelques champignons du Tonkin (suite). 1925, 337.
- Sur le Scopora michaelis Fisch. 1925, 343.
- Travaux posthumes. I, Quelques champignons du Venezuela. (Pl. XIV et XV). 1926, 289.
- Champignons nouveaux de l'Annam. 1927, 24.
PAVILLARD (J.). - Le Polyporus lucidus Fries cavernicola. 1929, 302.

PELE (P.). - Le docteur Jules Chenantais (1854-1942), savant, artiste et mycologue. 1942, 10.
PELTEREAU (E.). - Contribution à l'étude des Bolets. 1926, 197.
- Notes bibliographiques concernant trois ouvrages sur les Champignons claviformes de Holmskjold et Persoon. (Interprétation des planches). 1928, 57.
PETITBERGHIEN (A.). - Voir BUGNON (F.) et PETITBERGHIEN (A.). 1949, 63.
PETTINARI (V.). - Sur la prétendue toxicité de l'Amanita citrina Pers. (Schaeff.) et de l'Amanita mappa Batsch. (Price). 1925, 321.
- Un cas d'empoisonnement collectif par Amanita phalloides, confusion possible avec empoisonnement par Amanita citrina. 1925, 401.
PIANE (V.). - Sur la comestibilité de Boletus purpureus Fries consommé cru. 1950, 39.
PILAT (A.). - Les Agaricales et les Aphyllophorales des Carpathes centrales. (Pl. VI et VII). 1926, 81.
- Skepperia carpathica sp. n., nouvelle espèce intéressante du genre Skepperia Berk. dans les Carpathes centrales. (Pl. V). 1927, 49.
- Additamenta ad floram Sibiriae Asiaeque orientalis mycologicam. (Pl. I-VIII). 1932, 1. - Pars secunda. (Pl. XII-XV). 1933, 256. - Pars tertia. (Pl. VI-XI). 1935, 351. - Pars quarta. (Pl. III-IX). 1936,305.
- Contribution à l'étude des Hyménomycètes de l'Asie Mineure. I, Polyporacae. (Pl. XIV-XXII). 1932, 162. - Additamenta : (Pars secunda) Agaricineae. (Pl. XXVII-XXXIII). 1932, 283. - (Pars tertial.(Pl. I-VII). 1933, 34. - (Pars quarta). (Pl. VII-VIII). 1937, 253.
- De Collybiae fusipedis Bull. hymenophore modo abnormali evoluto. (Pl. VIII). 1933, 78.
- Sur le genre Gastrosporium Mattirolo (Gastéromycètes). (Pl. I-III). 1934, 37.
- Grifola castaneae (B. et G.) sur Chêne en France. (Pl. I). 1936, 100.
- Contribution à la connaissance des Basidiomycètes de la péninsule des Balkans. (Pl. I-IV). 1937, 81.
- Species nova carpathica generis Flammula Fr. (Pl. III). 1938, 251.
- Solenia svercekii sp. n. bohemica. (Pl. VII). 1947, 203.
PILAT (A.) et VESELY (R.). - De Lentino suavissimo Fries. (Pl. IX). 1933, 225.
POIX. - Volvaria gloiocephala et Volvaria speciosa. 1928, 360.
- Note sur Pratella campestris et sa variété praticola. 1928, 362.
PONTILLON (Ch.). - Contribution à l'étude chimique de la Craterelle (note préliminaire). 1934, 308.
POTRON (Dr M.). - Gemellité chez Ithyphallus impudicus. 1946, 258.
- Note sur Lepidella echinocephala (Vittadini) Gilbert. 1950, 111.
- Méditations sur l'espèce en mycologie. 1950, 236.
- Un grand mycologue : Paul Vuillemin (1861-1932). 1951, 42.
- Notules mycologiques. 1953, 244.
- A propos de Volvaria bombycina Fr. ex Schaeff. 1954, 436.
POUCHET (A.). - Note sur le Tricholoma infumatum Bres. 1928, 109.
- Considérations sur Rhodotus palmatus (Bull.) Fr. (Pl. XI). 1932, 76.

QUILLON (P.J.). - Sur un Pyrénomycète peu connu, parasite de L'Amorpha fruticosa L. 1949, 171.

RADAIS (M.). - Jean Louis Léon Guignard, botaniste français (1852-1928). 1928, 221.
RAYSS (Mlle T.). - Contribution à la connaissance des Micromycètes aux envitons de Besse (Puy-de-Dôme). 1931, 200. - (Deuxième contribution). 1933, 381. - (Troisième contribution). 1946, 194.
- Voir SAVULESCU (Fr.) et RAYSS (Mlle T.). 1934, 90.
- Contribution à la flore mycologique du Proche-Orient. 1946, 5.
REMY (L.). - Voir HEIM (R.) et REMY (L.). 1932, 53.
RIZET (G.). - Quelques variations remarquables dans les cultures d'Ascomycètes hétérothalliques. 1940, 56.
- Sur des phénomènes d'hérédité "non mendélienne" chez quelques Ascomycètes hétérothalliques. 1940, 131.
ROGER (L.). - Quelques Champignons exotiques nouveaux ou peu connus. (I). 1934, 317. - (II). 1936, 80. - (III). (Pl. I). 1938, 48.
- Voir MAUBLANC (A.) et ROGER (L.). 1934, 193. - 1938, 111.
ROMAGNESI (H.). - Voir HEIM (R.) et ROMAGNESI (H.). 1931, 250. - 1934, 162.
- Quelques observations sur les Rhodophyllus. (Pl. XXXV-XXXVI). 1932, 306.
- Sur les Rhodophyllus. (Pl. XXVI). 1933, 422.
- Sur l'expression mathématique de l'écartement des lamelles chez les Agarics. 1936, 261.
- Liste des Champignons supérieurs recueillis à Paris. 1937, 117.
- Essai d'un sectionnement du genre Rhodophyllus. 1937, 319.
- A la recherche de Lactarius subdulcis. 1938, 204.
- Mycenella et Xerula. 1940, 59.
- Une nouvelle Russule du groupe Integra : Russula lutensis Romagn. et Le Gal. (Pl. XIII). 1940, 66.
- Quelques points de taxonomie. 1942, 81.
- Description de quelques espèces d'Agarics ochrosporés. 1942, 121.
- Contribution à l'étude des Russules de la Flore française. 1942, 150. - (2e série). 1943, 61. - (3e série). 1945, 22. - (4e série). 1946, 59.
- Observations sur quelques espèces de Rhodophyllus. 1944, 91.
- Sur deux champignons nouveaux de la Flore française. 1944, 88.
- Synonymie de quelques-unes des espèces figurées dans la Flora Agaricina danica de J.E. Lange. 1944, 82.
- Etude sur la structure de la trame chez quelques Pleurotacées. 1945, 38.
- Sur l'utilisation de nouveaux caractères intéressant la taxonomie des Rhodophyllus. 1947, 99.
- Les Entolomes printaniers. 1947, 187.
- Voir KÜHNER (R.), ROMAGNESI (H.) et YEN (H.C.). 1947, 159.
- Les problèmes et les méthodes de la systématique des Champignons supérieurs. (Conférence faite à l'Assemblée générale de la Société Mycologique de France). 1948, 53.

ROMAGNESI (H.). - Note complémentaire sur les Entolomes printaniers du groupe Clypeatus. 1951, 208.
- Sur deux nouveaux Marasmes fétides et leur position taxonomique. 1952, 133.
- Voir KÜHNER (R.) et ROMAGNESI (H.). 1953, 361.
- Voir MALENÇON (G.) et ROMAGNESI (H.). 1953, 101.
ROMAGNESI (H.) et LE GAL (Mme M.). - Un Tricholome peu connu : Tricholoma elytroides Fr. ex Scop. 1949, 132.
ROMAGNESI (H.) et LOCQUIN (M.). - Notes sur quelques espèces rares de Lepiota. 1944, 52.
ROSELLA. - Voir FOEX (Et.) et ROSELLA. 1928, 349.

SACCHAS (Athanase). - Un nouveau Champignon Ascomycète gymnoascé, l'Eidamella papyricola nov. sp. 1950, 121.
SANDU-VILLE (C.). - Voir SAVULESCU (Tr.) et SANDU-VILLE (C.). 1930, 177.
SAUGER (M.). - Etude sur les difficultés de la classification des champignons. 128, 94.
- Menues observations sur Tricholoma nudum var. glaucocanum. 1928, 103.
- Tableau récapitulatif des Tricholomes bleus suivi d'observations sur leur hybridation. 1928, 307.
- Réponse à M. Choisy. 1928, 373.
- Etude sur la valeur taxonomique de l'anneau des Agaricales. 1929, 290.
- Sur le polymorphisme d'Amanita pantherina (D.C.) et ses variations de toxicité. 1930, 207.
- Menues observations mycologiques. 1931, 109.
- Sur les difficultés de la classification des Champignons. 1931, 225.
- Etude sur la valeur taxonomique de deux caractères microscopiques fondamentaux des Hyménomycètes : trame et cystides. 1932, 233.
SAVULESCU (Tr.) et RAYSS (Mlle T.). - Deux nouvelles espèces de Peronospora. 1934, 90.
SAVULESCU (Tr.) et SANDU-VILLE (C.). - Contribution à la connaissance des Micromycètes de Roumanie. 1930, 177.
SCHAECHTELIN (J.) et WERNER (R.G.). - Développement et biologie de l'Abrothallus parmelarium Smlft. (Pl. XIII). 1926, 233.
- - Un cas foudroyant de parasymbiose. Le Homostezia piggotii (Berk et Br.) Karst. Son développement biologique et physiologique. (Pl. XI). 1928, 232.
SCHAEFFER (J.C.). - A propos de Russula chamaeleontina. 1932, 84.
- Le système naturel des Russules. 1935, 263.
- Voir MÖLLER (F.H.) et SCHAEFFER (J.C.). 1953, 104.
SCHWEERS (A.C.S.). - Voir FAVRE (J.) et SCHWEERS (A.C.S.). 1942, 105.
SEXE (H.). - Deux cas d'intoxication dus : 1° à Polyporus squamosus, 2° à Tricholoma albellum. 1938, 75.
SIEMAZKO (W.) et JAWORSKI (J.). - La coloration du substratum dans les cultures de Beauveria globulifera (Speg.) Picard et les bactéries. 1938, 245.
SINGER (R.). - Russula mairei Singer. 1929, 103.
- Contribution à l'étude des Russules. Notes sur deux variétés nouvelles. 1930, 209.
- Russula schiffneri Sing. (Pl. IV). 1935, 102.
- Sur la classification des Russules. 1935, 281.
- Contribution à l'étude des Russules. 1936, 111.

SINGER (R.). - Contribution à l'étude des Russules. Quelques Russules américaines et asiatiques. 1938, 132. - 1939, 226 et 233.
SINGH (J.). - Voir CHANDHURI (H.) et SINGH (J.). 1934, 153.
SKUPIENSKI (F.X.). - Contribution à l'étude des Myxomycètes de Pologne. (Pl. IX). 1926, 142.
STELIN (H.). - Champignons vendus sur le marché de Stockholm. 1934, 127.

TAYMANS (N.). - Lyophyllum leucophaeatum (Karst.). 1942, 90.
TEMPERE (G.). - Voir LEPESME (P.) et TEMPERE (G.). 1947, 205.
TERSON (Dr). - Le carnet de Paulet. 1928, 377.
TIMBERT (E.). - Note sur un empoisonnement par les Champignons. 1925, 92.
TORREND (R.P.). - Chitonella bahiensis Torrend n. sp. (Pl. XXXVII). 1932, 325.

UNAMUNO (Dr P.L.M.). - Romualdo Gonzalès Fragoso (1862-1928). 1928, 309.

VANDENDRIES (R.). - Recherches expérimentales prouvant la fixité du sexe dans Coprinus radians Desm. 1925, 358.
- Les relations entre souches étrangères expliquées par les aptitudes sexuelles des individus parthogénétiques chez Coprinus micaceus. 1929, 216.
- Les polarités sexuelles de Coprinus tergiversans Fr. 1931, 36.
- Nouvelles investigations dans le domaine sexuel des Hyménomycètes. 1933, 130.
- Contribution à l'étude de la sexualité dans le genre Trametes. (Pl. V-VII). 1934, 98.
- La polarité sexuelle et le régime conidien chez Pleurotus pinsitus. 1934, 203.
- Les affinités sexuelles de Hypholoma sublateritium. 1934, 213.
- Les polarités sexuelles dans le genre Pholiota. 1934, 270.
- La polarité sexuelle de Panus stipticus (Bull.) Fr. 1936, 54.
- Les tendances sexuelles des Polyporées. IV, Melanopus squamosus (Huds.) Pat. 1936, 351.
VESELY (R.). - Voir PILAT (A.) et VESELY (R.). 1933, 225.
VIENNOT-BOURGIN (G.). - Puccinia circumacta, parasite de Teucrium polium. 1949, 71.
- - Notes mycologiques. (I), 1950, 58. -(III), 1953, 332.
- - Voir MAYOR (E.) et VIENNOT-BOURGIN (G.). 1951, 113 et 1954, 432.
- - Urédinées de la Côte d'Ivoire et d'Afrique. (Ière et 2ème notes). 1951, 429. - (4ème note). 1954, 410.
VINCENS (F.). - Mode de formation et structure des réceptacles du Coniothyrium concentricum (Desm.) Sacc. 1926, 178.
VUILLEMIN (F.). - Anomalies du réceptacle chez les Hyménomycètes. 1926, 208.

WERNER (R.G.). - Voir KILLIAN (Ch.) et WERNER (R.G.). 1925, 382. - 1928, 63.
- Xanthoria parietina, lichen. Son champignon en culture pure. (Pl. IX). 1925, 385.
- Voir SCHAECHTELIN (J.) et WERNER (R.G.). 1926, 233.- 1928, 232.

WERNER (R.G.). - Etude biologique et physiologique du Celidium stictarum (de Not.) Tul. (Pl. IX et X). 1928, 194.
- Etude comparative de la germination des spores de Lichens. (Pl. IX). 1930, 199.
- Contribution à la flore mycologique du Maroc. Fasc. IX. 1934, 138.
- Etude d'un nouveau cas pathologique de parasymbiose combiné avec du parasitisme et de la pseudoparasymbiose. 1935, 249.

YEN (H.C.). - Voir KÜHNER (R.) et YEN (H.C.). 1947, 169 et 213.
- Voir KÜHNER (R.), ROMAGNESI (H.) et YEN (H.C.). 1947, 159.
YEN (Wen-Yu). - Un nouveau Cintractia de Chine. 1935, 113.
- Germination des spores de quelques Ustilaginées. 1937, 339.

ZAMBETTAKIS (Ch.). - Sur une Sphaeropsidacée nouvelle, parasite de Rauwolfia vomitaria Afz. 1950, 228.
- Recherches sur la systématique des Sphaeropsidales-phaeodidymas. 1954, 219.

ZVARA (J.). - Voir MELZER (V.) et ZVARA (J.). 1927, 275. - 1928, 135. - 1929, 287.
- Russula atropurpurea (Kromb.) et ses variétés. (Pl. I et II). 1931, 44.
- A propos de Russula chamaeleontina Fries. (Pl. V-VI). 1931, 149.
- Contribution à l'étude des Russules. (Pl. IX et X). 1931, 266.
- Rectification à mon article : A propos de Russula chamaeleontina Fr. 1932, 238.
- Contribution à la connaissance des Russules de l'Asie Mineure. (Pl. XXVI). 1932, 253.
- A propos de Russula chamaeleontina. Remarques sur la note de M. Schaeffer. 1934, 50.

TABLE DES MATIERES, GENRES

ET ESPECES

TABLE DES FLORES REGIONALES.

Ain (Flore des Dombes). 1949, 45, 47.
Aisne (Myxomycètes). 1941, 76.
Afrique (Urédinales d'). 1954, 410.
Afrique du Nord (Champignons inédits). 1928, 37.
Allier (Myxomycètes). 1941, 82.
Alpes-Maritimes (Hypogés). 1938, 23.
Alsace (Flore d'). 1949, 44.
Amérique (Russules d'). 1938, 132. - 1939, 226, 233.
Ardennes (Myxomycètes des). 1941, 91.
Argonne (Myxomycètes d'). 1949, 76.
Asie (Russules d'). 1938, 132. - 1939, 226, 233.
Asie Mineure (Gastéromycètes). 1937, 259.
- - (Hyménomycètes). 1932, 165, 283. - 1933, 34. - 1937, 253.
- - (Russules). 1932, 253.
Asie orientale. 1932, 1. - 1933, 256. - 1935, 351. - 1936, 305.
Atlas (Flore mycologique du Moyen-). 1954, 117.
Aube (Myxomycètes). 1941, 92.
Aude. 1949, 48.
Auvergne (Mycologie en). 1926, 255. - 1928, 69. - 1937, 169.

Balkans (Basidiomycètes de la péninsule des). 1937, 81.
Basque (Champignons du pays). 1946, 86. - 1947, 39. - 1948, 246. - 1951, 81. - 1954, 420.
Bas-Rhin (Myxomycètes). 1941, 86.
Bellême (Région de). 1927, 259.
Besançon (Région de). 1926, 188.
Besse (Puy-de-Dôme) (Russules). 1929, 96. - 1930, 127.
- - - (Micromycètes). 1931, 199. - 1933, 381.
Bohême (Russules de). 1928, 135.
- 1947, 203.
Bouches-du-Rhône. 1949, 51, 68.
Briançonnais (Champignons du). 1925, 439, 458. - 1927, 59. - 1932, 53.
Carpathes centrales (Agaricales et Aphyllophorales). 1926, 81. - 1927, 49. - 1938, 251.
Chamonix (Haute-Savoie). 1929, 171.
Champagne crayeuse. 1931, 157.
Cher (Myxomycètes). 1941, 77.
Chine. 1935, 113.
Chine septentrionale. 1939, 220.
City-cave (Cavernes de), Kentucky, Etats-Unis. 1926, 130.
Côte d'Ivoire (Urédinales de la). 1954, 410.

Côte d'Or (Flore mycologique). 1947, 208.
- - (Myxomycètes). 1941, 83.

Dijon (Agarics de la région de). 1927, 213.
- (Consommation des champignons sauvages à). 1929, 189.
Dordogne. 1949, 46.
Doubs (Région du). 1925, 96, 404, 406.

France (Flore mycologique de). 1949, 44.
- (Hyménomycètes de). 1925, 98, 145.
- (Myxomycètes de). 1941, 96.
- Centre (Urédinées). 1929, 197.
- Est. 1925, 404, 406.
- - (Urédinées). 1929, 197.
- Midi (Urédinées). 1929, 197.
- Sud (Micromycètes). 1949, 121.
- Sud-Est. 1949, 97.
- Sud-Ouest. 1925, 474.

Gironde. 1949. 52.

Hautes-Alpes (Myxomycètes). 1941, 91.
Haute-Garonne. 1931, 112.
- - (Hyménomycètes épixyles). 1926, 186.
Haute-Loire. 1949, 46, 47.
Haute-Marne. 1927, 265.
Hautes-Pyrénées (Hyménomycètes épixyles). 1926, 186.
Haute-Saône. 1925, 406.
- - (Myxomycètes). 1941, 87.
Haute-Savoie. 1949, 47, 60.
Hérault. 1949, 49, 50, 68.
Huelgoat. 1927, 293.

Jura. 1925, 33. - 1927, 145. - 1929, 35. - 1931, 129. - 1936, 35.
- (Hauts-marais tourbeux). 1933, 190. - 1935, 117. - 1936, 129. - 1937, 267, 271. - 1939, 196.

Lacaune (Monts de) (Tarn). 1928, 79. - 1931, 258. - 1934, 293. - 1949, 59.
Landes (Nouveaux champignons des). 1925, 463.
Liban (Flore mycologique du). 1946, 5.
Loir-et-Cher (Myxomycètes. 1941, 80.
Loire-Inférieure (Myxomycètes). 1941, 89.
Lot. 1949, 47.
Lot-et-Garonne. 1949, 52.
Lozère. 1949, 47.
Lyon et région lyonnaise. 1933, 340. - 1937, 175. - 1943, 5. - 1948, 5.

Marne (Ascomycètes de la). 1931, 244.
Maroc (Flore cryptogamique du). 1934, 138. - 1937, 134. - 1939, 34. - 1954, 117.
Moldavie (Myxomycètes de Neamtz). 1928, 249.
Montpellier. 1949, 49.

Nord (Myxomycètes). 1941, 88.

Oise (Myxomycètes). 1941, 74.
Orient (Flore mycologique du Proche-). 1946, 5.

Paris et région parisienne. 1926, 75.
- - - (Amanites du parc de Grignon). 1954, 426.
- - - (Basidiomycètes). 1926, 295. - 1934, 136. - 1940, 71.
- - - (Champignons recueillis à). 1937, 117.
- - - (Champignons sur le marché de). 1931, 221.
- - - (Consommation des champignons sauvages à). 1929, 195.
- - - (Myxomycètes). 1941, 68, 69.
Pologne (Lyxomycètes). 1926, 142.
Puy-de-Dôme (Flore). 1949, 46.
- - (Myxomycètes). 1941, 82.
Pyrénées (Myxomycètes des). 1940, 125.
- (Basses-) (Laboulbéniacées des). 1947, 205.
Orientales. 1949, 68. - 1954, 65.

Roumanie (Micromycètes). 1930, 177.

Saône-et-Loire (Myxomycètes). 1941, 84.
Seine-et-Marne (Myxomycètes). 1941, 72.
Sibérie (Flore mycologique). 1932, 1. - 1933, 256. - 1935, 351. - 1936, 305.
Stockholm (Champignons vendus à). 1934, 127.
Suisse (Petite session en). 1950, 233.
- (Discomycètes de). 1954, 187.

Tarentaise (Savoie). 1925, 475.
Tarn. Voir Lacaune (Monts de). 1949, 53.
Tonkin (Champignons du). 1925, 337.
Toulouse (Région de). 1936, 57, 239.
Trinité (Agaricales de l'Île de la). 1953, 145.

Var. 1949, 68.
Vaucluse. 1949, 52.
Venezuela (Champignons du). 1926, 289.
Vienne (Myxomycètes). 1941, 88.

TABLE DES ARTICLES GENERAUX.

Acide cyanhydrique (Champignons à). 1926, 40. - 1942, 99.
Anneau des Agaricales (Valeur taxonomique). 1929, 290.
- - - (Terminologie). 1947, 42.
Anomalies des Champignons. 1936, 363, 377.
- d'Ithyphallus (Gemmellité). 1946, 258.
- du réceptacle chez les Hyménomycètes. 1926, 208.
Antifongique (Action) de la dibromomercurifluorescéine. 1954, 63.
Asques de deux Dothidéales. 1954, 99.

Basides (Types divers). 1926, 48.
Bulgarine. 1937, 39.

Caryocinèse chez quelques Ascomycètes. 1930, 97.
Champignons à acide cyanhydrique. 1926, 40. - 1942, 99.
Chapeau des Amanites (Couleur du). 1948, 50.
Cheilocystides (Dimorphisme des). 1936, 102.
Classification des Champignons. 1928, 94, 147, 365, 370, 373. - 1931, 225. - 1934, 44. - 1936, 30, 31.
Coloration des Champignons. 1953, 326.
Conidies (Formation des) d'Urédinées. 1944, 47.
Couleur du chapeau des Amanites. 1948, 50.
- des spores pour détermination des Russules. 1950, 73.
Coupes microscopiques. 1937, 47. - 1940, 55.
Crochets et anses ascogènes. 1925, 469. - 1951, 183.
- - d'anastomose (Origine du). 1932, 259.
Culture pure des Homobasidiées. 1947, 133.
- des Hyménomycètes. 1925, 310. - 1929, 261.
- du Pleurotus eryngii. 1925, 468.
- d'une Saprolégniacée. 1925, 255.
Cystides des Hyménomycètes. 1932, 233.

Dégénérescence gommeuse des bois. 1935, 348.
Destruction du bois par les Champignons. 1933, 377. - 1951, 436.

Eaux minérales (Action des) sur les Champignons. 1936, 60.
Espèce en mycologie. 1934, 30. - 1936, 300. - 1947, 91. - 1950, 236. - 1951, 422.

Herbiers de Champignons. 1934, 310.

Individu en Mycologie. 1947, 91.

Lamelles (Ecartement des) chez les Agarics. 1936, 251.

Membranes cellulaires (Constitution des). 1931, 113.
Mucilages pectosiques chez les Agaricales. 1927, 107.
Mycéliums (Conservation des). 1937, 45.
Mycélium des Agaricales (Recherche morphologique sur le). 1946, 135.
- secondaire des Ascomycètes. 1950, 114.
- (Boucles du) des Eumycètes. 1951, 173.

Odeur des Champignons (Variations de l'). 1934, 25. - 1952, 400.
Ornementation des spores. 1940, 7.

Osmologie mycologique. 1932, 242.

Parasymbiose combinée avec du parasitisme et de la pseudoparasymbiose. 1935, 249.
Pariétine. 1937, 39.
Pigments des Champignons. 1953, 326.
Planche (La) mycologique. 1947, 98.
Propriétés médicales du lait de Lactaire poivré. 1933, 126.

Réactif (Nouveau) des membranes fixes. 1952, 172.
Réaction antifongique de la dibromomercurifluorescéine. 1954, 63.
Réactions chimiques des Bolets. 1950, 177.
- - des Clavaires. 1931, 106.
- - des Cortinaires. 1931, 105.
- - du Lactaire poivré. 1933, 126.
- - des Russules. 1931, 107.
- - fongiques. 1933, 439.
Réactions colorées par l'iode des Bolets. 1950, 177.
- - - - des parois de spores. 1951, 383.
- - - - des spores d'Agarics leucosporés. 1934, 9.
- - - - des spores de Lépiotes. 1932, 324.
- - par les vapeurs d'iode. 1929, 141.
- - par la potasse. 1926, 244.
- de la paraphénylènediamine sur les Russules. 1949, 41.
Réceptacle (Anomalies du) chez les Hyménomycètes. 1926, 208.
Revêtement piléique des Champignons supérieurs. 1953, 425.

Sensibilité du Lapin à l'Amanite phalloïde. 1932, 336.
Sexualité dans le genre Pholiota. 1934, 270.
- chez Pleurotus pinsitus. 1934, 203.
- chez les Trametes. 1934, 98.
Sexuel (Domaine) des Hyménomycètes. 1933, 130.
Sexuelle (Polarité) de Panus stipticus. 1936, 54.
- (Tendance) des Polyporés. 1936, 351.
Spécificité des Hyménomycètes lignicoles avec leurs supports. 1929, 261.
Spores (Couleur des) pour détermination des Russules. 1950, 73.
- desséchées. 1928, 230.
- (Dimensions des). 1926, 43.
- du diplonte chez les Urédinées. 1943, 78.
- (Forme des) chez les Agarics. 1929, 264.
- (Micelles calloso-pectiques dans les membranes des). 1943, 44.
- (Projections des). 1928, 199.
- (Réaction à l'iode et au bleu de crésyle des parois de). 1951, 383.
- des Agarics leucosporés. 1934, 9.
- des Bolets. 1950, 186.
- des Lactaires (Ornementation). 1940, 7.
- des Lépiotes. 1932, 324.
- des Lichens (Germination). 1930, 199.
- des Russules et des Lactaires. 1931, 72.
- des Sclerotinia. 1936, 63.
- d'Ustilaginales (Germination). 1937, 339.
Suie du Sycomore (Maladie de la). 1951, 404, 437.
Systématique des Champignons supérieurs. 1948, 53.

Technique microscopique élémentaire. 1954, 93.

Terminologie des voiles et anneaux. 1947, 42.
Trame des Hyménomycètes. 1932, 233.

Variété en Mycologie. 1953, 343.
Voiles (Terminologie des). 1947, 42.

---oOo---

EMPOISONNEMENTS ET TRAITEMENTS.

Intoxications par Champignons en 1928 et 1929. 1930, 91.
- par Amanita pantherina. 1929, 139. - 1930, 207. - 1945, 65.
- par Amanita phalloides. 1925, 92, 94, 401, 411, 412, 413, 415, 482, 484, 485, 486, 487, 488. - 1927, 122 et suite. - 1928, 122, 217. - 1934, 124, 135. - 1943, 35, 72. - (Essai sur le Lapin), 1932, 336. - (Essai sur le Rat), 1950, 246.
- par Amanita porphyria (Non-toxicité). 1927, 298.
- par Amanita vaginata (crue). 1926, 140, 245.
- par Amanita verna. 1925, 89, 408, 481. - 1928, 123.
- par Clitocybe olearia. 1927, 128.
- par Clitocybe rivulosa. 1927, 123, 124.
- par Entoloma lividum. 1925, 316.
- par Entoloma rhodopolium. 1930, 86. - (Expérimental), 1931, 87.
- par Lepiota helveola. 1931, 52+.
- par Marasmius oreades. 1927, 123. - 1933, 441.
- par Polyporus squamosus. 1938, 75.
- par Psalliota xanthoderma. 1925, 481.
- par Tricholoma albellum. 1938, 75.

Traitements : Revue générale des divers traitements. 1945, 14.
- Méthode du docteur Limousin. 1934, 124.
- Sérum antiphallinique de l'Institut Pasteur. 1949, 168.

MYXOMYCETES

Myxomycètes (Classification actuelle). 1928, 296.
- en Champagne crayeuse. 1931, 157.
- en France (Liste générale). 1940, 96.
- en Pologne. 1926, 142.
- de l'Herbier Le Sourd. 1943, 41.

EXOSPOREES.

Ceratiomyxa freyana. 1928, 251.
- fruticulosa. 1926, 149. - 1928, 251.

ENDOSPOREES.

I. Amaurosporales calcariées.

a) Physaracées.

Badhamia capsulifera. 1926, 149. - 1928, 251. - 1931, 164.
- capsulifera var. major. 1928, 252.
- capsulifera var. repens. 1928, 252.
- decipiens. 1928, 253.
- foliicola. 1928, 252.
- lilacina. 1928, 254.
- macrocarpa. 1928, 254. 1939, 221.
- magna. 1928, 253.
- nitens. 1928, 253.
- panicea = Arcyria cinerea. 1928, 254. - 1931, 164.
- papaveracea. 1928, 252.
- populina. 1928, 252.
- rubiginosa. 1928, 254.
- rubiginosa var. dictyospora. 1928, 254.
- rubiginosa var. globosa. 1928, 254.
- utricularis. 1928, 252. 1931, 164.
- versicolor. 1928, 253.
Chondrioderma floriforme. 1931, 162.
- globosum. 1931, 162.
Chondrioderma hemisphaericum. 1931, 162.
- spumarioides. 1931, 162.
- trevelyani. 1931, 162.
Cienkowskia reticulata. 1928, 263.
Craterium aureum. 1928, 264.
- leucocephalum. 1928, 264. - 1931, 163. - 1939, 223. - 1940, 126.
- leucocephalum var. scyphoides. 1928, 264.
- leucocephalum var. cylindricum. 1928, 264.
- minutum. 1924, 264. - 1931, 163.
Diacheae cerifera. 1928, 267.
- leucopoda. 1939, 224. - 1940, 127.
- leucopoda var. globosa. 1928, 267.
Diderma arboreum. 1928, 265.
- asteroides. 1928, 266.
- effusum. 1928, 265.
- floriforme (Voir Chondrioderma). 1928, 266.
- globosum (Voir Chondrioderma). 1928, 265. - 1939, 223.
- hemisphaericum (Voir Chondrioderma). 1928, 265.
- luteo-album. 1940, 127.
- montanum. 1928, 264.
- montanum var. album. 1928, 264.
- montanum var. roseum. 1928, 265.
- nivale var. trevelyani (Voir Chondrioderma). 1931, 162. - 1940, 127.
- niveum. 1940, 126.
- ochraceum. 1928, 265.
- radiatum. 1928, 266.

Diderma rugosum var. sessile. 1928, 266.
- sauteri. 1928, 265.
- simplex. 1928, 265.
- spumarioides. 1928, 265. - 1939, 223. (Voir Chondrioderma.)
- testaceum. 1928, 265 ; 1939, 223.
- umbilicatum. 1928, 266.
Erionema simplex. 1953, 281.
Erionemella tortuosa. 1953, 290.
Fuligo cinerea. 1928, 263.
- licenti. 1939, 222.
- megaspora. 1936, 337.
- muscorum. 1926, 162 ; 1928, 263.
- rufa. 1926, 163 ; 1928, 263.
- septica. 1926, 160 ; 1928, 263; 1931, 164 ; 1939, 221 ; 1940, 126.
Leocarpus fragilis. 1928, 264 ; 1931, 163.
Physarum aurantium. 1928, 256 ; 1940, 126.
- aureum. 1928, 261.
- bethelii. 1928, 258.
- bitectum. 1928, 262.
- bogoriense. 1928, 262.
- carneum. 1928, 258.
- cinereum. 1931, 163 ; 1940, 126.
- cinereum var. scintillans. 1928, 260.
- citrinellum. 1928, 258.
- citrinum. 1928, 256.
- compressum. 1926, 150 ; 1928, 259.
- confertum. 1928, 260.
- confluens. (Voir P. globuliferum var. confluens.) 1928, 255.
- conglomeratum. 1928, 263.
- connatum. 1928, 260.
- contextum. 1928, 263 ; 1931, 163.
- crateriforme. 1928, 259.
- diderma. 1926, 150.
- famintzini. 1928, 262.
- galbeum. 1928, 257.
- globuliferum var. confluens. 1928, 255.
- lateritium. 1928, 263.
- leucopus. 1928, 254.
- leucophaeum. Voir P. nutans var. leucophaeum. 1926, 156 ; 1928, 259.
- maydis. 1928, 258.
Physarum melleum. 1928, 255.
- mutabile. 1928, 257.
- notabile. 1926, 154.
- nucleatum. 1928, 259.
- nucleatum var. robustum. 1928, 259.
- nutans. 1926, 155 ; 1928, 259; 1931, 163.
- nutans var. leucophaeum. 1926, 156 ; 1928, 259 ; 1931, 163.
- nutans var. robustum. 1928, 259.
- obscurum. Voir P. virescens var. obscurum. 1928, 263.
- penetrale. 1928, 258 ; 1949, 78.
- polonicum. 1926, 158.
- polycephalum. 1928, 257.
- psittacinum. 1928, 256.
- pulcherrimum. 1928, 255.
- pusillum. 1928, 259.
- robustum. Voir P. nucleatum var. robustum. 1928, 259. Voir P. nutans var. robustum. 1928, 259.
- rubiginosum. 1928, 263.
- scintillans. Voir P. cinereum var. scintillans. 1928, 260.
- sessile. 1928, 260, 261.
- sinuosum. 1926, 158 ; 1928, 262 ; 1931, 163.
- straminipes. 1928, 259.
- sulfureum. 1928, 255.
- sulfureum var. variabile. 1928, 255.
- tenerum. 1928, 257.
- variabile. Voir P. sulfureum var. variabile. 1928, 255.
- vernum. 1928, 298; 1939, 221.
- virescens. 1928, 263 ; 1949, 78.
- virescens var. obscurum. 1928, 263.
- viride. 1926, 157 ; 1928, 256.
- viride var. aurantium. 1940, 126.
Tricamphora pezizoidea. 1928, 283 ; 1939, 114.

b) Didymiacées.

Didymium clavum. 1928, 267 ; 1931, 162.
- complanatum. 1928, 267.
- crustaceum. 1928, 268.

Didymium difforme. 1931, 161.
- difforme var. comatum. 1928, 267.
- farinaceum. 1931, 162.
- melanosporum. 1928, 267 ; 1940, 127.
- melanosporum var. minus. 1940, 127.
- nigripes var. eximium. 1928, 268.
- nigripes var. xanthopus. 1928, 268 ; 1940, 128.
- squamulosum. 1928, 268 ; 1931, 161.
- wilczekii. 1940, 128.

Lepidoderma carestianum. 1928, 268.
- tigrinum. 1928, 268.

Leptoderma iridescens. 1928, 268 ; 1949, 79.
Mucilago spongiosa. 1928, 268.
Spumaria alba = Mucilago spongiosa. 1931, 161 ; 1939, 224.

II. Amausporales acalcariées.

a) Collodermacées.

Colloderma oculatum. 1949, 80.

b) Stemonitacées.

Clastoderma debaryanum. 1928, 273.
Comatrichia sequalis. 1928, 271.
- elegans. 1928, 271.
- laxa. 1928, 271.
- longua. 1928, 272.
- lurida. 1928, 272.
- nigra. 1931, 161.
- nigra var. alta. 1928, 270.
- pulchella var. gracilis. 1928, 271.
- typhina ou C. typhoides. 1928, 271 ; 1931, 161.

Echinostelium minutum. 1928, 273.
Enerthenema papillatum. 1928, 272.
Lamproderma arcyrionema. 1928, 272.
- columbinum. 1931, 161.
- columbinum var. crucheti. 1928, 273, 293.
- columbinum var. subglobosum. 1928, 272.

Lamproderma gulielmae. 1928, 273.
- physaroides. 1931, 160.
- scintillans. 1928, 272.
- violaceum. 1928, 272.
- violaceum var. carestiae. 1940, 119.

Stemonitis ferruginea. 1928, 270 ; 1940, 128.
- flavogenita. 1928, 270.
- fusca. 1931, 161.
- fusca var. confluens. 1928, 269.
- fusca var. flaccida. 1928, 269.
- fusca var. trechispora. 1928, 269.
- herbatica. 1928, 270 ; 1940, 128.
- hyperopta. 1928, 269.
- pallida. 1928, 270.
- splendens. 1940, 128.
- splendens var. flaccida. 1928, 269.
- splendens var. webberi. 1928, 269.

c) Amaurochaetacées.

Amaurochaete comata. 1928, 273.
- fuliginosa. 1928, 273 ; 1931, 160.

Brefeldia maxima. 1928, 273.

III. Lamprosporales.

A - Aneminées.

a) Heterodermacées.

Cribaria argillacea. 1928, 274.
- aurantiaca. 1931, 158.
- dictydioides. 1928, 275.
- intricata. 1928, 275.
- languescens. 1928, 274.
- macrocarpa. 1928, 275.
- microcarpa. 1928, 275.
- piriformis var. notabilis. 1928, 276.
- purpurea. 1928, 276.
- rubiginosa. 1928, 274.
- rufa. 1928, 275.
- splendens. 1928, 275.
- tenella. 1928, 275.
- violacea. 1928, 276.
- vulgaris. 1928, 275.

Cribaria vulgaris var. aurantiaca. 1928, 275 ; 1931, 158.
Dictydium cancellatum. 1928, 276 ; 1931, 158.
- cancellatum var. alpinum. 1928, 276.
- cancellatum var. fuscum. 1928, 276.
Lindbladia effusa var. simplex. 1928, 274.

b) Liceacées.

Licea flexuosa. 1928, 277.
- minima. 1928, 277.
- pusilla. 1928, 277.
- tenera. 1928, 277.
Orcadella operculata. 1928, 277.

c) Tubulinacées.

Tubifera casparyi. 1928, 277.
- ferruginosa. 1928, 277 ; 1931, 158 ; 1939, 224 ; 1940, 128.

d) Reticulariacées.

Dictydiaethalium plumbeum. 1928, 278 ; 1931, 158.
Enteridium olivaceum. 1928, 278.
- rozeanum. 1928, 278.
Liceopsis lobata. 1928, 278.
Reticularia lycoperdon. 1931, 160.

e) Lycogalacées.

Lycogala conicum. 1928, 279 ; 1933, 128.
- epidendron. 1928, 279 ; 1931, 158.
- flavo-fuscum. 1928, 278 ; 1938, 26.

B - Caloneminées.

a) Trichiacées.

Hemitrichia clavata. 1928, 281 ; 1931, 159 ; 1940, 129.
- karstenii. 1928, 281.
- leiotricha. 1928, 281.
- minor. 1949, 82.
- serpula. 1928, 281 ; 1931, 159 ; 1939, 225 ; 1940, 129.
Hemitrichia vesparium. 1928, 281 ; 1931, 159 ; 1939, 225 ; 1949, 82.
Oligonema nitens. 1928, 281.
Trichia affinis. 1928, 279.
- botrytis. 1931, 160.
- botrytis var. munda. 1928, 281.
- contorta var. inconspicus. 1928, 280.
- decipiens. 1940, 129.
- decipiens var. olivacea. 1928. 280.
- decipiens var. olivacea f. nodulosa. 1928, 280.
- decipiens var. olivacea f. hemitrichioides. 1928, 280.
- decipiens var. olivacea f. bifida. 1928, 281.
- erecta. 1928, 280.
- fallax. 1931, 160.
- favoginea. 1928, 279 ; 1931, 159 ; 1940, 129.
- floriformis. 1928, 281.
- persimilis. 1928, 279.
- scabra. 1928, 279.
- varia. 1939, 224.
- varia var. genuina. 1931, 160.
- varia var. nigripes. 1931, 160.
- varia var. olivacea. 1928, 280, 292.

b) Arcyriacées.

Arcyria carnea. 1928, 282.
- cinerea. 1928, 282.
- cinerea var. digitata. 1928, 282.
- denudata = punicea. 1928, 282.
- ferruginea. 1928, 281 ; 1931, 159.
- incarnata. 1928, 283.
- incarnata var. fulgens. 1928, 283.
- incarnata var. laxa. 1928, 283.
- insignis. 1928, 282.
- nutans. 1928, 283 ; 1939, 225.
- oerstedtii. 1928, 283.
- pomiformis. 1928, 282.
- punicea. 1931, 159 ; 1939, 225 ; 1940, 129.
- stipata. 1928, 283.
- versicolor. 1928, 282.

Lachnobolus congestus. 1928, 283.
Perichaena chrysosperma. 1928, 283.
- corticalis. 1931, 159 ; 1940, 129.
- corticalis var. liceoides. 1928, 284.
- depressa. 1928, 284.
- vermicularis. 1928, 284.

c) Margaritacées.

Dianema corticatum. 1928, 284.
Margarita metallica var. plasmodiocarpa. 1928, 284.

d) Phytomyxidacées.

Plasmodiophora alni. 1931, 157.
- brassicae. 1931, 157.
Ligniera. 1928, 105.
- junci. 1925, 390.
- pilorum. 1925, 390.
- radicalis. 1925, 390.
- verrucosa. 1925, 390.
Sorosphaera veronicae. 1931, 151.

---oOo---

P H Y C O M Y C E T E S

o u

S I P H O M Y C E T E S

A. Uniflagellés.

a) Chytridiales.

Cladochytrium alismatis. 1931, 166.
- butomi. 1931, 166.
- gerhardti. 1931, 167.
- heleocharidis. 1931, 167.
- hippuridis. 1931, 165.
- magnusianum. 1931, 165.
- iridis. 1931, 167.
- majus. 1931, 166.
- mauryanum. 1931, 166.
- menthae. 1931, 166.
- menyanthis. 1931, 166.
- schroeteri. 1931, 167.
- sparganii-ramosi. 1931, 167.
- speciosum. 1931, 166.
- vagans. 1931, 165.
Myzocythium proliferum. 1952, 182.
Physoderma muscari. 1949, 121.
- ornithogali. 1928, 55.
Synchytrium aureum. 1931, 165.
- endobioticum. 1950, 43.
Synchytrium taraxaci. 1931, 165 ; 1933, 382.

b) Blastocladiales.

Allomyces monspeliensis. 1952, 184.
Gonapodia bohemica. 1946, 255.
- polymorpha. 1946, 253.
- prolifera. 1946, 254.

B. Biflagellés.

a) Lagénidiales.

Olpidiopsis saprolegniae var. levis. 1948, 223.
- vuilleminiae. 1952, 182.

b) Saprolégniales.

Saprolégniées (Développement des). 1936, 60.

Isoachlya toruloides var. paucispora. 1948, 227.
Saprolegnia delica. 1948, 227.
- diclina. 1948, 227.
- ferox. 1948, 225.
- monoica. 1948, 225.

c) Leptomitales.

Apodachlya brachynema. 1948, 229.
Sapromyces androgynus. 1936, 370, 374.
- reinschii. 1936, 370.

d) Peronosporales.

Peronosporées à Besse (Puy-de-Dôme). 1933, 382.
- dans le Tarn. 1931, 259.
Albugo mangenoti. 1951, 114.
Bremia lactucae. 1931, 169, 207 ; 1933, 391; 1946, 195.
- sonchi. 1931, 207 ; 1933, 391 ; 1954, 67.
Cystopus uredo bliti. 1931, 168 ; 1933, 382 ; 1951, 419 ; 1954, 65.
- candidus. 1931, 167, 201 ; 1933, 382 ; 1946, 6 ; 1954, 65.
- candidus f. sinapidis arvensis. 1946, 8.
- spinulosus. 1931, 168.
- portulacae. 1931, 168 ; 1946, 8.
- tragopogonis. 1931, 168, 201 ; 1946, 8.
Peronoplasmopara densa. 1938, 115 ; 1954, 67.
Peronospora aestivalis. 1931, 205 ; 1946, 9.
- affinis. 1931, 170 ; 1933, 385.
- alsinearum. 1931, 169.
- alta. 1931, 172, 207 ; 1950, 43 ; 1954, 66.
- aparines. 1931, 207.
- aquatica. 1931, 206.
- arabidis hirsutae. 1931, 204.
- arborescens. 1931, 170.
- atriplicis-halimi. 1934, 90.
- boni-henrici. 1931, 202.
- calotheca. 1931, 169 ; 1933, 390.
Peronospora candida. 1931, 170.
- chenopodii. 1933, 384.
- chenopodii polyspermi. 1933, 384.
- conglomerata. 1931, 170.
- coronillae minimae. 1953, 332.
- coronopi-procumbentis. 1953, 333.
- crispula. 1931, 205.
- cyparissiae. 1933, 385.
- dentariae. 1933, 385.
- dipsaci. 1933, 390.
- echinospermi. 1950, 62.
- effusa. 1931, 171.
- effusa var. major et var. minor. 1931, 172.
- erini. 1953, 334.
- euphorbiae. 1931, 172.
- favargeri. 1951, 115.
- ficariae. 1931, 170.
- grisea. 1931, 206; 1954, 66.
- lamii. 1933, 171.
- lathyrina. 1950, 64.
- leptoclada. 1931, 205.
- leptosperma. 1931, 171.
- linariae. 1931, 171.
- lunariae. 1933, 386.
- maublancii. 1934, 93.
- minuta. 1953, 334.
- moreaui. 1953, 386.
- myosotidis. 1931, 169.
- papaveris-pilosi. 1953, 335.
- parasitica. 1931, 170, 204.
- polygoni. 1931, 173.
- potentillae. 1931, 171.
- pratensis. 1931, 204 ; 1933, 386.
- pulveracea. 1931, 173, 204.
- radii. 1931, 171.
- ranunculi-flabellati. 1953,335.
- rubi. 1931, 172.
- rumicis. 1931, 173.
- sanguisorbae. 1933, 389.
- schachtii. 1931, 172.
- schleideni. 1931, 172.
- scleranthi. 1933, 384.
- sisymbrii officinalis.1933,385.
- stigmaticola. 1933, 390.
- tanaceti. 1954, 65.
- thlaspeos arvensis. 1933, 385.
- tomentosa. 1931, 203.
- trifolii-hybridi. 1931, 205.
- trifoliorum. 1931, 170.
- urticae. 1931, 172.
- valerianellae. 1931, 171.
- variabilis. 1931, 203.
- verbasci. 1933, 390.
- verna. 1933, 390.
- vexans. 1931, 204.

Peronospora viciae. 1931, 169.
- sativae. 1931, 204.
- violacea. 1931, 171.
- violae. 1931, 206.
Phytoptora infestans. 1931, 168 ; 1954, 63.
Plasmopara angelicae. 1933, 383.
- chaerophylli. 1931, 202.
- conii. 1931, 202.
- densa. 1931, 169 ; 1938, 115 ; 1954, 67.
- nivea. 1931, 168, 202 ; 1933, 383 ; 1954, 67.
- pusilla. 1954, 66.
- viticola. 1931, 169 ; 1933, 384.
Pseudoperonospora humili. 1931, 202.
Pythium graminicolum. 1948, 231.
- marchantiae. 1927, 119.
- monospermum. 1948, 231.
- proliferum. 1948, 232.
Sclerospora graminicola. 1931, 168.

C. Zygomycètes.

a) Mucorales.

Absidia spinosa var. madecassensis. 1949, 144.
Chaetocladium jonesii. 1931, 174.
Choanephora cucurbitarum. 1950, 222.
Cunninghamella bertholletiae. 1949, 148.
- echinulata. 1950, 21.
- elegans. 1950, 21.
Endogone fusiformis. 1952, 184.
Mortierella bainieri. 1948, 232.
- polycephala. 1931, 174.
Mucor caninus. 1931, 173.
- fungicola. 1931, 173.
- lamprosporus. 1949, 142.
- mucedo. 1931, 173.
- stercoreus. 1931, 173.
Pilobolus crystallinus. 1931, 174.
Rhizopus nigricans. 1931, 174.
Sporodinia grandis. 1933, 173.
Spinellus fusiger. 1931, 173.
Syncephalastrum racemosum var. paucisporum. 1949, 146.
Thamnidium elegans. 1931, 174.

b) Entomophtorales.

Botryobolus parasiticus. 1952, 184.
Empusa muscae. 1931, 174.
Entomophtora aphidis. 1946, 9.

---oOo---

A S C O M Y C E T E S

Les Ascomycètes à asques polyspores. 1936, 379.
- - hétérothalliques (Culture). 1940, 56.
- - (Caryocinèse). 1930, 97.
- - (Cycle et Sporophytes). 1953, 199.
- - (Formation des périthèces). 1937, 297.
- - (Hérédité non mendélienne). 1940, 131.
- - (Mycélium secondaire). 1950, 131.

I. LEVURES.

Les levures des liqueurs tannantes végétales. 1954, 353.
Anthomyces reukaufii. 1927, 222.
Candida boidini. 1954, 360.
- catenulata. 1954, 360.
- guilliermondii. 1954, 360.
- melinii. 1954, 360.
- mesenterica. 1954, 360.
- mycoderma. 1954, 360.
- parapsilopsis. 1954, 360.
- solani. 1954, 360.
Cladonia. 1927, 267 ; 1928, 206.
Kloeckera apiculata. 1954, 360.
Petasospora nov. gen. 1954, 364.
- chambardi. 1954, 365.
- pastori. 1954, 365.
- pini. 1954, 365.
- rhodanensis. 1954, 365.
- strasburgensis. 1954, 365.
Sporobolomyces. 1927, 245.
Torula antennata. 1953, 276.
- cistina. 1952, 398.
- graminis. 1946, 78 ; 1953, 274.
- major. 1953, 275.
- ovoidea. 1953, 274.
Torulopsis famata. 1954, 360.
- inconspicus. 1954, 360.
Zygosaccharomyces cavarae de la datte. 1929, 153.
- guilliermondi. 1927, 272.

II. PYRENOMYCETES, SPHERIALES, etc.

Anixia atrospora. 1927, 33.
- perichaenoides. 1952, 216.
- truncigena. 1952, 216.
Ascopolyporus f. polychrous. 1953, 418.
Aspergillus niger. 1934, 120.
Bertia moriformis. 1952, 103, 154.
Calonectria hederae. 1952, 214.
Ceratosphaeria lanuginosa. 1930, 232.
Claviceps microcephala. 1931, 209 ; 1933, 396.
- purpurea. 1931, 208 ; 1933, 396; 1946, 18 ; 1952, 387 ; 1954, 86.
Clithris quercina. 1936, 334.
Coleroa andromedae. 1933, 397.
- chaetomium. 1933, 398.
Comoclathris miliarakisii. 1930, 233.
Cucurbitaria colutae. 1946, 78.
Didymella proximella. 1949, 102.
Didymosphaeria brunneola. 1946, 78.
- cephalariae. 1949, 103.
- polyspora. 1948, 174.
- verdoni. 1949, 104.
Dothidella trifolii. 1946, 19.
- ulmi. 1954, 100.
Eidamella papyricola. 1950, 121.
Eutypa acharii. 1951, 404.
Eutypella amorphae. 1949, 171.
Gnomonia fimicola. 1948, 238.
Gnomoniella tubiformis. 1933, 398 ; 1946, 22.
Guignardia euphorbiae. 1946, 19.
- umbelliferarum. 1949, 107.
Herpotrichia ephedrae. 1949, 121.
Heterosphaeria linariae. 1946, 23.
Homostegia piggotii. 1928, 232.
Hypocreopsis. 1952, 359.
- lichenoides. 1952, 363.
Hypomyces aurantius. 1937, 103.
Hysterographium flexuosum. 1930, 237.
- fraxini. 1949, 107.
Irenina coffeae. 1934, 320.
- isertiae. 1934, 319.
Lasiobotrys lonicerae. 1952, 389.
Leptosphaeria acuta. 1946, 80.
- agnita. 1949, 108.
- artemisiae. 1946, 80.
- bupleuri. 1948, 109.
- cephalariae-uralensis. 1948, 109.
- clivensis. 1949, 108.
- culmicola. 1949, 109.
- culmifraga. 1949, 109.
- culmorum. 1946, 80.
- eustoma. 1949, 109.
- eustomella. 1949, 110.
- galiorum. 1949, 111.
- grognonnensis. 1949, 112.
- ischaemi. 1949, 112.
- kunzeana. 1946, 80.

Leptosphaeria littoralis. 1946, 81.
- melicae. 1946, 21.
- michotii. 1946, 81.
- montana. 1948, 109.
- montis bardi. 1949, 114.
- oligospora. 1935, 249.
- primulana. 1948, 109.
- rusci. 1946, 21.
Linospora capreae. 1946, 81.
Melanospora brevirostrata. 1945, 53.
Meliola disciseta. 1936, 80.
Metasphaeria affinis. 1949, 117.
- errabunda. 1946, 82.
Mycosphaerella aphyllanthis. 1952, 391.
- aquilina. 1946, 82.
- chelidonii. 1946, 82.
- limbalis. 1952, 391.
- montellica. 1946, 82.
- pachyasca. 1949, 118.
- patouillardi. 1946, 82.
- punctiformis. 1946, 20.
- sentina. 1952, 392.
- tassiana. 1946, 83.
- thironi. 1946, 83.
Microthyriella guineensis. 1938, 52.
Mytilidion decipiens. 1949, 118.
Nectria cacaoicola. 1934, 325.
Ophiobolus acuminatus. 1946, 83.
Pachythyrium. 1953, 302.
- parasiticum. 1953, 302.
Phyllachora bromi. 1946, 83.
- digitariae. 1951, 136.
- graminis. 1933, 397.
- podagrariae. 1927, 41.
- sylvatica. 1946, 84.
- trifolii. 1931, 209.
Physalospora festucae. 1946, 84; 1949, 120.
- moliniae. 1946, 84.
Pleospora albicans. 1937, 171.
- allii. 1937, 173.
- bardanae. 1937, 172.
- calvescens. 1937, 170.
- echinosphorae. 1949, 122.
- gilletiana. 1937, 172.
- gilletiana var. ulicis. 1937, 172.
- herbarum. 1937, 172 ; 1946, 22.
- infectoria. 1937, 171.
- jaapia. 1950, 52.
- leguminum. 1937, 173.
- media. 1937, 171 ; 1946, 22.
- samarae. 1937, 173.
- vagans. 1937, 170.
- vulgaris. 1937, 171.
Polystigma ochraceum. 1946, 19, 197.
Polystigma rubrum. 1933, 396 ; 1946, 19; 1954, 86.
Pseudorhytisma bistortae. 1946, 197.
Pyrenophora coppeyana. 1930, 235.
- euphorbiae. 1946, 85.
Rhytisma acerinum. 1933, 399.
- andromedae. 1933, 399.
- salicinum. 1933, 399.
Sarcoxylon atrum. 1927, 34.
Schizoxylon asphodeli. 1930, 239.
Solorina octospora. 1950, 165.
Stigmatea robertiani. 1933, 398 ; 1946, 85.
- confertissima. 1933, 398.
- depazeaeformis. 1946, 21, 197.
Systremma natans. 1952, 149 ; 1954, 99.
Trochila ilicis. 1933, 399.
Ustulina vulgaris. 1927, 35.
Venturia geranii. 1949, 122.
-- inaequalis. 1954, 63.
Xylaria hypoxylon. 1947, 41.
- polymorpha. 1951, 85.
- sicula. 1929, 78.
Zygnoella ossaea. 1930, 233.

III. ERYSIPHALES.

Les Erysiphales dans le Tarn. 1931, 260.
Erysiphe aquilegiae. 1933, 394.
- artemisiae. 1933, 394.
- cichoriacearum. 1931, 208 ; 1946, 10, 195 ; 1954, 84.
- communis. 1933, 395 ; 1946, 10, 195.
- communis var. fibigiae. 1946, 11.
- convolvuli. 1946, 11 ; 1954, 84.
- cruchetiana. 1946, 11.
- galeopsidis. 1931, 208 ; 1933, 394 ; 1946, 12 ; 1954, 84.
- galii. 1946, 195.
- graminis. 1946, 12 ; 1952, 389.
- horridula. 1946, 196 ; 1950, 49 ; 1954, 84.
- hyperici. 1946, 196.
- linkii. 1954, 84.
- martii. 1933, 395 ; 1946, 12 ; 1954, 83.

Erysiphe nitida. 1933, 394 ; 1954, 83.
- pisi. 1933, 395 ; 1946, 12.
- polygoni. 1946, 12.
- umbelliferarum. 1933, 395 ; 1946, 13 ; 1954, 83.
- urticae. 1946, 13, 196.
Leveillula taurica. 1946, 15 ; 1952, 390.
Lophodermium arundinaceum. 1946, 23, 82 ; 1949, 117.
- nervisequum. 1946, 197.
- pinastri. 1933, 398.
Microsphaera abbreviata. 1933, 393.
- alphitoides. 1946, 13.
- grossulariae. 1933, 393.
- hedwigii. 1933, 393.
- mougeotii. 1925, 438.
- quercina. 1950, 49.
Oidium. 1950, 49, 50 ; 1954, 85.
- abelmoschii. 1946, 18.
- erysiphoides. 1946, 18, 196.
- evonymi japonici. 1946, 18, 195 ; 1950, 50.
- verbenae. 1946, 18.
Phyllactinia corylea. 1925, 436.
- suffulta. 1950, 49 ; 1952, 394 ; 1954, 85.
Podosphaera leucotricha. 1925, 425 ; 1950, 49.
- myrtillina. 1933, 391.
- oxyacanthae var. tridactyla. 1925, 423.
Sawadaea tulasnei. 1933, 392.
Sphaerotheca castagnei. 1950, 49.
- fuliginea. 1946, 13 ; 1954, 82.
- fusca. 1933, 392 ; 1949, 122.
- humili. 1933, 391.
- macularis. 1933, 391.
- mors-uvae. 1933, 392.
- pannosa. 1925, 417 ; 1931, 208 ; 1946, 14.
- pannosa var. persicae. 1946, 14.
Sphaerostilbe polycephala. 1934, 330.
Trichocladia astragali. 1931, 208.
- tortilis. 1933, 395.
Uncinula aceris. 1946, 196.
- salicis. 1933, 392 ; 1954, 85.

IV. DISCOMYCETES.

Les Discomycètes dans la Marne. 1931, 245.
Les Discomycètes suboperculés. 1946, 218.

a) Discomycètes operculés.

Acetabula aestivalis. 1925, 460.
Aleuria (Boudier). 1937, 132 ; 1925, 395.
- granulosa f. laricina. 1932, 61.
- umbrina. 1947, 40.
- vesiculosa. 1951, 85.
Aleurodiscina, sect. nov. (Malençon). 1939, 60.
Anthracobia humillima. 1927, 97.
Ascophanus fuscolilacinus. 1926, 205.
Boudiera areolata var. anarcyspora. 1926, 204.
Ciliaria hirta var. aurantiaca. 1926, 203.
- hirtella. 1947, 40.
- lusatiae. 1945, 47.
- pseudotrechispora. 1946, 241.
- umbrorum var. cancrina. 1945, 52.
Cookeina sulpices. 1938, 111.
- tricholoma. 1938, 113.
Galactinia atroviolacea. 1954, 193.
- boltoni. 1937, 132.
- nivalis. 1932, 63.
- praetervisa. 1930, 105.
Geopyxis striatospora. 1936, 83.
Helvella crispa. 1935, 424.
- guepinoides. 1954, 425.
- mitra. 1954, 425.
- queletii var. alpina. 1932, 53.
Humaria coccinea var. maritima. 1926, 204.
- umbrosa. 1954, 188.
Lamprospora modestissima. 1926, 204.
- polytrichi. 1940, 39.
Leptopodia murina var. alpestris. 1932, 58.
- corbieroi. 1927, 95.
Macropodia minor. 1935, 424.
Malastiza miniata. 1937, 133 ; 1940, XIV.
Mitrophora hybrida. 1925, 68 ; 1931, 110 ; 1937, 132.
Morchella rotunda. 1942, 108.
- semilibera. 1927, 211.
Neotiella crozalsiana. 1925, 84.

Otidea concinna. 1938, 25.
- lilacina. 1932, 65.
- onotica. 1947, 41.
Peziza apiculata. 1939, 56.
- leucomelas. 1947, 40.
- olivacea. 1925, 398.
Plicaria leiocarpa. 1930, 107.
- planchonis var. ovalispora. 1926, 203.
- pomelii. 1928, 54.
Pulvinula pallida. 1951, 198.
Pustularia velata. 1954, 200.
Saccobolus citrinus. 1941, 54.
Sarcoscypha coccinea. 1930, 109 ; 1936, 334 ; 1947, 40.
- coccinea var. jurana. 1941, 50.
- protracta. 1925, 451.
Sarcosoma orientale. 1951, 101.
- rufum. 1951, 101.
Urnula melastoma. 1925, 474.
- platensis. 1939, 50.
Wynnea atrofusca. 1925, 442.

b) Discomycètes inoperculés.

Amphisphaeria acicola. 1949, 102.
Antinoa acuum. 1951, 205.
Belonidium albidum. 1928, 337.
- ochraceum. 1928, 336.
Belonioscypha chrysosperma. 1954, 207.
Bulgaria inquinans. 1947, 41.
Calloria gentianae. 1928, 336.
Celidium stictarum. 1928, 194; 1946, 198.
Cenangium furfuraceum. 1935, 425.
Ciboria asphodeli. 1928, 54.
Cudonia circinans. 1937, 259.
Dasyscypha flavo-virens. 1932, 71.
- fusco-sanguines. 1932, 73.
Helotium rimosum. 1927, 103.
- sulphuratum. 1954, 204.
Hyaloscypha uncipila. 1954, 214, 217.
Diplocarpon rosae. 1946, 198.
Fabraea maculata. 1952, 389.
- ranunculi. 1931, 209.
Lasiostictis fimbriata. 1930, 238.
Leotia lubrica. 1947, 40.
Melachroia livida. 1927, 101.
Mitrula rehmi. 1932, 68.
Mollisia rabenhorstii. 1946, 10.
Ombrophila palumbina. 1927, 98.
Orbilia coccinella var. versicolor. 1928, 336.
- polyspora. 1926, 205.
Pseudopeziza caricum. 1928, 338.
Pseudopeziza medicaginis. 1933, 400.
- terebinthi. 1928, 338.
- teucrii. 1928, 338.
- trifolii. 1933, 399.
Pyrenopeziza heteroparaphysata. 1928, 337.
Schizoxylon asphodeli. 1930, 239.
Sclerotinia. 1936, 63.
- fructigena. 1933, 400.
- tuberosa. 1930, 110.
Spathularia flavida. 1928, 78.
Stenocybe major var. bryophila. 1928, 339.
- major var. macvicaris. 1926, 207.
Stictis elegans. 1926, 206.
- ilicina. 1928, 337.
Trichopeziza hepaticola. 1925, 84.
Urceolella ilicis. 1926, 206.

V. ASCOMYCETES HYPOGES ou TUBERALES.

Tubéfales des Alpes-Maritimes. 1938, 25.
Sur les Terfez. 1950, 109.
Choeromyces meandriformis. 1938, 25.
Genea klotzchii. 1938, 24.
Geopora michaelis. 1925, 343.
Tuber blotii. 1930, 149.

VI. TAPHRINALES ou EXOASCALES.

Exoascales dans la Marne. 1931, 244.
- dans le Tarn. 1931, 260.
Exoascus alni incanae. 1933, 396.
- rostrupianus. 1931, 208 ; 1950, 49.
- tosquineti. 1946, 197.
Taphrina aurea. 1933, 396 ; 1954, 82.
- deformans. 1946, 10 ; 1952, 387.
- rostrupiana. 1954, 82.
- sadebeckii. 1946, 196.

VII. LABOULBENIALES.

Laboulbenia colasi. 1942, 190.
Rhacomyces. 1942, 57 ; (Clé) 60.
- anophtalmi. 1942, 63.
- aphaenopsis. 1942, 61.
- aphaenopsis var. jeanneli. 1942, 62.
- bolivari. 1942, 68.
- canariensis. 1942, 72.
- capucinus. 1942, 64.
- deayi. 1942, 71.
- fagniezi. 1942, 74.
- furcatus. 1942, 76.
- girardi. 1947, 205.
- glyptomeri. 1942, 78.
- grassei. 1942, 73.
Rhacomyces hypogaeus. 1942, 65.
- jeanneli. Voir R. aphaenopsis var. jeanneli. 1942, 62.
- maublanci. 1942, 73.
- pallidus. Voir R. stipitatus var. pallidus. 1942, 70.
- peyerimhoffi. 1942, 67.
- philonthinus. 1942, 78.
- pilosellus. 1942, 77.
- proliferans. 1942, 76.
- reymondi. 1942, 66.
- stipitatus. 1942, 69.
- stipitatus var. pallidus. 1942, 70.
- tenenbaumi. 1942, 71.
- urbaini. 1942, 75.
- vayssierei. 1942, 65.

U S T I L A G I N A L E S

Ustilaginales dans le Tarn. 1931, 262.
- en Champagne crayeuse. 1931, 195.
Cintractia arenaria. 1953, 403.
- angulata. 1953, 404.
- caricis. 1927, 63 ; 1953, 403.
- chinensis. 1935, 113.
- limitata. 1951, 133.
- scleriicola. 1948, 167.
- subinclusa. 1953, 404.
Coniodyctium chevalieri. 1953, 77.
Cryptobasideae, nov. fam. ; comprend les genres :
Botryoconis = Cryptobasidium
Clinocodium
Coniodyctium = Hyalodema
Drepanoconis
1953, 96.
Doassansia alismatis. 1931, 199.
- sagittariae. 1931, 199.
Entyloma bicolor. 1931, 198.
- calendulae. 1931, 198 ; 1953, 404.
- eryngii. 1931, 198.
- fergussoni. 1953, 404.
- gaudinea. 1953, 336.
- hieracii. 1933, 413.
- ranunculi. 1953, 405.
Farysia olivacea. 1953, 405.
- jaapii. 1953, 405.
Ginanniella primulicola. 1953, 405.
Graphiola phaenicis. 1931, 199.
Mycosyrinx microspora. 1948, 166 ; 1951, 134.
Schizonella cocconii. 1953, 405.
Schroeteria decaisneana. 1931, 199.
- delastrina. 1931, 199.
Sclerotium nov. sp. 1951, 138.
- rhinanthi. 1950, 66.
Sorosporium saponariae. 1931, 199 ; 1953, 408 ; 1954, 68.
Sphacelotheca andropogonis. 1953, 409.
- bosniaca. 1927, 62.
- inflorescentiae. 1927, 62.
- panici-miliacei. 1937, 343.
- schweinfurthiana. 1953, 409.
Thecaphora deformans. 1949, 123.
- hyalina. 1931, 199.
- seminis-convolvuli. 1953, 409.
Tilletia controversa. 1950, 67.
- heterospora. 1951, 135.

Tilletia olida. 1953, 410.
- sphenopodis. 1946, 25.
- striaeformis. 1931, 198.
- tritici. 1931, 198 ; 1946, 25.
Tuburcinia agropyri. 1953, 410.
- agropyri-juncei. 1953, 336.
- anemones. 1953, 410 ; 1954, 68.
- antipolitana. 1950, 68.
- avenastri. 1953, 410.
- colchici. 1953, 411.
- macrospora. 1953, 411.
- muscaridis. 1953, 411.
- oblonga. 1953, 411.
- occulta. 1953, 412.
- pulsatillae. 1953, 412.
- ranunculi. 1946, 198 ; 1953, 412.
- sesleriae. 1953, 338.
- syncocca. 1953, 413.
- violae. 1953, 413.
Urocystis agropyri. 1931, 199.
- anemones. 1927, 63 ; 1931, 198.
- colchici. 1931, 198.
- ornithogali. 1931, 198.
Ustilago abstrusa. 1929, 252.
- avenae. 1927, 62 ; 1931, 196, 212 ; 1953, 413.
- bistortarum. 1927, 61.
- bouriqueti. 1934, 327.
- bromivora. 1946, 23 ; 1953, 413.
- capensis. 1929, 254.
- caricis. 1931, 196.
- cynodontis. 1946, 23.
- denotarisii. 1953, 415.
- echinata. 1931, 196.
- flosculorum. 1933, 413.
- holci-avenacei. 1953, 414.
Ustilago hordei. 1931, 197 ; 1953, 414.
- hypodytes. 1931, 197 ; 1953, 414.
- hypogaea. 1931, 195.
- ischaemi. 1927, 280.
- laevis. 1931, 197.
- longissima. 1931, 197 ; 1933, 412 ; 1953, 414.
- lychnidis-dioicae. 1953, 416.
- maydis. 1931, 196.
- nuda. 1931, 197.
- olivacea. 1931, 196 ; 1937, 339.
- olivacea var. macrospora. 1937, 341.
- panici-miliacei. 1931, 196.
- passerini. 1946, 23.
- perennans. 1931, 197.
- reticulata. 1933, 412.
- scolymi. 1937, 342.
- scorzonerae. 1931, 195 ; 1953, 414.
- silenes inflatae. 1933, 412 ; 1953, 416.
- speggazzinii var. agrestis. 1952, 398.
- stellariae. 1953, 416.
- striiformis. 1953, 414.
- subinclusa. 1931, 196.
- tragopogoni. 1931, 195.
- tritici. 1931, 198.
- urgineae. 1946, 24.
- vaillantii. 1931, 195 ; 1953, 415.
- violacea. 1927, 62 ; 1931, 195, 212 ; 1933, 412 ; 1953, 415, 416.
- vinosa. 1927, 62.
- vuijckii. 1929, 253.

U R E D I N A L E S

Urédinées dans le Tarn. 1931, 262.
- (Biologie des spores). 1943, 78.
- (Formation des conidies). 1944, 47.
- (Philogénie). 1951, 173.
- (Terminologie). 1934, 130.

A. Mélampsoracées.

Calytospora goeppertianum. 1927, 93.
Hyalopsora adianti capilli-veneris. 1952, 389.
- aspidiotus. 1933, 420.
- polypodii. 1931, 213 ; 1951, 52.
Melampsora allii-fragilis. 1946, 198 ; 1954, 78.
- allii-populina. 1946, 32.
- alpina. 1927, 92 ; 1951, 52.
- amygdalinae. 1931, 191.
- artica. 1927, 93.
- euphorbiae cyparissiae. 1951, 52.
- euphorbiae dulcis. 1927, 92 ; 1933, 420 ; 1954, 78.
- euphorbiae exiguae. 1951, 52.
- euphorbiae gerardianae. 1950, 48.
- euphorbiae pepli. 1946, 33.
- evonymi capraearum. 1929, 211 ; 1933, 420 ; 1951, 53.
- gelmii. 1929, 211.
- helioscopiae. 1927, 92 ; 1931, 191 ; 1946, 33, 199 ; 1950, 48 ; 1951, 53 ; 1954, 78.
- hypericorum. 1927, 92 ; 1950, 47 ; 1951, 53.
- larici capraearum. 1931, 214 ; 1950, 48 ; 1954, 77.
- larici epitea. 1927, 93.
- larici populina. 1954, 78.
- lini. 1927, 92 ; 1931, 191 ; 1951, 53 ; 1952, 391.
- orchidi-repentis. 1927, 92 ; 1929, 211.
- populina. 1931, 191.
- pulcherrima. 1946, 33.
- ribesii-purpureae. 1927, 93.
- ribesii-viminalis. 1927, 92; 1946, 199.
- rostrupii. 1951, 53.
- salicina. 1931, 192.
- salicis albae. 1954, 77.
Melampsorella symphiti. 1931, 192.
Melampsoridium betulinum. 1933, 420 ; 1951, 53.
Pucciniastrum abieti chamaenerii. 1950, 48.
- agrimoniae. 1931, 190 ; 1954, 78.
Pucciniastrum agrimoniae eupatoriae. 1946, 199 ; 1952, 395.
Pucciniastrum circaeae. 1929, 210 ; 1933, 419.
- goeppertianum. 1929, 210.
- padi. 1929, 211.
- pirolae. 1927, 93.
Thekospora areolata. 1946, 199.
- vacciniorum. 1927, 93 ; 1933, 420.
Uredo bosquieae. 1951, 434.
- cissi-debilis. 1954, 417.
- clerodendricola. 1954, 418.
- concentrica. 1931, 195.
- limbata. 1931, 194.
- lindackeriae. 1954, 418.
- markamiae. 1951, 434.
- newbouldiae. 1951, 435.
- pirolae. 1929, 215.
- trachyphrinii. 1954, 419.
- ulicis. 1928, 91.

B. Coleosporiacées.

Caeoma alliorum. 1929, 215.
- ari-italici. 1929, 215.
- pulcherrimum. 1929, 214.
Coleosporium cacaliae. 1927, 93 ; 1951, 51 ; 1954, 78.
- campanulae. 1927, 94 ; 1931, 193 ; 1933, 419 ; 1946, 198 ; 1951, 51 ; 1952, 387.
- euphrasiae. 1927, 94 ; 1931, 193, 212 ; 1933, 419 ; 1951, 51 ; 1954, 79.
- inulae. 1927, 94 ; 1946, 33 ; 1952, 388.
- melampyri. 1931, 193 ; 1933, 419.
- petasitis. 1931, 192, 212.
- pulsatillae. 1931, 192.
- senecionis. 1927, 94 ; 1931, 193, 212 ; 1951, 51.
- sonchi. 1931, 193.
- tussilaginis. 1927, 94 ; 1931, 193 ; 1951, 51.
Gallowaya pinicola. 1926, 175.

C. Cronartiacées.

Chrysomyxa rhododendri. 1927, 91 ; 1950, 49 ; 1951, 51.
Cronartium asclepiadeum. 1927, 91 ; 1929, 211 ; 1931, 194.
- flaccidum. 1931, 213 ; 1951, 52.
- ribicolum. 1929, 211 ; 1931, 194.

Endophyllum centranthi rubri. 1929, 116, 211.
- euphorbiae characiatis. 1929, 106, 117, 211.
- euphorbiae nicaeensis. 1929, 110, 117, 211.
- euphorbiae silvaticae. 1929, 115 ; 1951, 52.
- sempervivi. 1929, 115 ; 1931, 194.
- uninucleatum. 1929, 116.
- valerianae tuberosae. 1929, 116, 211.

Phakopsora brideliae. 1954, 414.
- phillanthi-discoidei. 1954, 416.

Pucciniosira anthocleistae. 1951, 127.

D. Pucciniacées.

Achrotelium urerae. 1954, 410.

Aecidium = Gymnosporangium asperifolii. 1951, 51.
- bomolense. 1951, 128.
- charantiae. 1951, 128.
- cissicola. 1948, 169.
- clematidis. 1951, 51.
- dorsteniae walleri. 1948, 171.
- endophylloides. 1929, 114, 211.
- euphorbiae. 1953, 228.
- euphorbiae gerardianae. 1929, 213.
- gynurae-cernuae. 1954, 411.
- hibisci-surrattensis. 1951, 131.
- isopyri. I951, 51.
- le testuanum. 1948, 172.
- ligulariae. 1933, 421.
- microglossae. 1954, 412.
- narcissi. 1929, 213.
- nummulare. 1951, 132.
- petasis. 1933, 421.
- phyllanthi-floribundi. 1954, 412.
- pulmonariae. 1933, 421.
- ranunculacearum. 1954, 79.
- rhamni. 1954, 79.
- schwenkiae. 1954, 413.
- scillae. 1929, 213.
- serratae. 1929, 211.
- sonchi. 1950, 49.
- tranzschelianum. 1929, 211.
- triumfettae. 1954, 413.
- tylophorae. 1951, 132.
- valerianellae. 1953, 224.

Aecidium violae. 1950, 61.
- vapoensis. 1954, 413.

Goplana cissi. 1951, 429.

Gymnosporangium amelanchieris. 1927, 90 ; 1954, 75.
- clavariiforme. 1927, 90 ; 1931, 190, 213 ; 1946, 31 ; 1951, 52 ; 1954, 75.
- confusum. 1927, 90.
- juniperi. 1927, 91 ; 1929, 210 ; 1931, 190, 213 ; 1933, 418 ; 1950, 47 ; 1951, 52 ; 1954, 75.
- sabinae. 1927, 91 ; 1931, 190.
- torminali-juniperum. 1951, 52.
- tremelloides. 1927, 91 ; 1931, 190 ; 1954, 75.
- ulmariae. 1954, 75.

Hapalophragmium milletiae-rhodanthae. 1951, 430.

Hemileia coffeicola. 1934, 195.
- mussaendae. 1951, 431.
- pavetticola. 1938, 48.
- scholzii. 1951, 116.
- vastatrix. 1934, 193.

Kuhneola albida. 1950, 47 ; 1951, 52.

Phragmidium disciflorum. 1931, 214 ; 1946, 32.
- fragariastrii. 1931, 214 ; 1951, 53.
- fusiforme. 1927, 87 ; 1929, 210 ; 1933, 418 ; 1951, 53.
- potentillae. 1927, 88 ; 1951, 53 ; 1954, 77.
- rosae-pimpinellifoliae. 1927, 88 ; 1950, 47 ; 1954, 77.
- rubi. 1933, 418 ; 1946, 32 ; 1954, 76.
- rubi-idaei. 1927, 90 ; 1931, 214.
- sanguisorbae. 1931, 214 ; 1954, 76.
- subcorticium. 1927, 90 ; 1950, 47 ; 1951, 54 ; 1954, 77.
- tormentillae. 1951, 54.
- violaceum. 1946, 32 ; 1950, 47 ; 1951, 54 ; 1954, 76.

Pileolaria terebinthi = Uromyces terebenthi. 1929, 210 ; 1946, 27.

Puccinia absinthii. 1931, 177.
- acetosae. 1931, 180 ; 1951, 54.

Puccinia acroptili. 1946, 27.
- actaeae-agropyri. 1927, 71.
- adoxae. 1929, 200.
- aecidii-leucanthemi. 1929, 205.
- aegilopsis. 1946, 27.
- aegopodii. 1929, 200 ; 1931, 177.
- agropyri. 1931, 215.
- agrostidis. 1929, 205 ; 1951, 54.
- allii. 1951, 54.
- alnetorum. 1948, 185.
- alpestris. 1927, 71.
- alpina. 1927, 72 ; 1929, 198.
- annularis. 1929, 203 ; 1931, 180, 219 ; 1951, 54.
- antirrhini. 1937, 165 ; 1946, 27 ; 1951, 54.
- arenariae. 1927, 72 ; 1931, 175, 214 ; L950, 44 ; 1951, 54.
- aristolochiae. 1929, 204 ; 1950, 45.
- aroniae-scorpioides. 1927, 72.
- arvernensis. 1929, 198.
- asarina. 1929, 204.
- asparagi. 1931, 181.
- asperulae cynanchiae. 1929, 200 ; 1951, 54.
- asperulae odoratae. 1929, 200.
- asphodeli. 1929, 204 ; 1950, 45.
- asteris. 1927, 72.
- astrantiae. 1929, 200.
- athamanthae. 1931, 176 ; 1954, 70.
- bakoyana. 1951, 117.
- balsamitae. 1929, 201.
- baphiae. 1951, 431.
- bardanae. 1931, 178.
- baryana. 1927, 73 ; 1951, 55.
- batatae. 1951, 120.
- betonicae. 1929, 202 ; 1933, 416.
- bistortae. 1951, 54 ; 1954, 74.
- brigantiaca. 1927, 73.
- bromina. 1931, 185 ; 1950, 46.
- brunellarum moliniae. 1929, 205.
- bulbocastani. 1931, 177.
- bullata. 1931, 176.
- bupleuri falcati. 1927, 75 ; 1931, 176.
- buxi. 1929, 204 ; 1931, 180; 1951, 54.

Puccinia calcitrapae. 1931, 178.
- calthae. 1927, 76 ; 1929, 198 ; 1931, 175.
- cardui pycnocephali. 1946, 28.
- carduorum. 1927, 76 ; 1931, 178 ; 1951, 55.
- cari-bistortae. 1927, 76.
- caricis. 1927, 76 ; 1931, 182 ; 1950, 55.
- carlinae. 1954, 71.
- carthami. 1946, 28 ; 1952, 327.
- celakowskyana. 1954, 71.
- centaureae. 1927, 77 ; 1943, 82 ; 1946, 28 ; 1951, 55 ; 1954, 72.
- centaureae asperae. 1943, 82.
- cerinthes-agropyrina. 1953, 220.
- chaerophylli. 1931, 177 ; 1954, 70.
- chlorocrepidis. 1927, 77.
- cichorii. 1931, 178.
- circaeae. 1929, 199 ; 1931, 176 ; 1933, 415 ; 1951, 55.
- circumacta. 1949, 71.
- cirsii-lanceolati. 1929, 77 ; 1931, 178 ; 1933, 417 ; 1950, 44 ; 1951, 55.
- clematidis-secalis. 1948, 181 ; 1953, 231.
- conii. 1931, 177.
- coronata. 1931, 184 ; 1949, 123 ; 1951, 55.
- coronifera. 1954, 69.
- cousiniae. 1946, 28.
- crepidicola. 1927, 79.
- crepidis. 1931, 179.
- crepidis montanae. 1927, 80.
- crepidis pygmaeae. 1951, 55.
- crucianellae. 1929, 200.
- cruciferarum. 1929, 198.
- cyani. 1933, 417.
- cynodontis. 1951, 55.
- digitariae-velutinae. 1951, 432.
- dioicae. 1927, 80 ; 1931, 182.
- dispersa. 1931, 185 ; 1946, 200.
- divergens. 1946, 29.
- doronici. 1933, 416.
- enormis. 1927, 80.
- epilobii. 1931, 176.

Puccinia epilobi var. fleischeri. 1927, 80.
- epilobi tetragoni = pulverulenta. 1927, 80 ; 1931, 215 ; 1954, 69.
- epilobi tetragoni f. sp. epilobi hirsuti. 1950, 44 ; 1951, 58; 1954, 69, 70.
- epilobi tetragoni var. subalpina. 1927, 80.
- festucae. 1927, 82 ; 1950, 45.
- flahaulti. 1954, 432.
- frankeniae. 1929, 198 ; 1952, 395.
- fusca. 1931, 173.
- galii. 1927, 82 ; 1931, 177.
- gentianae. 1927, 82 ; 1929, 202 ; 1931, 179, 219 ; 1933, 416 ; 1954, 73.
- gladioli. 1946, 29 ; 1953, 224.
- glechomatis. 1929, 202 ; 1931, 180 ; 1943, 79 ; 1951, 56.
- glumarum. 1931, 185 ; 1950, 46.
- graminis. 1927, 82 ; 1931, 184 ; 1933, 418 ; 1946, 200; 1951, 56 ; 1952, 389 ; 1954, 75.
- grisea. 1931, 180.
- heraclei. 1927, 83.
- hieracii. 1927, 83 ; 1946, 201 ; 1950, 45 ; 1951, 56.
- holcicola. 1952, 395.
- holcina. 1946, 200 ; 1951, 56.
- iridis. 1929, 205 ; 1931, 181.
- jaceae. 1931, 178 ; 1946, 29; 1951, 57.
- jasmini. 1929, 201.
- laguri-chamaemoly. 1949, 66.
- lampsanae. 1931, 179 ; 1951, 57.
- lantanae. 1951, 120.
- leontodontis. 1927, 83 ; 1931, 179.
- liliacearum. 1929, 205 ; 1931, 181.
- lojkajana. 1929, 205.
- lolii. 1931, 184 ; 1933, 418.
- lycoctoni. 1927, 83 ; 1929, 198.
- magnusiana. 1929, 205 ; 1931, 183.
- magnusii. 1931, 182.
- malvacearum. 1931, 175, 219; 1946, 30 ; 1950, 44 ; 1951, 57 ; 1954, 69.
Puccinia mamillata. 1933, 415.
Puccinia menthae. 1927, 83 ; 1929, 202 ; 1931, 180, 219 ; 1933, 416 ; 1946, 30, 201 ; 1954, 73, 74.
- milii-effusi. 1945, 61.
- mirabilissima. 1936, 239 ; 1937, 175 ; 1950, 43 ; 1951, 57.
- montana. 1927, 84 ; 1929, 201 ; 1946, 30.
- morthieri. 1927, 84.
- mougeotii..1927, 84.
- mulgedii. 1929, 201 ; 1946, 201.
- notobasis. 1946, 30.
- oahuensis. 1951, 123.
- obliquo-septata. 1954, 417.
- oblongata. 1931, 181.
- obscura. 1951, 57.
- obtegens. 1931, 178, 220 ; 1950, 45 ; 1954, 72.
- odontolepidis. 1954, 72.
- olyrae-latifoliae. 1954, 417.
- orchidearum-phalaridis. 1931, 183.
- oreoselini. 1954, 70.
- passerinii. 1931, 180.
- perennis. 1931, 179.
- persistans. 1929, 205 ; 1931, 185.
- petroselini. 1931, 176, 219.
- phalaridis. 1931, 183 ; 1950, 45.
- phragmitis. 1931, 183 ; 1952, 395.
- pimpinellae. 1931, 177 ; 1951, 57.
- poae sudeticae. 1951, 58.
- poarum. 1927, 84 ; 1931, 183 ; 1933, 418 ; 1951, 58.
- podospermi. 1927, 84 ; 1951, 58.
- polygoni. 1931, 181.
- polygoni alpini. 1927, 84 ; 1951, 58.
- polygoni amphibii. 1931, 181 ; 1933, 415 ; 1950, 44 ; 1954, 74.
- polygoni vivipari. 1927, 85.
- prenanthis purpureae. 1927, 85 ; 1929, 201 ; 1933, 416 ; 1951, 58.

Puccinia primulae. 1929, 201.
- pringshemiana. 1931, 182.
- prostii. 1952, 395.
- pruni-spinosae. 1931, 181.
- ptarmicae. 1929, 200.
- pulsatillae. 1927, 85.
- pumilae coronata. 1950, 66.
- punctata. 1931, 219 ; 1933, 416 ; 1946, 200 ; 1951, 58.
- rhagadioli. 1946, 31.
- ribis. 1927, 85 ; 1931, 76.
- ribis nigri acutae. 1931, 182.
- rimosa. 1929, 205.
- rubrigo-vera. 1931, 185 ; 1951, 59.
- rumicis scutati. 1927, 85 ; 1950, 45 ; 1951, 59 ; 1952, 395 ; 1954, 74.
- salviae. 1927, 85.
- saniculae. 1951, 59.
- santolinae. 1946, 31.
- saxifragae. 1927, 85.
- scaliana. 1951, 59 ; 1954, 72.
- scandina. 1950, 66.
- scirpii. 1929, 205 ; 1931, 182.
- scolymi. 1946, 31.
- scorzonerae. 1927, 85.
- sessilis. 1931, 183.
- simplex. 1931, 181.
- smyrnii olusatri. 1929, 200 ; 1950, 44.
- soldanellae. 1927, 85 ; 1929, 201.
- sonchi. 1931, 179.
- suaveolens. 1927, 85.
- sweertiae. 1927, 86.
- symphiti-bromorum. 1951, 59.
- tenaceti. 1931, 177 ; 1954, 73.
- taraxaci. 1927, 86 ; 1933, 417 ; 1951, 59 ; 1954, 73.
- thesii. 1931, 180.
- thlaspeos. 1951, 59 ; 1954, 68.
- thunbergiae. 1951, 125.
- tinctoriicola. 1929, 201.
- tragopogoni. 1929, 201 ; 1931, 179 ; 1951, 59.
- triseti. 1927, 86 ; 1951, 60.
- triticina. 1931, 185.
- uliginosa. 1933, 417.
- umbilici. 1929, 200.
- urticae-acutiformis. 1951, 60.
- urticae-caricis. 1954, 74.

Puccinia valantiae. 1931, 219.
- valantiae f. sp. galii verni. 1951, 60 ; 1954, 71.
- variabilis. 1927, 86 ; 1931, 179.
- veratri. 1929, 205 ; 1933, 418.
- veronicae. 1951, 60.
- varonicarum. 1951, 60.
- verruca. 1931, 178.
- vincae. 1929, 202 ; 1931, 179.
- violae. 1927, 86 ; 1931, 175, 215 ; L946, 200 ; 1951, 60 ; 1954, 69.
- virectae. 1951, 432.
- virga-aurea. 1929, 201 ; 1951, 60.
- xanthii. 1942, 192.
- ziziphorae. 1946, 31.
- zopfii. 1929, 198 ; 1933, 415.
- zorniae. 1951, 126.

Sphaerophragmium millitiae.1951, 433.
- monodorae. 1951, 433.

Triphragmium echinatum. 1929, 210.
- ulmariae. 1931, 220 ; 1951, 60 ; 1954, 75.

Uromyces acetosae. 1931, 188 ; 1943, 84, 86 ; 1946, 199.
- aconiti-lycoctoni. 1927, 64 ; 1954, 79.
- alliorum. 1931, 188.
- alpestris. 1929, 208 ; 1951, 61 ; 1954, 82.
- alchemillae. 1927, 67 ; 1933, 414.
- anthyllidis. 1927, 67 ; 1931, 186 ; 1946, 200 ; 1951, 61.
- appendiculatus. 1931, 187 ; 1946, 25.
- arenariae-leptoclados. 1953, 339.
- armeriae. 1929, 208 ; 1951, 61.
- aspiliella. 1951, 435.
- behenis. 1931, 186 ; 1951, 61.
- betae. 1931, 187.
- borealis. 1929, 175.
- cacaliae. 1927, 67 ; 1929, 206 ; 1951, 61.
- charmelii. 1929, 207.
- dactylidis. 1927, 67.
- dactylidis f. sp. silvatici. 1951, 61.
- doricus. 1930, 230.

Uromyces erythronii. 1929, 210.
- excavatus. 1927, 67 ; 1931, 188 ; 1951, 61.
- fabae. 1927, 67 ; 1931, 187, 220 ; 1933, 414 ; 1954, 81.
- fabae f. sp. viciae-sepium. 1951, 62 ; 1954, 81.
- ficariae. 1931, 186.
- fischeri-eduardi. 1953, 229.
- flavicomae. 1929, 123, 209.
- genistae-tinctoriae. 1931, 186 ; 1933, 414 ; 1946, 199 ; 1952, 398 ; 1953, 230 ; 1954, 81.
- geranii. 1927, 68 ; 1929, 206 ; 1931, 186 ; 1954, 80.
- hedysari-obscuri. 1927, 68.
- hippocrepidis. 1951, 62 ; 1954, 81.
- hordeastri. 1949, 123.
- hybernae. 1929, 121, 209 ; 1933, 413.
- inaequialtus. 1954, 80.
- junci. 1931, 189.
- kabatianus. 1931, 186.
- kochianus. 1951, 62.
- laevis. 1929, 209.
- lilii. 1929, 210 ; 1951, 62.
- limonii. 1929, 208 ; 1950, 46.
- loti. 1931, 62.
- melosporus. 1927, 68.
- minor. 1954, 81.
- monspessulanus. 1929, 209.
- onobrychidis. 1927, 68.
- onidis. 1927, 68 ; 1931, 62.
- orobi. 1931, 62 ; 1933, 414.
- ornithogali. 1929, 210 ; 1931, 188.
- petitmenginii. 1930, 230.
- phyteumatum. 1929, 69 ; 1929, 207.
- pisi. 1927, 69 ; 1931, 189 ; 1933, 414 ; 1954, 81, 82.
- poae. 1931, 189 ; 1951, 62.
- polygoni. 1927, 70 ; 1931, 187 ; 1933, 413.
- polygoni var. alpestris. 1946, 25.
- proeminens. 1929, 209.
- prunellae. 1929, 206.
- reticulatus. 1929, 209.
- rumicis. 1927, 70 ; 1931, 187 ; 1943, 84 ; 1951, 62.
- rumicis var. tingitani. 1952, 398.
- salsolae. 1929, 208.

Uromyces scillarum. 1929, 209.
- scrophulariae. 1929, 208 ; 1931, 220.
- scutellatus. 1927, 70 ; 1929, 125 ; 1931, 188 ; 1950, 46 ; 1951, 62.
- scutellatus (Clef analytique). 1929, 126.
- silenes. 1927, 70.
- solidaginis. 1927, 70.
- striatus. 1931, 189 ; 1946, 26 ; 1953, 229.
- striatus var. pisi. 1953, 231.
- striolatus. 1927, 70.
- subleavis. 1929, 209 ; 1946, 26.
- suffructicosae. 1953, 341.
- terebenthi. 1950, 46 ; 1954, 80.
- thaspi. 1927, 70.
- trifolii. 1927, 70 ; 1946, 26.
- trifolii repentis. 1946, 26.
- tuberculatus. 1929, 209 ; 1931, 188.
- valerianae. 1927, 70 ; 1931, 187 ; 1933, 414 ; 1951, 63.
- veratri. 1927, 71 ; 1951, 63 ; 1954, 81.
- verruculosus. 1929, 206 ; 1931, 186.
- viciae sepium. Voir U. fabae var. viciae sepium. 1951, 62 ; 1954, 81.

Zaghouania phillyreae. 1929, 210 ; 1951, 63.

I. Auriculariacées.

Auricularia auricula-judae = Hirneola. 1946, 102 ; 1953, 245.
- auriformis. 1933, 331.
- mesenterica. 1937, 102 ; 1946, 102.
- nigrescens. 1936, 334.

Platygloea. 1954, 118.
- peniophora f. subeffusa. 1932, 205.

Saccoblastia pinicola f. alniviridis. 1932, 204.

Septobasidium accumbens. 1925, 338.
- gossypinum. 1925, 341.
- michelianum. 1952, 301.

Septobasidium pteruloides. 1925, 337.

II. Tremellacées.

Bourdotia caesio-cinerea. 1954, 121.
- cinerea. 1937, 102.
- deminuta. 1954, 122.
- galzini. 1954, 124.
Eichleriella leucophaea. 1937, 101.
- spinulosa. 1933, 332 ; 1935, 421 ; 1952, 302.
Exidia glandulosa. 1933, 332 ; 1947, 39.
- impressa. 1951, 85.
- intumescens. 1933, 332.
- recisa. 1947, 39.
- thuretiana. 1954, 119.
Guepinia helvelloides. 1948, 251.
Merisma cristatum = Sebacina. 1928, 77.
Ombrophila palumbina = Ditangium. 1927, 98.
Protohydnum lividum. 1932, 205.
- piceicolum. 1932, 205.
Sebacina calcea. 1933, 332 ; 1935, 421 ; 1937, 101 ; 1954, 120.
- calcea var. corticioides. 1954, 121, 156.
- crozalsii. 1937, 135.
- grisea. 1937, 258 ; 1952, 302.
Tremella albida. 1952, 301.
- foliacea. 1933, 332 ; 1952, 301.
- glacialis. 1946, 102.
- mesenterica. 1932, 205 ; 1946, 102.
- moriformis. 1946, 102.
- nigrescens. 1946, 102.
Tremellodon crystallinum. 1937, 258.
- gelatinosum. 1946, 102.

III. Tulasnellacées.

Tulasnella eichleriana var. lilaceo-cinerea. 1932, 207.
- violea. 1952, 304.
- violea var. incarnata. 1954, 126.

IV. Calocéracées = Dacrymycétacées.

Calocera cornea. 1935, 421 ; 1951, 84 ; 1952, 303.
- palmata. 1954, 425.
- viscosa. 1946, 102.
Dacryomyces chrysocomus. 1952, 303.
- deliquescens. 1932, 206 ; 1937, 132.
- deliquescens f. stipitatus = Ditiola fagi. 1932, 206.
- palmatus. 1933, 331.
- punctiformis. 1954, 125.
- radicatus. 1937, 101.
- stillatus. 1952, 303.
Dacryomitra pusilla. 1952, 303.
Ditiola conformis = Dacryomyces. 1933, 331.
Femsjonia luteo-alba. 1932, 206; 1933, 331.

V. Exobasidiacées.

Exobasidium karsteni. 1933, 412.
- rhododendri. 1954, 82.
- vaccini uliginosi. 1933, 412.

VI. Aphyllophorales.

Groupe I. Clavariacées.

Développement des Clavariacées. 1953, 389.
Clavaria abietina. 1932, 207.
- apiculata. 1933, 331.
- argillacea. 1939, 216.
- argillacea var. obtusata. 1939, 218.
- aurea. 1933, 49.
- cedretorum var. marocana. 1934, 140.
- corniculata. 1946, 100.
- cristata = Clavulina. 1933, 50 ; 1937, 101 ; 1946, 100; 1952, 306.
- epichnoa. 1932, 208.
- falcata. 1946, 100 ; 1952, 304.
- fennica. 1932, 207.
- formosa = ramaria Quél. 1951, 84 ; 1952, 304.

Clavaria fumosa. 1933, 331.
- fusiformis. 1951, 84.
- geoglossoides. 1946, 100.
- inaequalis. 1946, 100.
- juncea. 1952, 305.
- neuhoffii. 1908, 44.
- nivosaspora. 1948, 29.
- rosea. 1911, 305 ; 1926, 414.
- setosa. Voir C. strobilacea var. setosa. 1908, 118.
- spinosa. 1910, 108.
- strobilacea var. pseudoneglecta. 1907, 100.
- subulata. 1910, 36.
- tuposa. 1951, 84.
- xanthospicula. 1938, 215.
- zollingeri. 1951, 84.
- zuccina. 1952, 307.
- amoena. 1944, 80.
- neglectaeformis. 1944, 100.
Pleurotella fulgida. 1952, 306.
- micans. 1952, 308.
- pusilla. 1943, 31.
- pusillaris. 1937, 225 ; 1952, 308.
- serpens. 1951, 100.
Pleurotus mutilus. 1907, 101 ; 1952, 304.
Sparassis crispa. 1946, 100.
Typhula erythropus. 1937, 101.
- oleae. 1922, 52.
- pallens. 1928, 53.
- phacorrhiza. 1907, 101.

Groupe 1. Recouvrés.

A. Corticés.

Aleurodiscus amorphus. 1913, 101.
- atlanticus. 1914, 107.
- atlanticus var. luteus. 1914, 108, 156.
- auranticus. 1914, 106.
- candidus. 1931, 214 ; 1933, 108.
- cerussatus. 1951, 71.
- dubiosus. 1951, 118.
- duflosus. 1910, 108.
- elyae. 1914, 110.
- mirabilis. 1914, 110, 154.
- polygoni-amphibii. 1914, 110.
- pr. pruinus. 1911, 108 ; 1937, 238.
- roseus. 1935, 414 ; 1937, 93; 1954, 133.
Aleurodiscus subtilissimus. 1906, 111.
Asterostromella cuta = Vararia pellescens. 1952, 320.
- granulosa. 1907, 91, 328 ; 1946, 404 ; 1947, 388.
- lilacinella. 1911, 109.
Corticium n. genre. 1951, 194.
- arcuatum. 1951, 194.
Cotylopsora cruda f. cruda. 1915, 284 ; 1954, 149.
- atrocitrina. 1949, 96.
- cerulea. 1910, 100 ; 1915, 283 ; 1951, 118.
- cerebella. 1910, 285.
- fumosa. 1911, 285.
- fuscispora. 1910, 85.
- lana. 1935, 284 ; 1954, 201.
- rubrum. Voir C. cruda f. lutea. 1935, 284 ; 1954, 148.
- pubescens. 1951, 118.
- subcruda. 1907, 284.
Cotylopsorella laeticolor. 1933, 296 ; 1935, 394 ; 1936, 324.
- olivacea. 1935, 394 ; 1936, 324 ; 1937, 91 ; 1952, 305.
Corticium aurantiacum. 1910, 111.
- chrysocreas var. leptocreas. 1911, 110.
- comedens var. semiobscurum. 1911, 110.
- corrugatum. 1915, 417.
- cyaneum. 1907, 101.
- cyaneum var. xanthellum. 1951, 118.
- decemmenae. 1907, 101.
- centrifugum. 1909, 414 ; 1937, 101.
- coeruleum. 1937, 93 ; 1952, 320.
- confluens. 1936, 333 ; 1937, 253.
- coronatum. 1935, 417 ; 1937, 94.
- cotonilla. 1952, 320.
- croceum. 1935, 417 ; 1937, 254.
- deflectens. 1952, 320.
- flavescens. 1937, 93 ; 1952, 321.
- flavo-croceum. 1937, 93.
- galzini. 1932, 210.
- leptocoides. Voir C. bombycinum var. leptocoides. 1911, 110.
- laetum. 1932, 210.

Corticium laetum var. tatrense. 1926, 114.
- laeve. 1936, 333 ; 1937, 93, 253.
- merulioides. 1935, 417 ; 1954, 146.
- microsporum. 1932, 211.
- ochroleucum. 1932, 332.
- ochraceum. 1932, 211.
- pellioulare. 1926, 113 ; 1935, 416 ; 1936, 333.
- pelliculare var. merulioides, 1935, 417 ; 1954, 146.
- quercinum. 1929, 261.
- ramulosa. Voir C. bombycinum var. ramulosa. 1932, 210.
- rickii. 1952, 332.
- samuelsi. 1954, 147.
- serum. 1935, 417 ; 1937, 93.
- subcoronatum. 1937, 254 ; 1954, 147.
- subcostatum. 1926, 111.
- submutabile. 1937, 254.
- subpurpureum. 1952, 333.
- vellereum. 1937, 140.
- xanthellum. Voir C. byssinum var. xanthellum. 1952, 319.

Cotylidia carpatica = Skepperia carpatica. 1954, 57.

Cypnella albomarginata. 1954, 148.
- anomala. Voir aussi Solenia. 1933, 47, 330 ; 1954, 150.
- candida. Voir aussi Solenia. 1933, 46 ; 1937, 139.
- fasciculata. Voir aussi Solenia. 1933, 47.
- erucaeformis. 1933, 47.
- galeata. 1946, 99.
- muscigens. 1954, 150.
- poriaeformis. 1954, 151.

Cytidia flocculenta. 1933, 330 ; 1937, 101.
- rutilans. 1933, 330 ; 1935, 416.

Entolomina n. genre. 1951, 194.
- paludosa. 1951, 194.

Gloeocystidium albiaceum. 1937, 254 ; 1952, 333.
- calyciferum. 1932, 213.
- leucoxanthum. 1936, 421.
- lindneri. 1937, 84.
- luridum. 1952, 314.
- mixtum. 1936, 333.
- ochraceum. 1937, 254.
- pallidulum. 1926, 116.
- tenue (Morphologie). 1950, 204.

Gyrophana gimnasii. 1933, 34.

Hymenochaete badioferruginea. Voir H. tabacina f. badioferruginea. 1933, 327.
- cinnamomea. 1936, 421 ; 1951, 113.
- fuliginosa. 1933, 46.
- mougeotii. 1933, 45, 326.
- murashkinskyi. 1932, 336.
- rubiginosa. 1951, 113.
- subfuliginosa. 1951, 113.
- konradi. Voir H. tabacina var. konradi. 1935, 411.
- tabacina. 1933, 45, 327 ; 1935, 412.
- tabacina f. badioferruginea. 1933, 327.
- tabacina var. konradi. 1935, 411.

Hypochnus camophilus. 1951, 134.

Matruchotia varians. 1951, 175, 179, 197 ; 1953, 304.

Merulius aureus. 1936, 322.
- krawtzewii. 1935, 392.
- laeticolor. 1932, 215.
- lepidus. 1933, 293.
- nivens. 1933, 292.
- papyrinus. 1936, 322 ; 1937, 90 ; 1946, 98.
- porinoides. 1935, 393.
- rubiramulus. 1933, 293 ; 1935, 397.
- rufus. 1931, 181 ; 1947, 198, 213.
- sarcosus. 1936, 322.
- tremellosus. 1933, 293 ; 1936, 392 ; 1937, 140.

Peniophora aurantiaca. 1936, 420.
- byssoidea. 1935, 418; 1937, 99, 255 ; 1954, 134.
- calosa. 1930, 211.
- cinerascens. Voir P. glaucissa ssp. cinerascens var. minor. 1926, 116.
- cinerea. 1935, 418 ; 1937, 100, 255.
- corticalis. 1935, 418.
- gigantea. 1926, 114 ; 1936, 419 ; 1936, 334 ; 1937, 254.
- gigantea var. pruinosa. 1926, 114.
- glaucula. 1935, 417.
- glebulosa ssp. cinerascens var. minor. 1926, 116.
- gracillima. 1954, 136.
- greschikii. 1954, 142.
- heterogenea. 1937, 257 ; 1952, 315 ; 1954, 142.
- nitidiceri. 1937, 99.

Peniophora incarnata. 1935, 419; 1936, 334 ; 1937, 101 ; 1952, 315 ; 1954, 144.
- incrassata. 1952, 316 ; 1954, 144.
- lactinea. Voir P. livida f. lactinea. 1937, 96.
- laevis. 1935, 420.
- laevigata. 1935, 420.
- lindtneri. 1937, 97.
- livida. 1937, 95, 255.
- livida f. lactinea. 1937, 96.
- longispora. 1937, 140.
- macrospora. 1954, 145.
- mollis. 1926, 117.
- mutata. 1935, 420.
- odontioides. Voir P. setigera f. odontioides. 1935, 418.
- pallidula. 1935, 419 ; 1937, 98, 255.
- pruinosa. Voir P. gigantea var. pruinosa. 1926, 116.
- roumeguerii. 1935, 420 ; 1952, 318.
- sanguinea. 1935, 419.
- setigera. 1937, 140.
- setigera f. odontioides. 1935, 418.
- sordida. 1935, 420.
- subcremea. 1937, 255.
- subsulphurea. 1935, 420.
- subulata. 1952, 319.
- sulphurina. 1937, 98.
- tomentella. 1954, 145.
- velutina. 1954, 146.

Phaeocyphella musicola. 1932, 209.

Phlebia aurantiaca. 1933, 287 ; 1935, 391 ; 1937, 90, 131.
- aurantiaca var. contorta. 1933, 287.
- centrifuga. 1933, 289.
- donkii. 1932, 215.
- macra. 1933, 288 ; 1935, 391.
- merismoides. 1946, 98.
- radiata. 1946, 98.

Pleurobasidium n. genre. 1951, 193.
- telae. 1951, 194.

Plicatura faginea f. caerulescens. 1933, 291 ; 1935, 391.
- rigida. 1927, 31.

Podoscypha lutea. 1927, 24.

Porostereum n. genre. 1936, 330.
- phellodendri. 1936, 331.

Porothelium fimbriatum. 1933, 330; 1935, 415 ; 1936, 332.

Skepperia andina. 1927, 54.
- carpatica. 1927, 48, 55 ; 1954, 57. = Cotylidia carpatica.
- convoluta. 1927, 52.
- platensis. 1927, 54.
- zeylanica. 1927, 55.

Skepperiella spathularia. 1927, 56.

Solenia anomala. 1933, 47, 330 ; 1935, 415.
- anomala var. confusa. 1935, 416.
- candida. 1933, 46.
- fasciculata. 1933, 47 ; 1937, 101.
- svrcekii ssp. bohemica. 1947, 203.

Stereum abietinum. 1933, 322.
- ambiguum. 1932, 215.
- chailletii. 1933, 43, 322 ; 1935, 411 ; 1936, 330.
- cristulatum. 1946, 99.
- fasciatum. 1933, 323 ; 1936, 330.
- ferrugineum. 1954, 423.
- fuscum. 1933, 323 ; 1935, 411 ; 1936, 330.
- gausapatum. 1954, 126.
- hirsutum. 1933, 323 ; 1937, 92, 131.
- hirsutum f. obscurum. 1935, 410.
- hirsutum f. resupinata. 1933, 323.
- hirsutum f. setosum. 1933, 323.
- karsteni f. incrustata. 1933, 44.
- murrayi var. tuberculosum. 1933, 43 ; 1936, 330.
- obscurum. Voir S. hirsutum f. obscurum. 1935, 410.
- pini. 1933, 324.
- pubescens. 1933, 324.
- purpureum. 1933, 43, 324 ; 1935, 411 ; 1936, 330 ; 1937, 92, 131 ; 1946, 99 ; 1952, 310.
- purpureum f. lilacinum. 1933, 324.
- radiatum. 1933, 324 ; 1935, 411.
- rameale. 1933, 324.
- rufum. 1933, 325 ; 1935, 411.

Stereum rugosum. 1937, 92.
- rugosum f. conchiforme. 1926, 108.
- sanguinolentum. 1933, 43, 325 ; 1935, 410 ; 1936, 330.
- sanguinolentum var. alpina. 1926, 110.
- sanguinolentum var. rigens. 1929, 109.
- spadiceum. 1935, 410 ; 1954, 126.
- sponheimeri. 1937, 92.
- subpileatum. 1937, 92 ; 1954, 127.
- sulcatum. 1932, 216 ; 1933, 325 ; 1936, 330.
- versiforme. 1933, 326 ; 1935, 412.

Trogia crispa. 1946, 93.
Vararia pallescens. 1952, 310.
Vuilleminia comedens. 1937, 258; 1954, 146.

B. Asterostromés.

Asterodon ferruginosum. 1935, 414.
Asterostroma gaillardii. 1954, 137.
- ochroleucum. 1954, 136.

C. Hydnés.

Acia denticulata. 1926, 103 ; 1933, 298.
- fusco-atra. 1933, 298.
- sibirica. 1935, 396.
- stenodon. 1931, 91.
- stenodon var. nodulosa. 1935, 396.

Climacodon Karsten = Dryodon B. et G.
Donkia n. genre. 1936, 328.
- pulcherrima. 1936, 328.

Dryodon aciculare. 1932, 221.
- alpestre. 1932, 221.
- coralloides f. caput-ursi. 1933, 41.
- cirrhatum. 1932, 222 ; 1933, 313 ; 1935, 408.
- cirrhatum var. septentrionalis. 1933, 310.
- erinaceum. 1946, 99.
- fragile. 1935, 407.
- pulcherrimum. 1933, 315.

Dryodon septentrionalis. Voir D. cirrhatum. 1933, 310.
Grandinia bonderzewii. Voir G. granulosa. 1933, 37.
- brinkmanni. 1933, 37 ; 1937, 91.
- farinacea. 1932, 219.
- granulosa. 1932, 217 ; 1933, 298 ; 1935, 396.
- granulosa var. bonderzewii. 1933, 37.
- helvetica. 1932, 217 ; 1933, 36 ; 1935, 396 ; 1937, 259.
- musicola. 1932, 219.
- mutabilis. 1926, 104 ; 1932, 218.

Hydnum cinereum. 1946, 99.
- granulosum. 1932, 218.
- laevigatum. 1928, 78.
- melilotinum. 1954, 424.
- nigrum. 1954, 424.
- repandum. 1933, 42, 318.
- rufescens. 1954, 424.
- vitalbae. 1932, 218.
- zonatum. 1954, 424.

Mucronella aggregata. 1926, 101.
- aggregata f. citrina. 1932, 219.
- calva. 1933, 41 ; 1935, 408.

Mycoleptodon corneum. 1933, 306 ; 1935, 405.
- dichroum. 1933, 304 ; 1935, 403 ; 1946, 99.
- fimbriatum. 1926, 103 ; 1933, 306.
- fusco-atrum. 1935, 401.
- kavinae. 1935, 400.
- ljubarskyi. 1936, 326.
- luteolum. 1932, 220.
- murashkinskyi. 1933, 300 ; 1935, 399 ; 1936, 326.
- mycophilum. 1935, 398.
- narymicum. 1935, 404.
- ochraceum. 1926, 102 ; 1933, 41, 304 ; 1935, 403.
- reflexum. 1933, 302 ; 1935, 403 ; 1936, 326.
- rhizoideum. 1935, 406.
- strigosum. 1932, 220.
- strigosum = Sclerodon. 1933, 307.
- taurinum. 1932, 221.

Odontia abieticola. Voir O. barba-jovis ssp. abieticola. 1933, 38.
- arguta. 1933, 39, 299 ; 1935, 397 ; 1936, 325 ; 1937, 91.
- aspera. 1933, 299.
- barba-jovis. 1933, 300 ; 1935, 397 ; 1947, 212.

Odontia barba-jovis ssp. abieticola. 1933, 38.
- bicolor. 1933, 40.
- bugellensis. 1926, 106 ; 1933, 40.
- carneola. 1936, 326.
- conspersa. 1926, 107.
- corrugata. 1936, 325.
- crustosa. 1926, 106 ; 1933, 299 ; 1935, 397 ; 1937, 91.
- hydnoides. 1935, 397 ; 1937, 91, 259.
- junquillea. 1926, 106.
- nemecii. 1933, 39.
- papillosa. 1926, 105 ; 1933, 300.
- pruni. 1937, 91.
- queletii. 1933, 40, 299.
- stipata. 1926, 105.
- subabrupta. 1935, 398 ; 1937, 91.
- sudans. 1926, 105 ; 1933, 38.

Radulum atterinum. 1951, 83.
- fuscescens. 1936, 324.
- membranaceum. 1937, 91.
- mucidum. 1926, 103 ; 1932, 217.
- orbiculare. 1932, 216 ; 1935, 397.
- quercinum. 1936, 324 ; 1946, 99.

Veluticeps heimii. 1939, 42.

D. Phylactériés.

Caldesiella crinalis. 1926, 107.
- ferruginosa. 1936, 329.
- sajanensis. 1936, 329.

Calodon coeruleum. 1933, 75, 319 ; 1936, 329.
- cyathiforme. 1933, 320.
- ferrugineum. 1933, 319 ; 1935, 409 ; 1936, 328 ; 1946, 99.
- suaveolens. 1935, 408.
- velutinum. 1933, 320.
- zonatum. 1933, 319.

Phylacteria anthrocephala. 1937, 91.
- atra. 1932, 222.
- coralloides. 1954, 424.
- palmata. 1933, 321 ; 1954, 424.
- terrestris. 1933, 320 ; 1935, 409.

Sarcodon fuligineo-album. 1933, 318.
Sarcodon imbricatum. 1946, 99.
- laevigatum. 1933, 318 ; 1936, 328.

Tomentella atro-violacea. 1933, 53.
- echinospora. 1933, 321.
- cervina. 1933, 58.
- cinerascens. 1933, 74.
- ferruginea. 1933, 70.
- flaccida var. fungicola. 1933, 64.
- fuliginea. 1933, 66.
- fumosa. 1935, 409.
- fungicola. Voir T. flaccida var. fungicola. 1933, 64.
- fusca. 1935, 409 ; 1937, 140.
- gibbosa. 1933, 70.
- isabellina. 1935, 409 ; 1936, 329 ; 1937, 259.
- microspora. 1954, 152.
- mucidula. 1933, 56.
- ochraceo-olivacea. 1933, 62.
- phylacteris. 1933, 321 ; 1954, 153.
- pilati. 1933, 72.
- porulosa. 1933, 67.
- rubiginosa. 1937, 140.
- rûttneri. 1933, 67.
- spongiosa. 1933, 67, 321.
- subcervina. 1933, 60.
- subclavigera. 1933, 57.
- subfusca. 1933, 62.
- tenebrosa. 1954, 153, 156.
- tristis. 1933, 321 ; 1935, 409.
- umbrina. 1933, 52 ; 1954, 155.

Tomentellina bombycina. 1933, 52.

E. Porés.

Caloporus leucomelas. 1936, 305.

Coriolus abietinus. 1925, 144 ; 1932, 13, 170 ; 1936, 313 ; 1937, 87.
- abietinus f. caesio-alba. 1932, 14.
- abietinus f. lenzitoidea. 1932, 14 ; 1935, 367.
- abietis. Voir C. hirsutus f. abietis. 1932, 13.
- acystidiata. Voir C. obducens var. acystidiata. 1935, 368.
- amurensis. Voir C. pubescens var. amurensis. 1932, 13.

Coriolus conchifer. 1932, 13 ; 1933, 262.
- connatus. 1925, 146 ; 1936, 313.
- elongatus. 1926, 134.
- favoliporus. 1936, 313.
- fibula. 1925,141.
- floriformis. 1938, 24.
- hirsutus. 1925, 140 ; 1932, 13 ; 1933, 262 ; 1935, 365; 1936, 312 ; 1937, 87 ; 1946, 96.
- hirsutus f. abietis. 1932, 13.
- hoehnelii. 1925, 145 ; 1935, 366 ; 1938, 23.
- hoehnelii ssp. genistae. 1925, 145.
- irpicoides. Voir C. unicolor var. irpicoides. 1932, 14.
- kymatodes. 1925, 143 ; 1933, 262 ; 1935, 366.
- lenzitoidea. Voir C. abietinus f. lenzitoidea. 1932, 14 ; 1935, 367.
- maublancii. 1932, 17.
- obducens. 1925, 147 ; 1932, 14 ; 1933, 263.
- obducens var. acystidiata. 1935, 368.
- pallescens f. resupinata. 1932, 15, 16.
- pergamenus. 1925, 145 ; 1932, 14 ; 1933, 262 ; 1938, 23.
- pubescens. 1925, 139 ; 1932, 13, 170 ; 1933, 262 ; 1936, 312 ; 1937, 87.
- pubescens var. amurensis. 1932, 13.
- pubescens f. resupinatus. 1935, 364.
- pubescens f. velutinus. 1935, 365 ; 1938, 24.
- ravidus. 1936, 313.
- subradula. 1935, 366.
- unicolor. 1925, 142 ; 1932, 14 ; 1933, 263 ; 1935, 366; 1937, 87.
- unicolor f. irpicoides. 1932, 14.
- unicolor f. resupinatus. 1933, 263.
- velutinus. 1935, 365.
- versicolor. 1925, 141 ; 1935, 365 ; 1937, 87, 137 ; 1946, 96.
- zonatus. 1925, 141 ; 1932, 13; 1933, 262 ; 1935, 365 ; 1936, 312.

Daedalea biennis. 1925, 152.
- quercina. 1946, 97.
Favolus. 1925, 115.
- annamensis. 1927, 32.
- europaeus. 1925, 116.
- minutus. 1927, 32.
Fistulina hepatica. 1925, 250.
Ganoderma applanatum. 1925, 184; 1926, 190 ; 1928, 228 ; 1932, 25 ; 1933, 266.
- australe. 1925, 184.
- colossum. 1926, 291.
- frondosum. 1926, 292.
- laccatum. 1925, 185.
- lucidum. 1932, 172 ; 1937, 132 ; 1946, 97.
- lucidum var. valesiacum. 1925, 182 ; 1933, 266.
- resinaceum. 1925, 182.
- valesiacum. Voir G. lucidum var. valesiacum. 1925, 182 ; 1933, 266.
- xanthocreas. 1927, 30.
Grifola castaneae. 1936, 100.
- gigantea. 1937, 83.
- ossea. 1936, 305.
- sulphurea. 1933, 256 ; 1935, 352.
Hexagona annamitica. 1927, 31.
- nitida. 1925, 251 ; 1937, 88.
Irpex galzini. 1925, 151.
- glaberrimus. 1925, 255.
- lacteus. 1925, 149 ; 1932, 18 ; 1933, 261 ; 1937, 88.
- lacteus var. sinuosus. 1925, 150 ; 1935, 359.
- pachyodon. 1925, 151 ; 1937, 141.
- paleaceus. 1925, 255.
- pendulus. 1925, 150 ; 1933, 261 ; 1936, 308.
- raduloides. 1936, 308.
- sinuosus. Voir I. lacteus var. sinuosus. 1925, 150 ; 1935, 359.
- spathulatus. 1925, 255.
- violaceus. 1925, 149 ; 1932, 18 ; 1933, 261.
Lenzites abietina. 1925, 158 ; 1932, 19, 171 ; 1935, 361 ; 1937, 88 ; 1944, 80.
- betulina. 1925, 155 ; 1932, 18 ; 1936, 308.
- flaccida. 1925, 156 ; 1954, 423.
- heteromorpha. 1932, 227.
- laricina. 1932, 19.
- quercina. 1925, 154 ; 1932, 18 ; 1933, 261 ; 1937, 88 ; 1953, 247.

Lenzites sepiaria. 1925, 157 ; 1932, 18, 171 ; 1933, 261 ; 1937, 88 ; 1948, 251.
- septentrionalis. 1932, 19.
- tricolor. 1925, 156 ; 1932, 19 ; 1936, 309 ; 1954, 423.
- variegata. 1925, 156.
Leptoporus adustus = Gloeoporus adustus. 1925, 132 ; 1932, 11 ; 1935, 359 ; 1946, 96.
- adustus f. resupinatus. 1932, 11, 167 ; 1933, 260.
- adustus f. viridans. 1935, 359.
- albellus. 1925, 124 ; 1932, 6 ; 1933, 260.
- albellus f. raduloides. 1932, 7.
- albidus. 1925, 126 ; 1932, 7 ; 1935, 356 ; 1936, 306 ; 1946, 96 ; 1947, 39.
- albosordescens. 1932, 8 ; 1933, 260.
- alma atensis. 1936, 307.
- amorphus. 1925, 129 ; 1932, 11, 167 ; 1933, 260.
- amorphus f. resupinatus. 1932, 9, 167.
- bourdotii. 1932, 167 ; 1935, 357.
- braunii. 1925, 133 ; 1944, 80.
- bulgaricus. 1937, 84.
- caesius. 1925, 122 ; 1932, 8, 166 ; 1935, 357.
- caesius f. dealbata. 1933, 259.
- caesius f. porioides. 1932, 225.
- cervinus. 1925, 133.
- chioneus. 1925, 125.
- chioneus f. pellucida. 1932, 225.
- dalmaticus. 1937, 84.
- dealbata. Voir L. caesius f. dealbata. 1933, 259.
- destructor. 1925, 127 ; 1935, 358.
- destructor var. graminicola. 1925, 127.
- destructor var. pileata. 1925, 128.
- destructor var. resupinatus. 1932, 8.
- dichrous. 1925, 130 ; 1933, 260.
- dichrous f. carpathica. 1932, 11, 225.
- ellipsosporus. Voir L. wynnei f. ellipsosporus. 1936, 306 ; 1944, 88.
Leptoporus erubescens. 1925, 124 ; 1935, 355.
- floriformis. 1925, 127 ; 1935, 358 ; 1946, 96 ; 1947, 39.
- fodinarum. 1944, 80.
- fragilis. 1925, 123 ; 1932, 8 ; 1935, 356.
- fumosus. 1937, 131.
- galactinus. 1937, 85.
- graminicola. Voir L. destructor var. graminicola. 1925, 127.
- imberbis. 1925, 131 ; 1933, 260 ; 1936, 308.
- lacteus. 1925, 121 ; 1932, 6, 224 ; 1933, 260 ; 1936, 307 ; 1946, 96.
- litschaueri. 1932, 9 ; 1933, 258 ; 1935, 355 ; 1936, 306.
- micantiformis. 1935, 358.
- minusculus. 1925, 251.
- mollis. 1944, 79.
- pellucidus. Voir L. chioneus f. pellucida. 1932, 225.
- pileata. Voir L. destructor var. pileata. 1925, 128.
- porioides. Voir L. caesius var. porioides. 1932, 225.
- raduloides. Voir L. albellus var. raduloides. 1932, 7.
- resupinatus. Voir L. adustus f. resupinatus. 1932, 11, 167 ; 1933, 260.
- resupinatus. Voir L. amorphus f. resupinatus. 1932, 9, 167.
- resupinatus. Voir L. destructor f. resupinatus. 1932, 8.
- revolutus. 1925, 129.
- revolutus var. subrubens. 1925, 129.
- sericeo-mollis. 1925, 128 ; 1935, 355.
- testaceus. 1925, 132.
- trabeus. 1925, 123 ; 1935, 355.
- undatus. 1932, 12.
- undosus. 1938, 24.
- uralensis. 1932, 11.
- viridans. Voir L. adustus f. viridans. 1935, 359.
- wynnei. 1925, 130 ; 1932, 225.
- wynnei f. ellipsospora. 1936, 306 ; 1944, 88.

Leptoporus zameriensis. 1935, 356.
- zilingianus. 1933, 258 ; 1935, 356.
Leucoporus agariceus. 1925, 114.
- arcularius. 1925, 114 ; 1937, 140.
- brumalis. 1925, 67, 113.
- hirtus. 1925, 115.
- infundibuliformis. 1936, 306.
Melanopus brevipes. 1927, 25.
- coronatus. 1925, 108.
- elegans. 1925, 111 ; 1946, 97.
- firquignoni. 1925, 109 ; 1946, 98.
- irroratus. 1927, 26.
- latiporus. 1927, 27.
- lentus. 1925, 109.
- melanopus. 1925, 112.
- multiplex. 1927, 27.
- nummularius. 1925, 111.
- poilanei. 1927, 28.
- podlachicus. 1925, 112.
- squamosus. 1925, 108 ; 1936, 352 ; 1937, 131.
- varius. 1925, 110.
Mylitta flos-terrae. 1926, 290.
Phaeolus albo-rubescens. 1925, 136.
- abietis-sibiricae. Voir P. rutilans f. abietis-sibiricae. 1932, 226.
- albosordescens. 1925, 135 ; 1936, 308.
- croceus. 1925, 137.
- fibrillosus. 1932, 12 ; 1933, 261 ; 1935, 359.
- porioides. Voir P. rutilans f. porioides. 1932, 226.
- resupinata. Voir P. rutilans f. resupinata. 1935, 359.
- rutilans. 1925, 135 ; 1932, 12.
- rutilans f. abietis-sibiricae. 1932, 226.
- rutilans f. porioides. 1932, 226.
- rutilans f. resupinata. 1935, 359.
- schweinitzii. 1925, 134 ; 1932, 12, 166 ; 1933, 261 ; 1937, 84.
- subtestaceus. 1925, 138.
Phellinus baumii. 1932, 25.
- bolaris. 1927, 29.
- buxi. Voir P. robustus var. buxi. 1925, 189.
Phellinus contiguiformis. 1935, 372.
- contiguus. 1933, 272 ; 1936, 316.
- dryadeus. 1925, 187.
- ferrugineo-fuscus. 1932, 228 ; 1935, 369.
- ferrugineo-fuscus var. narymicus. 1935, 370.
- ferruginosus. 1933, 271 ; 1936, 316.
- friesianus. 1932, 25 ; 1933, 270 ; 1935, 374.
- fulvus. 1925, 190 ; 1932, 175 ; 1936, 316.
- gilvus. 1925, 193 ; 1932, 25 ; 1933, 270.
- hartigii. Voir P. robustus var. hartigii. 1925, 188 ; 1932, 25, 175 ; 1933, 271.
- igniarius. 1925, 189 ; 1932, 25, 175 ; 1933, 270.
- igniarius var. nigricans. 1933, 270.
- isabellinus. 1925, 193 ; 1935, 373.
- laricicolus. Voir P. torulosus var. laricicolus. 1935, 374.
- narymicus. Voir P. ferrugineo-fuscus var. narymicus. 1935, 370.
- nigricans. 1925, 189.
- nigricans var. resupinatus. 1925, 190.
- nigricans. Voir P. igniarius var. nigricans. 1933, 270.
- nigrolimitatus. 1925, 193 ; 1936, 316.
- robustus. 1925, 188 ; 1933, 270 ; 1951, 83.
- robustus var. buxi. 1925, 189.
- robustus var. hartigii. 1925, 188 ; 1932, 25, 175 ; 1933, 271.
- salicinus. 1925, 192 ; 1932, 176 ; 1933, 271 ; 1936, 316.
- sulphurascens. 1935, 372.
- torulosus. 1925, 191 ; 1932, 25 ; 1933, 271.
- torulosus var. laricicolus. 1935, 374.
Polyporellus agaricus. 1935, 352.
- albiceps. 1932, 4 ; 1933, 256.
- arcularius. 1937, 83.

Polyporellus arcularius f. infundibuliformis. 1936, 306.
- arcularius f. olivascens. 1935, 352.
- arcularius ssp. strigosus. 1932, 4.
- arcularius ssp. strigosus var. minutipora. 1933, 256.
- brumalis. 1932, 4 ; 1933, 257 ; 1935, 352 ; 1936, 305 ; 1948, 251.
- elegans var. nummularis. 1932, 5, 166 ; 1935, 354.
- granulisquamosus. Voir P. squamosus. 1935, 353.
- melanopodiformis. Voir P. varius f. melanopodiformis. 1933, 357.
- minutipora. Voir P. arcularius ssp. strigosus var. minutipora. 1933, 256.
- nummularius. Voir P. elegans var. nummularius. 1932, 5, 166 ; 1935, 354.
- olivascens. Voir P. arcularius var. olivascens. 1935, 352.
- picipes. 1935, 354 ; 1954, 423.
- squamosus. 1935, 353 ; 1937, 84.
- squamosus var. granulisquamosus. 1935, 353.
- melanopus. 1935, 354 ; 1937, 84.
- varius. 1933, 257 ; 1937, 84.
- varius f. melanopodiformis. 1932, 5 ; 1933, 257.
- varius f. pertenuis. 1932, 4.

Polyporus castaneae. 1925, 105 ; 1936, 100. (Grifola).
- cinnabarinus. 1951, 83.
- confluens. 1925, 104.
- cristatus. 1925, 103 ; 1929, 301.
- demidoffi. 1937, 88.
- frondosus. 1925, 104 ; 1942, 102 ; 1951, 83.
- giganteus. 1925, 106.
- imbricatus. 1925, 72.
- incarnatus. 1925, 253.
- iowensis. 1937, 85.
- leucomelas. 1925, 102 ; 1936, 305.
- lucidus. 1929, 302.
- montanus. 1925, 106 ; 1932, 224.
- osseus. 1925, 106 ; 1932, 4.
- ovinus. 1925, 102.
- pes-caprae. 1925, 102.
- pusiolus. 1925, 252.
- rhizomorpha. 1941, 5.
- rubricosus. 1927, 25.
- squamosus. 1932, 5 ; 1938, 75. Voir aussi Polyporellus.
- sulfureus. 1925, 71, 107 ; 1932, 4.
- tomentosus. 1951, 83.
- tuberaster. 1925, 250.
- tunetanus. 1925, 82.
- umbellatus. 1925, 104 ; 1942, 103 ; 1948, 251.

Poria (Tableau analytique des espèces). 1925, 208.
- albo-lutea. 1925, 217.
- albo-lutea var. microspora. 1925, 218.
- albo-lutea var. stenospora. 1925, 218.
- albo-pallescens. 1925, 216.
- ambigua. 1925, 229 ; 1932, 37, 230 ; 1936, 319.
- ambigua var. albo-gilva. 1925, 230.
- aneirina. 1925, 227 ; 1932, 35.
- aneirina var. bibula. 1925, 228.
- aneirina var. bombycinoides. 1925, 227.
- aneirina var. metamorphosa. 1925, 228.
- aneirina var. mollissima. 1925, 228.
- aurantiaca. 1925, 225.
- bibula. Voir P. aneirina var. bibula. 1925, 228.
- biguttulata. Voir P. calcea f. biguttulata. 1932, 44, 181.
- bombycina. 1925, 254 ; 1932, 178, 230 ; 1935, 379.
- bombycinoides. Voir P. aneirina var. bombycinoides. 1925, 227.
- bresadolae. 1925, 222 ; 1946, 98.
- bullosa. Voir P. calcea var. bullosa. 1932, 44, 180.
- cacao. Voir P. europa f. cacao. 1932, 47.
- calcea. 1925, 232 ; 1932, 43, 180 ; 1933, 276 ; 1935, 384 ; 1936, 319.
- calcea var. biguttulata. 1932, 181.
- calcea var. bullosa. 1932, 44.

Poria calcea var. bullosa ssp. stratosa. 1932, 180.
- calcea var. coriacea. 1932, 180.
- calcea var. xantha. 1932, 44, 181 ; 1935, 384.
- cameresiana. 1925, 223.
- canescens. 1925, 252 ; 1935, 380 ; 1937, 90.
- carneo-brunnea. Voir P. gilvescens var. carneo-brunnea. 1935, 377.
- chakasskensis. 1933, 276.
- cinerascens. 1925, 227 ; 1932, 34.
- confusa. 1925, 234.
- consobrina. 1925, 230 ; 1946, 98.
- consobrinoides. 1935, 380.
- contigua. 1925, 244.
- coriacea. Voir P. calcea var. coriacea. 1932, 180.
- corticola. 1925, 254 ; 1932, 38 ; 1933, 275 ; 1935, 385.
- europa. 1925, 235 ; 1932, 45 ; 1933, 275 ; 1935, 387.
- europa f. cacao. 1932, 47.
- expallescens. 1925, 240.
- ferrea. 1925, 247.
- ferruginosa. 1925, 245.
- floccosa. 1925, 246.
- friesiana. 1925, 243.
- fulviseda. 1925, 241.
- gelatinoso-tubulosa. 1935, 383.
- gilvescens. 1925, 223 ; 1932, 32 ; 1933, 275 ; 1935, 377.
- gilvescens var. carneo-brunnea. 1935, 377.
- greschikii. 1925, 226.
- greschikii var. subiculosa. 1933, 33.
- holoporus. Voir P. sinuosa f. holoporus. 1932, 42.
- hybernica. 1925, 254.
- kazakstanica. 1936, 318.
- krawtzewi. 1932, 34.
- laevigata. 1925, 244.
- lateritia. Voir P. medulla-panis var. lateritia. 1925, 241.
- latitans. 1925, 226.
- litschauerii. 1932, 41.
- lunulispora. 1935, 381.
- medulla-panis. 1925, 240 ; 1932, 49, 231 ; 1933, 278 ; 1936, 320 ; 1937, 90, 141.

Poria medulla-panis var. lateritia. 1925, 241.
- medulla-panis var. prunicola. 1935, 389.
- medulla-panis var. pulchella. 1925, 241.
- megalopora. 1925, 242 ; 1936, 320 ; 1938, 25.
- mellita. 1925, 224.
- metamorphosa. Voir P. aneirina var. metamorphosa. 1925, 228.
- microspora. Voir P. albolutea var. microspora. 1925, 218.
- millavensis. 1925, 238.
- mollissima. Voir P. aneirina var. mollissima. 1925, 228.
- mollusca. 1925, 230 ; 1932, 42, 179 ; 1935, 379.
- mucida. 1925, 237 ; 1932, 48 ; 1935, 383 ; 1937, 90 ; 1946, 98.
- mucida var. radula. 1925, 237.
- nitida. 1925, 253.
- nuoljae. Voir P. viridans var. nuoljae. 1937, 90.
- obliqua. 1925, 247.
- onusta. 1925, 218.
- phellinoides. 1935, 383.
- pilati. 1932, 230.
- placenta. 1925, 224.
- polycystidiata. 1933, 277.
- prunicola. Voir P. medulla-panis var. prunicola. 1935, 389.
- pseudo-gilvescens. 1935, 378.
- pulchella. Voir P. medulla-panis var. pulchella. 1925, 241.
- purpurea. 1925, 220 ; 1932, 32 ; 1935, 377 ; 1937, 90.
- radula. Voir P. mucida var. radula. 1925, 235, 237 ; 1932, 47.
- rancida. 1925, 234.
- reticulata. 1925, 225 ; 1932, 32, 178.
- reticulato-marginata. 1935, 380.
- rhodella. 1925, 222.
- rixosa. 1925, 252 ; 1935, 385.
- sanguinolenta. 1925, 239.
- sartoryi. 1925, 216.
- sinuosa. 1925, 231 ; 1932, 42.

Poria sinuosa f. holoporus. 1932, 42.
- stenospora. Voir P. albolutea var. stenospora. 1925, 218.
- stratosa. 1932, 180.
- subacida. 1932, 49.
- subfusco-flavida. 1925, 251.
- subiculosa. Voir P. greschikii var. subiculosa. 1932, 33.
- subtilis. 1925, 217 ; 1932, 230 ; 1935, 379.
- taxicola. 1925, 220 ; 1932, 32, 178 ; 1935, 377.
- terrestris. 1925, 215.
- trachyspora. 1925, 219.
- trametopora. 1935, 381.
- tschulymica. 1932, 35.
- turkestanica. 1936, 319.
- umbrina. 1925, 246.
- undata. 1925, 238 ; 1935, 388 ; 1936, 320.
- vaillantii. 1925, 234 ; 1932, 180 ; 1935, 387 ; 1936, 319.
- vaporaria. 1925, 232 ; 1932, 43, 179 ; 1935, 387 ; 1936, 320 ; 1937, 141.
- violacea. 1925, 253.
- viridans. 1925, 221 ; 1937, 90.
- viridans var. nuoljae. 1937, 90.
- vulgaris. 1925, 236 ; 1932, 48, 181 ; 1935, 387.
- wasjuganica. 1935, 382 ; 1936, 319.
- xantha. Voir P. calcea var. xantha. 1925, 233 ; 1932, 44, 181 ; 1935, 384.

Ptychogaster lindtneri. 1937, 86.
Spongipellis borealis. 1925, 118 ; 1932, 5 ; 1935, 355.
- litschaueri. 1932, 5, 224 ; 1933, 258.
- schulzeri. 1925, 117.
- spumeus. 1925, 116 ; 1936, 306.

Trametes (Sexualité). 1934, 98.
- albida. 1925, 167 ; 1932, 21; 1935, 362.
- amurensis. Voir T. gibbosa var. amurensis. 1932, 20 ; 1933, 263 ; 1936, 309.
- amygdalea. 1926, 41.
- bulliardi. 1925, 77.
- campestris. 1925, 171.
- carnea. 1932, 19.
- cervina. 1925, 169 ; 1932, 21 ; 1933, 264 ; 1935, 361 ; 1936, 311 ; 1938, 24.

Trametes cervina f. laevis. 1932, 21 ; 1933, 264.
- cinnabarina. 1925, 161 ; 1934, 98 ; 1937, 87, 141.
- extenuata. 1937, 141.
- flavescens. 1925, 171 ; 1935, 363.
- gallica. 1925, 251.
- gibbosa. 1925, 165 ; 1932, 19 ; 1933, 263 ; 1935, 362; 1937, 87 ; 1946, 97.
- gibbosa f. amurensis. 1932, 20 ; 1933, 263 ; 1936, 309.
- gibbosa f. laevis. 1932, 20.
- heteromorpha. Voir T. subsinuosa f. heteromorpha. 1932, 22.
- hispida. 1925, 163 ; 1934, 105 ; 1937, 87.
- inodora. Voir T. suaveolens f. inodora. 1933, 264.
- irpicoides. 1936, 311.
- laevis. Voir T. cervina f. laevis. 1932, 21 ; 1933, 264.
- laevis. Voir T. gibbosa f. laevis. 1932, 20.
- lenzitoidea. Voir T. rubescens f. lenzitoidea. 1932, 20.
- lenzitoidea. Voir T. trabea f. lenzitoidea. 1933, 266.
- lenzitoidea tricolor. Voir T. rubescens f. lenzitoidea tricolor. 1932, 20 ; 1936, 310.
- ljubarskyi. 1936, 309.
- malicola. 1925, 169.
- micans. 1925, 172.
- micans var. saliciseda. 1935, 363.
- mollis. 1925, 170 ; 1932, 20, 228 ; 1933, 266.
- narymicus. 1935, 364.
- odora. 1925, 77. = T. subalutacea. 1925, 165 ; 1954, 423.
- odorata. 1925, 161 ; 1926, 136 ; 1932, 20 ; 1933, 264; 1935, 361.
- odorata var. piceae schrenkianae. 1935, 361.
- protracta. 1932, 22.
- rubescens. 1925, 77, 166 ; 1932, 20 ; 1937, 87 ; 1951, 83.
- rubescens f. lenzitoidea. 1932, 20.

Trametes rubescens f. lenzitoidea tricolor. 1932, 20 ; 1936, 310.
- salicina. 1925, 167 ; 1935, 362 ; 1936, 311.
- saliciseda. Voir T. micans var. saliciseda. 1935, 363.
- serialis. 1925, 171 ; 1935, 363 ; 1936, 312 ; 1937, 88.
- serpens. 1925, 166.
- squalens. 1932, 21 ; 1933, 265 ; 1935, 363 ; 1938, 24.
- stereoides. 1925, 170 ; 1935, 362 ; 1936, 310 ; 1937, 88.
- suaveolens. 1925, 77, 164 ; 1932, 20 ; 1933, 264 ; 1935, 363 ; 1936, 310.
- suaveolens f. inodora. 1933, 264.
- subalutacea. 1925, 165.
- subsinuosa. 1925, 168.
- subsinuosa f. heteromorpha. 1932, 22.
- trabea. 1925, 162 ; 1932, 171.
- trabea f. lenzitoidea. 1933, 266.
- trogii. 1925, 163 ; 1932, 20 ; 1933, 264 ; 1936, 311.

Ungulina albida. Voir U. fraxinea var. albida. 1932, 227.
- annosa. 1925, 177 ; 1932, 23, 174 ; 1933, 268 ; 1936, 314 ; 1946, 97.
- betulina. 1925, 179, 349 ; 1928, 328 ; 1935, 369 ; 1936, 314 ; 1946, 97.
- corrugis. 1925, 178 ; 1932, 174.
- fomentaria. 1925, 174 ; 1932, 23 ; 1937, 88 ; 1938, 69 ; 1946, 97.
- fomentaria var. nigricans. 1925, 174 ; 1932, 23 ; 1933, 268.
- fraxinea. 1925, 175 ; 1926, 192 ; 1935, 242, 348 ; 1936, 314 ; 1937, 88.
- fraxinea var. albida. 1932, 23, 227.
- fuliginosa. 1925, 178 ; 1932, 23, 174 ; 1933, 268.
- lapponica. 1933, 268.
- marginata. 1925, 174 ; 1932, 172 ; 1936, 314.
- marginata f. paludosa. 1935, 368.
- nigricans. Voir U. fomentaria var. nigricans. 1925, 174 ; 1932, 23 ; 1933, 268.

Ungulina officinalis. 1925, 180 ; 1936, 316.
- paludosa. Voir U. marginata f. paludosa. 1935, 368.
- pseudobetulina. 1932, 23 ; 1936, 314.
- quercina. 1925, 179 ; 1933, 268.
- rosea. 1925, 177 ; 1932, 23, 172, 228 ; 1938, 24.
- scutellata. 1933, 267.
- soloniensis. 1925, 180.
- ulmaria. 1925, 176.

Xanthochrous (Tableau analytique). 1925, 194.
- abietis. 1925, 198 ; 1935, 376.
- abietis f. microspora. 1932, 27 ; 1933, 273.
- cinnamomeus. 1925, 196.
- circinatus. 1925, 197.
- circinatus var. triqueter. 1925, 198 ; 1932, 27 ; 1935, 376.
- corruscans. 1925, 202.
- cuticularis. 1925, 200 ; 1933, 377.
- (Inonotus) demidoffii. 1937, 88.
- glomeratus ssp. heinrichii. 1932, 28 ; 1933, 272 ; 1935, 375 ; 1936, 317.
- glomeratus ssp. heinrichii f. nodulosus. 1935, 376.
- hispidus. 1925, 203 ; 1933, 377 ; 1935, 242 ; 1936, 317 ; 1937, 88.
- krawtzewii. 1932, 31; 1933, 273.
- laricis. Voir X. pini var. laricis. 1933, 272.
- macropus. 1926, 294.
- montagnei. 1925, 197.
- murashkinskyi. Voir X. pini var. murashkinskyi. 1933, 273.
- (Inonotus) nodulosus. 1937, 88.
- nodulosus. Voir X. heinrichii f. nodulosus. 1935, 376.
- nodulosus. Voir X. variatus var. nodulosus. 1925, 199.
- obliquus. 1932, 229 ; 1954, 423.
- pavonius. 1926, 293.
- perennis. 1925, 195 ; 1932, 27, 176 ; 1936, 318.
- pini. 1925, 198 ; 1932, 27, 177; 1935, 376 ; 1936, 317.

Xanthochrous pini ssp. abietis var. laricis. 1932, 28 ; 1933, 272.
- pini ssp. abietis f. microspora. 1932, 27 ; 1933, 273.
- pini ssp. abietis f. murashkinskyi. 1933, 273.
- polymorphus. 1925, 200 ; 1932, 229.
- pseudoobliquus. 1935, 377.
- radiatus. 1925, 199 ; 1932, 28 ; 1935, 375 ; 1936, 316.
- radiatus var. nodulosus. 1925, 199.
Xanthochrous radiatus var. subexcarnis. 1932, 28 ; 1935, 375.
- rheades. 1925, 201 ; 1932, 31, 177 ; 1933, 272 ; 1935, 375.
- ribis. 1925, 204 ; 1937, 141.
- suberoso-mollis. 1936, 317.
- subexcarnis. 1932, 28 ; 1935, 375.
- tamaricis. 1925, 202 ; 1946, 97.
- tomentosus. 1925, 196.
- vulpinus. 1925, 202.

B O L E T A C E E S

A. Bolétacées porées.

Boletus (Généralités).
- (Comestibilité de quelques). 1952, 408.
- (Développement des). 1953, 389.
- (Krombholzia). 1934, 301.
- (Clé des Krombholziella). 1938, 61 ; et errata, 1951, fasc. 2.
- (Réseau). 1953, 132.
- (Sensibilité à l'iode). 1950, 177.

Boletellus ananas. 1936, 255.
- betulae. 1936, 258.
- lemidospora. 1936, 258.
- pustulatus. 1936, 258.
- russellii. 1936, 256.

Boletinellus paluster. 1936, 253.
- purpureus. 1936, 254.

Boletus aereus. 1925, 63 ; 1950, 199.
- albidus. 1950, 187.
- albidus subs. eupachypus. 1929, 68, 72.
- amarellus. 1928, 227.
- appendiculatus. 1925, 63 ; 1946, 95 ; 1950, 200.
- armeniacus. 1936, 368 ; 1938, 25.
- badius. 1948, 251.
- bovinus. 1937, 83 ; 1954, 423.
- calopus. 1929, 66, 71 ; 1950, 187.
- chrysenteron. 1936, 368 ; 1946, 95.
- chrysenteron var. versicolor. 1946, 96 ; 1951, 83.
- crocipodius. 1940, 122.
- discolor. 1936, 250.
- dupainii. 1950, 96, 196.
- duriusculus. 1938, 59 ; 1946, 96.
- edulis. 1932, 186 ; 1950, 199.
- erythropus. 1927, 138 ; 1932, 182 ; 1946, 95 ; 1950, 187.
- eupachypus. 1929, 68, 72.
- felleus = Tylopilus. 1949, 183 ; 1954, 422.
- flavidus. 1937, 290.
- flavus. 1928, 77.
- fragrans. 1950, 197.
- granulatus. 1932, 186 ; 1937, 83.
- impolitus. 1938, 60 ; 1953, 244.
- junquilleus. 1942, 187 ; 1950, 190.
- leptopus. 1936, 252.
- leucophaeus. 1938, 57 ; 1942, 173
- lupinus. 1948, 203 ; 1950, 189, 195.

Boletus luridus. 1927, 137 ; 1932, 183 ; 1950, 187.
- luteus. 1937, 83 ; 1948, 251.
- miniatoporus. 1932, 183.
- pachypus. Voir albidus. 1927, 205.
- pallescens. 1950, 200.
- pinicola. 1950, 199.
- piperatus var. amarellus. 1928, 227.
- placidus. 1927, 199.
- pulverulentus. 1927, 198.
- purpureus. 1926, 197 ; 1950, 39, 189 ; 1951, 83.
- purpureus var. xanthocyaneus. 1950, 189.
- queletii. 1926, 199 ; 1934, 307 ; 1946, 95 ; 1950, 187, 196.
- regius. 1925, 63 ; 1950, 200.
- reticulatus. 1940, 120 ; 1950, 199.
- sanguineus. 1946, 95.
- satanas. 1927, 138 ; 1950, 197 ; 1951, 427 (Comestibilité).
- satanicolor. 1932, 184.
- scaber. 1934, 301 ; 1938, 55, 59 ; 1942, 171.
- subtomentosus. 1946, 95.
- sulfureus. 1926, 255.
- tesselatus. 1951, 83.
Boletus torosus. 1936, 249 ; 1950, 189.
- tumidus. 1936, 251.
- variegatus. 1932, 186 ; 1946, 95.
Strobilomyces costatispora. 1936, 258.
- echinatus. 1936, 258.
- echinospora. 1936, 259.
- lepidellus. 1936, 259.
- reticulatus. 1936, 260.
- strobilaceus. 1936, 259 ; 1946, 96.

B. Bolétacées lamellées.

Gomphidius et le réactif de Melzer. 1950, 201.
- rhodoxanthus. 1926, 173.
- tomentosus. 1926, 75.
- viscidus. 1932, 295.
- viscidus var. tatrensis. 1926, 89.
Paxillus et le réactif de Melzer. 1950, 201.
- atrotomentosus. 1948, 250.
- atrotomentosus var. bambusinus. 1953, 194.
- panuoides. 1926, 134.
- tricholoma. 1926, 128.
Phylloporus rhodoxanthus. 1926, 170.

A G A R I C A L E S

Classification des Agaricales. 1936, 31.
Développement des Agaricales. 1953, 389.
Non-validité de quelques genres. 1952, 165.

Cantharellacées.

Cantharellus aurantiacus. 1933, 285.
- carbonarius. 1939, 121 ; 1946, 100.
- flocculosus. 1946, 101.
- tubiformis. 1929, 74 ; 1946, 101 ; 1948, 251.
- tubiformis var. lutescens. 1929, 77.
Craterellus clavatus. 1954, 424.
- cornucopioides. 1934, 308.
- konradii. 1930, 226.
- ochreatus. 1954, 424.
Xerotus poilanei. 1927, 33.

Hygrophoracées.

Hygrophorus agathosmus. 1936, 42 ; 1954, 422.

Hygrophorus aureus. 1934, 304.
- caprinus. 1938, 20.
- clivalis. 1936, 50.
- conicus. 1927, 195 ; 1946, 94.
- conicus var. nigrescens. 1927, 196.
- conicus var. Rickenii. 1930, 220.
- croceus. 1932, 295.
- discoideus. 1929, 64.
- distans. 1936, 50.
- eburneus var. pseudodiscoideus. 1928, 38.
- fornicatus. 1936, 49, 51.
- hypothejus. 1934, 304.
- insipida. Voir reai.
- laetus. 1947, 209.
- leucophaeus. 1929, 64.
- miniatus. 1933, 367.
- nemoreus. 1936, 45 ; 1954, 422.
- nigrescens. 1927, 196.
- nitidus. 1929, 62.
- niveus. 1946, 95.
- obrusseus. 1927, 196 ; 1937, 81.
- olivaceo albus. 1936, 44 ; 1946, 94.
- poetarum. 1947, 127.
- pratensis. 1936, 45.
- psittacinus. 1946, 95.
- psittacinus var. abietinus. 1947, 131.
- pudorinus. 1948, 250.
- purpurascens var. cedretorum. 1928, 38.
- pustulatus. 1936, 43.
- reai var. insipida. 1933, 370.
- russula. 1928, 76.
- schulzeri. 1937, 206.
- sciophanus. 1933, 364 ; 1943, 29.
- streptopus. 1936, 47.
- tephroleucus. 1938, 70.
- unguinosus. 1936, 52.

Limacium olivaceo-album = Hygrophorus. 1946, 94.

Pleurotacées.

Acanthocystis geogenius. 1948, 249 ; 1954, 422.
Crepidotus albidus. 1953, 174.
- applanatus. 1937, 216.
- fragilis. 1937, 218 ; 1943, 30.
- mollis. 1937, 82 ; 1946, 93.
- palmatus. 1933, 122.
- panuoides. 1935, 391 ; 1937, 82.
- serbicus. 1937, 82.

Dictyolus museigenus. 1954, 422.
Lentinellus cochleatus. 1948, 250.
- ursinus. 1945, 41.
- vulpinus. 1945, 44.

Lentinus adhaerens. 1932, 299.
- castoreus. 1932, 296 ; 1933, 285 ; 1935, 389 ; 1945, 41.
- cyathiformis. 1933, 286 ; 1935, 389.
- densifolius. 1925, 458 ; 1926, 227.
- fusipes albus. 1926, 228.
- lepideus. 1933, 285.
- sibiricus. 1935, 390.
- squamosus. 1925, 440 ; 1932, 299.
- suavissimus. 1933, 225.
- tigrinus. 1932, 298 ; 1951, 82.
- variabilis. 1928, 331.

Leptoglossum retirugum. 1932, 294.
Panellus ringens. 1945, 38.
Panus nanus. 1937, 141.
- patellaris. 1933, 287.
- rudis. 1933, 286 ; 1937, 141.
- stipticus. 1933, 286 ; 1936, 54 ; 1945, 39 ; 1946, 93.
- stipticus var. pluriceps. 1938, 63.
- violaceo-fulvus. 1932, 299.
- violaceo-fulvus f. delastrei. 1933, 287.

Pleurotus applicatus. 1933, 360; 1937, 83.
- auriscalpium. 1930, 220.
- candidissimus. 1947, 209.
- corticatus. 1933, 280 ; 1946, 93.
- craspedius. 1944, 89.
- delastrei. Voir violaceo-fulvus.
- dryinus. 1936, 321 ; 1937, 83.
- eryngii. 1925, 350, 468, 475 ; 1947, 209.
- ilgazicus. 1932, 289.
- lignatilis. 1943, 25.
- lignatilis var. albo-virens. 1943, 25.
- mitis = Pleurotus nemecii. 1933, 283.
- mutilis. 1943, 18.
- nebrodensis. 1925, 350.

Pleurotus nemecii. 1932, 288 ; 1933, 283.
- olearius. 1925, 71.
- ostreatus. 1933, 280 ; 1936, 321 ; 1937, 83, 119 ; 1947, 72.
- ostreatus var. colombinus. 1937, 119.
- ostreatus f. peregrinus. 1947, 72.
- ostreatus f. pulmonarius. 1933, 281.
- ostreatus f. salignus. 1933, 281.
- patellaris. 1936, 321.
- phosphoreus = olearius. 1925, 71.
- pinsitus. 1934, 203 ; 1937, 209 ; 1946, 93.
- pulmonarius = ostreatus f. 1933, 281.
- rudis. 1937, 83.
- salignus = ostreatus f. 1933, 281.
- septicus. 1937, 83.
- serotinus. 1933, 281 ; 1947, 210.
- silvanus. 1933, 363.
- spodoleucus. 1947, 209.
- stipticus. 1935, 390 ; 1937, 83.
- tremulus. 1939, 214.
- violaceo-fulvus f. delastrei. 1935, 390.

Pyrrhoglossum hepatizon. 1953, 173.
- pyrrhus. 1953, 173.

Schizophyllum alneum. 1932, 300.

Marasmiacées.

Crinipellis mauretanicus. 1928, 42.

Collybia acervata. 1927, 178.
- ambusta. 1937, 182.
- atrata. 1937, 182.
- atrata var. pseudo-ambusta. 1928, 43.
- butyracea. 1942, 103 ; 1948, 248.
- clavus. 1928, 199.
- conigena. 1926, 125 ; 1946, 91.
- cycadicola. 1935, 243.
- dryophila. 1932, 287 ; 1942, 102 ; 1948, 248.
- dryophila var. funicularis. 1927, 176.
- fumosa. 1926, 125.

Collybia fusipes. 1933, 78.
- grammocephala. 1932, 287.
- lilacea Quél. = myriadophylla Peck. 1925, 43 ; 1937, 178.
- maculata. 1926, 229 ; 1933, 279 ; 1942, 103.
- myosura. 1926, 126 ; 1931, 129, 135.
- platyphylla. 1946, 91.
- radicata. 1937, 82 ; 1944, 79.
- semitalis. 1926, 125 ; 1927, 142.
- stipitaria. 1937, 82.
- tenacella. 1931, 129, 134.
- velutipes = Myxocollybia. 1937, 118 ; 1953, 234.

Marasmius acicola. 1952, 138.
- badia. 1952, 178.
- brassicolens. 1952, 136.
- brizarum. 1954, 157.
- caryophylleus. 1932, 296.
- caussei. 1937, 265 ; 1952, 179.
- confluens. 1951, 199 ; 1942, 101.
- cupricolor. 1954, 158.
- cupilicola. 1954, 161.
- epodius. 1934, 67.
- fraudulenta. 1952, 179.
- fuscopurpureus. 1931, 135.
- hariolorum. 1951, 202.
- hybridus. 1952, 140.
- longipes. 1952, 178, 179 ; 1948, 249.
- lupuletorum. 1927, 179.
- oreades. 1936, 367 ; 1933, 441.
- perforans. 1932, 296.
- peronatus. 1928, 76 ; 1948, 249.
- rotula. 1942, 101.
- sulcatipes. 1954, 159.
- torquescens. 1933, 218.
- trabutii var. brevisporus. 1928, 43.
- variocosus. 1925, 394 ; 1937, 271.

Mucidula mucida. 1954, 421.
- radicata. 1948, 248.

Mycena alcalina. 1932, 286.
- amicta. 1933, 343.
- aurantio-marginata. 1931, 137.
- = Delicatula bagnolensis. 1926, 62.
- cedretorum. 1928, 39.
- citrino-marginata. 1933, 348.

Mycena crispata. 1948, 8.
- cyanorhiza. 1937, 190.
- epipterygia. 1935, 389.
- excisa. 1937, 118.
- flavo-alba. 1930, 38.
- floridula. 1930, 38.
- galericulata. 1937, 141 ; 1948, 249.
- gypsea. 1937, 118.
- invisibilis. 1943, 16.
- jacobi. 1930, 218.
- langei. 1928, 39.
- lenta. 1928, 40 ; 193è, 141.
- mairei = Omphalia (Gilbert). 1926, 63.
- maura. 1928, 41.
- plicosa. 1932, 286.
- polygramma. 1937, 141 ; 1948, 249.
- speirea. 1937, 193.
- stylobates. 1933, 340.
- tenerrima. 1927, 107.
- viscosissima. 1953, 128.

Mycenella kuhneri. 1940, 63.
Xeromphalina n. genre. 1934, 18.
- cornui. 1936, 131.

Xerula n. genre. (Voir Marasmius).
- badia. 1952, 179.
- caussei. 1937, 265 ; 1952, 179.
- fraudulenta. 1952, 179.
- longipes. 1948, 249 ; 1952, 178.

Tricholomacées.

A. Tricholomées.

Armillaria bulbigera. 1927, 223 ; 1946, 92.
- causseta. 1928, 75.
- constricta. 1927, 222 ; 1929, 304.
- focalis var. minor. 1927, 222.
- kuraiana. 1933, 279.
- mellea. 1928, 326 ; 1936, 321 ; 1937, 118.
- mucida = Mucidula. 1927, 222.

Aspropaxillus n. genre. 1934, 13.
Clitocybe alexandri. 1927, 186 ; 1936, 37.
- angustissima. 1939, 102.
- atrostriata. 1951, 397.
- aurantiaca. 1946, 93.
- candicans. 1926, 123.
- cerussata. 1938, 11.

Clitocybe chudacae. 1928, 38.
- concava. 1931, 96 ; 1951, 392.
- cyanolens. 1951, 387.
- cyathiformis. 1946, 93.
- dealbata. 1937, 119 ; 1938, 11.
- diatreta. 1939, 106 ; 1951, 402.
- diatreta var. fuscescentipes. 1938, 19.
- dicolor. 1951, 390.
- ditopoda var. longispora. 1939, 99.
- ectypa. 1929, 93 ; 1939, 209.
- expallens. 1951, 389.
- floccipes. Voir C. vibecina var. floccipes.
- fragrans. 1931, 96.
- fuligineipes. 1939, 107.
- fuscescentipes. Voir diatreta.
- gallinacea. 1942, 34.
- gangrenosa. 1939, 100.
- geotropa. 1926, 40 ; 1948, 249.
- gyrans. 1926, 124, 188 ; 1951, 399.
- hirneolus. 1946, 183.
- hydrogramma = Omphalia. 1942, 34.
- hydrogramma var. werneri. 1942, 34.
- incarnata. 1951, 398.
- incilis. 1939, 112.
- infundibuliformis. 1932, 285 ; 1946, 93.
- inornata. 1925, 73.
- lignatilis. 1934, 162.
- lituus. 1946, 42 ; 1953, 307.
- longispora. Voir C. ditipoda var. longispora. 1939, 99.
- metachroa. 1926, 123.
- mellea. 1932, 285.
- mortuosa. 1951, 388.
- nebularis. 1942, 103.
- obsoleta. 1931, 96 ; 1939, 110.
- octypa. 1929, 93.
- odora. 1948, 249.
- olida. 1929, 60.
- orbiformis. 1951, 393.
- osmophora. 1935, 115.
- paropsis. 1932, 285.
- pausiaca. 1951, 394.
- phyllophila. 1926, 124.
- pulla. 1951, 393.
- rivulosa. 1938, 12 ; 1946, 43.

Clitocybe rivulosa var. gracilis. 1939, 104.
- rufulo-alutacea. 1946, 46.
- salmonea. 1946, 45.
- senilis. 1948, 15.
- sinopica var. microspora. 1938, 73.
- straminea. 1946, 48.
- suaveolens. 1931, 96 ; 1942, 102.
- subalutacea. 1931, 94.
- tornata. 1951, 402.
- trullaeformis. 1948, 12.
- umbilicata. 1951, 395.
- umbonata. 1931, 146.
- vermicularis. 1925, 42.
- vibecina. 1926, 123.
- vibecina var. floccipes. 1946, 47.
- werneri. Voir hydrogramma var.werneri. 1942, 34.

Cantharellula obbata = Hygrophoropsis. 1939, 123.
Laccaria amethystina. 1936, 363.
- laccata. 1936, 368.

Lepista = Clitocybe.
- amara. 1930, 216.
- flaccida. 1927, 190.
- gilva. 1936, 39 ; 1927, 186.
- inversa. 1927, 190 ; 1948, 249.
- splendens. 1927, 189.

Leucopaxillus n. genre. 1925, 391.
- paradoxus. 1925, 391.
- pseudoacerbus. 1925, 392.

Melanoleuca (Etude du genre). 1948, 141 ; (Clé) 1948, 151.
- adstringens. 1938, 19 ; 1948, 163.
- albo-flavida. 1937, 82.
- arcuatum var. cognatum. 1938, 19.
- brevipes. 1948, 156.
- cavipes. 1948, 164.
- cnista. 1934, 164.
- cognata. 1938, 19 ; 1942, 101 ; 1948, 162.
- contracta. 1948, 159.
- evenosa. 1927, 184 ; 1938, 20 ; 1948, 164.
- excissa. 1948, 157.
- grammopodia. 1948, 156 ; 1951, 82.
- hariolorum. 1942, 101.
- humilis. 1948, 158.
- intervenosa. 1948, 160.
- leucophylla. 1948, 161.
- luscina. 1948, 154.

Melanoleuca luteosperma. 1948, 161.
- microcephala. 1948, 155.
- nigripes. 1948, 164.
- rasilis. 1948, 156.
- strictipes. 1948, 160.
- stridula. 1948, 154.
- subpulverulenta. 1948, 159.
- tabularis. 1948, 163.
- verrucipes. 1948, 153.
- vulgaris. 1937, 118 ; 1942, 103 ; 1948, 162 ; 1951, 82.

Omphalia. 1942, 81.
- browni. 1939, 212.
- campanella. 1933, 278.
- cyathella. 1942, 105.
- demissa. 1942, 86.
- discorosea. 1933, 278.
- fibula. 1936, 134.
- gracillima. 1932, 287.
- hepatica. 1932, 286.
- hydrogramma. 1932, 286 ; 1942, 34.
- mairei. 1926, 63 ; 1937, 119.
- maura. 1937, 195.
- mauretanica. 1928, 43.
- muralis. 1942, 84.
- tubarioides. 1930, 218.
- umbellifera. 1942, 85.

Tricholoma acerbum. 1946, 92.
- aggregatum. 1925, 40 ; 1931, 139 ; 1948, 249.
- aggregatum var. cartilagineum. 1931, 141.
- aggregatum var. cinerascens. 1931, 141.
- albatum. 1938, 67.
- albellum. 1938, 75.
- albo-brunneum. 1946, 92.
- album. 1927, 180.
- argyraceum. 1925, 38.
- atro-cinereum. 1943, 9.
- atro-squamosum. 1929, 59 , 301.
- atro-squamosum var. squarrulosum. 1929, 59.
- aurantium. 1932, 284.
- buxeum. 1930, 215.
- carnea. 1927, 229.
- cartilagineum. Voir aggregatum.
- chrysenteron. 1927, 229.
- cinerascens. Voir aggregatum.
- cnista. 1934, 164.
- columbetta. 1929, 301 ; 1946, 92.
- conglobatum. 1933, 278.
- constricta. 1949, 182.

Tricholoma cuneifolium. 1943; 9.
- elytroides. 1949, 132.
- fumosum. 1925, 41.
- geminum. 1927, 224.
- glaucocanum. Voir nudum var. glaucocanum. 1928, 103.
- guernisaci. 1926, 173 ; 1927, 263.
- imbricatum. 1928, 76.
- immundum. 1931, 143.
- inamoenum. 1927, 180 ; 1939, 206.
- infumatum. 1928, 109 ; 1931, 144.
- ionides. 1927, 229.
- irinum var. alba. 1927, 223.
- lascivum. 1927, 184.
- medium. 1926, 121.
- melaleucum. 1931, 91.
- miculatum. 1927, 228.
- murinaceum. 1927, 225 ; 1929, 53, 55, 301 ; 1954, 422.
- nigromarginatum. 1931, 93.
- nudum. Voir suite à Rhodopaxillus. 1928, 307.
- nudum var. glaucocanum. 1928, 103.
- olivascens. 1943, 5.
- portentosum. 1946, 92.
- psammopodum. 1927, 224.
- pseudoacerbum. 1926, 173 ; 1927, 117, 263.
- rutilans. 1932, 284 ; 1946, 92.
- saevum. 1927, 230 ; 1928, 307. Voir suite à Rhodopaxillus.
- saponaceum. 1948, 249.
- scalpturatum. 1925, 38.
- sejunctum. 1946, 92.
- semitale. 1925, 41 ; 1927, 142 ; 1931, 144.
- sordidum. 1928, 308.
- squarrulosum. Voir atrosquamosum var. squarrulosum. 1929, 59.
- striatum. 1932, 284.
- terreum. 1925, 38 ; 1936, 377 ; 1946, 92.
- trigonosporum. 1931, 144.
- truncatum. 1947, 209.
- virgatum. 1927, 225 ; 1928, 75.
- virgatum var. sciodes. 1929, 59.

B. Lyophyllées.

Lyophyllum leucophaeatum. 1942, 90.
Tephrophana palustris. 1939, 204.

C. Orcellées.

Clitopilus orcella. 1948, 248.
- popinalis = Rhodopaxillus lutetianus Gilbert. 1926, 66.
Macrocystidia cucumis f. minor. 1933, 373.
- occidentalis. 1953, 178.
Rhodocybe pseudonitellina. 1953, 156, 197.
Rhodopaxillus lutetianus. 1926, 66.
- nimbatus. 1951, 82.
- nudus. 1928, 307 ; 1937, 118 ; 1939, 121 ; 1942, 103.
- saevus. 1927, 230 ; 1928, 307 ; 1946, 92.
- rhodotus palmatus f. cystidiophora. 1932, 76.
Ripartites tricholoma. 1927, 154.

Rhodophyllacées.

Claudopus byssisedus. 1954, 421.
Eccilia griseorubella. 1927, 172.
- rugosa. 1942, 40.
Entoloma (Les Entolomes printaniers). 1947, 187.
(Clé analytique). 1947, 195 ; 1953, 158.
- ameides. 1925, 45 ; 1929, 52.
- aripoanum. 1953, 163, 196.
- bakeri. 1953, 162, 196.
- brunneostriatum. 1953, 166, 196.
- cubensis. 1953, 168.
- clypeatum. 1948, 248.
- cyathiformis. 1953, 163, 196.
- excentricum. 1927, 174.
- howellii. 1953, 159.
- inocephalum. 1953, 160.
- madidum. 1954, 421.
- metale. 1953, 160.
- murraii. 1953, 159.
- naranjanum. 1953, 167, 195.
- nidorosum. 1946, 91.
- obscurum. 1953, 167, 196.

Entoloma papillatum. 1953, 162.
- pinnum. 1953, 160.
- lividum var. pratensis. 1948, 253.
- pratensis. Voir Entoloma lividum.
- rhodopolium. 1930, 86 ; 1931, 87 ; 1946, 91.
- sericatum. 1937, 273.
- siparianum. 1953, 160, 195.
- stylophorum. 1953, 165.
- trinitensis. 1953, 165.
- tucuchensis. 1953, 161, 196.
- umbilicatum. 1953, 168, 195.
- underwoodii. 1953, 166.
Entolomina nov. genre. 1951, 194.
Leptonia dysthales. 1926, 78.
- euchlora. 1927, 170.
- lactinella. 1926, 70.
- rhombispora. 1929, 276.
Limacella delicata. 1936, 201.
- furnacea. 1928, 165 ; 1936, 199.
- glioderma. 1936, 200.
- illinata. 1936, 198.
Nolanea africana. 1928, 44.
- cetrata. 1928, 51.
- hirtipes. 1929, 47.
- juncea var. cuspidata. 1936, 137.
- mammosa. 1929, 50.
- minuta. 1937, 213.
- rhodoura. 1933, 253.
- rickeni. 1952, 265.
- staurospora. 1929, 49.
- vinacea. 1937, 277.
Rhodophyllus. 1932, 306 ; 1933, 422.
- (Classification). 1932, 314, 319.
- (Clé analytique). 1947, 195.
- (Sectionnement). 1937, 319.
- (Taxonomie). 1947, 99.
- aprilis. 1951, 209.
- aprilis f. hybridus. 1947, 201.
- aprilis f. majus. 1947, 200.
- aprilis f. typicus. 1947, 199.
- cancrinus. 1937, 120.
- clypeatus. 1947, 198 ; 1951, 210.
- exilis. 1944, 95.
- eximius. 1944, 99.
- fulviceps. 1932, 321.
- fusco-grisellus. 1933, 436.
- hypopolius. 1932, 315.
- niphoides. 1947, 198 ; 1951, 215.
- parasiticus. 1944, 91.
Rhodophyllus pisciodorus. 1932, 316.
- putus. 1932, 322.
- pyrospilus. 1944, 96.
- rhodocylix. 1932, 313 ; 1933, 437.
- rickeni. 1932, 320.
- rickeni var. obscurior. 1932, 320.
- rickeni var. subrugosus. 1932, 321.
- saundersii. 1951, 211.
- scabrosus. 1944, 97.
- scabrosus f. minor. 1944, 99.
- sepium. 1947, 196 ; 1951, 208.
- speculum. 1951, 214.
- woodianus. 1933, 435.

Naucoriacées.

A. Cortinariées.

Alnicola badia. 1931, 239.
- clavuligera. 1942, 124, 148.
- luteolofibrillosa. 1931, 237.
- scolecina. 1942, 121.
- suavis. 1931, 238.
- submelinoides. 1930, 223 ; 1931, 243.
Cortinarius (Clé des Myxacia). 1950, 139.
- (Clé des Scauri). 1951, 225.
- aberrans. 1951, 243, 290.
- acutus. 1926, 128 ; 1939, 201 ; 1940, 116.
- aereus. 1951, 253, 300.
- aggregatus. 1951, 234, 277.
- albescens. Voir cookianus. 1951, 267, 317.
- albidus. 1951, 263, 316.
- albofimbriatus. 1940, 94.
- albo-violaceus. 1935, 322 ; 1954, 421.
- alcalinophilus. 1951, 253, 301.
- aleuriosmus. 1951, 243, 289.
- allutus. 1939, 63.
- allutus var. luteus. 1939, 64 ; 1951, 268, 318.
- allutus var. rufescens. 1939, 66 ; 1951, 267, 317.
- alpinus. 1950, 164.
- amoenolens. 1951, 240, 284.

Cortinarius anomalus. 1937, 143.
- arcifolius. 1936, 160 ; 1951, 237, 281.
- arcuatorum. 1939, 80 ; 1951, 236, 279.
- arenatus. 1925, 53.
- argillopallidus. 1951, 264, 316.
- argyrophilus. 1951, 254, 302.
- armeniacus. 1948, 47.
- armillariellus. 1940, 88.
- arvinaceus. 1927, 165.
- atrovirens. 1939, 93 ; 1951, 262, 314.
- aureifolius. 1939, 294.
- azureus. 1937, 151.
- balaustinus. 1940, 98.
- balteato-cumatilis. 1939, 186.
- balteatus. 1936, 291 ; 1939, 187.
- betulinus. 1950, 151.
- bicolor. 1940, 85.
- biveloides. 1948, 33.
- bivelus. 1934, 234 ; 1948, 33.
- bolaris. 1935, 326.
- boudieri. 1936, 153 ; 1939, 70 ; 1951, 238, 281.
- boudieri f. pseudoarcuatus. 1951, 242, 288.
- brosselini. 1938, 23.
- bulliardi. 1937, 304.
- butyraceus. 1950, 153.
- caesio-cyaneus. 1935, 40 ; 1951, 236, 280.
- caesio-cyaneus var. juranus. 1939, 71 ; 1951, 237, 280.
- caesio-stramineus. 1939, 72 ; 1951, 238, 281.
- callisteus. 1937, 66.
- calochrous. 1935, 75 ; 1951, 243, 289.
- calochrous f. violascens. 1951, 242, 289.
- camphoratus. 1944, 64.
- camurus. 1926, 128.
- caninus. 1937, 155.
- caninus var. saugeti. 1937, 160.
- castaneus. 1946, 91.
- caroli. 1951, 242, 289.
- causticus. 1936, 294.
- cedretorum. 1939, 178 ; 1951, 245, 293.
- cepnalixus. 1936, 279.
- cinnamomeobadius. 1939, 299.
- cinnamomeofulvus. 1939, 292.

Cortinarius cinnamomeolutescens. 1939, 289.
- cinnamomeus. 1939, 284, 286.
- citrinus. 1939, 176 ; 1951, 259, 309.
- claroflavus. 1951, 249, 297.
- codinae. 1951, 276, 322.
- coerulescens. 1935, 34 ; 1939, 71 ; 1951, 237, 280.
- coerulescens var. cyaneus. 1951, 237, 280.
- coerulescens f. decipiens. 1951, 237, 281.
- coeruliipes. Voir C. mucosus var. coeruliipes. 1950, 164.
- coerulescentium. 1951, 238, 282.
- collinitus. 1927, 164 ; 1935, 205 ; 1938, 226, 228.
- collinitus var. pumilus. 1938, 233.
- collinitus var. repandus. 1938, 235.
- collinitus var. squamosipes. 1938, 231.
- collinitus var. (typicus), olympiana, trivialis, repanda, squamosipes, subolivascens, aurantia, etc. 1950, 160.
- concinnus. 1936, 89 ; 1939, 302.
- conglobatus. 1951, 241, 286.
- conicus. 1941, 21.
- cookianus. 1951, 243, 289.
- cookianus f. albescens. 1951, 267, 317.
- corrosus. 1951, 274, 321.
- corrugatus. 1951, 270, 318.
- corrugatus var. subsquamosus. 1951, 270, 319.
- cortinatus. 1941, 23.
- cotoneus. 1937, 56.
- croceifolius. 1939, 297.
- croceo-coeruleus. 1935, 213 ; 1938, 227 ; 1950, 151.
- croceus. 1939, 294.
- danili. 1943, 57.
- cyanopus. 1935, 62 ; 1951, 234, 240, 241, 242, 277, 287.
- decipiens. 1926, 126.
- decipiens var. rickeniana. 1943, 56.
- delibutus. 1938, 239.
- delibutus var. megalospora. 1950, 163.
- delibutus var. parvulus. 1941, 27 ; 1950, 143, 152.

Cortinarius dibaphus. 1935, 50 ; 1936, 163 ; 1939, 78 ; 1951, 235, 279.
- dibaphus var. xanthophyllus. 1951, 245, 293.
- dionysae. 1933, 230 ; 1935, 55 ; 1939, 76.
- dionysae f. avellana. 1951, 241, 287.
- dionysae f. caesio-coerulea. 1951, 236, 280.
- dionysae f. olivacea. 1951, 238, 283.
- duracinus. 1938, 38.
- elatior. 1927, 165 ; 1938, 236 ; 1946, 90 ; 1950, 156.
- elegantioides. 1951, 252, 300.
- elegantior. 1935, 82 ; 1936, 169 ; 1939, 176 ; 1951, 246, 294 ; 247, 295 ; 259, 309.
- elegantissimus. 1951, 248, 295 ; 252, 300.
- elotus. 1951, 260, 312.
- emollitus. 1936, 296.
- emunctus. 1950, 151.
- epipoleus. 1950, 146, 149.
- erythrinus. 1937, 310.
- euchrous. 1939, 184.
- eufulmineus. 1951, 257, 306.
- evernius. 1937, 72.
- evosmus. 1951, 263, 315.
- finitimus. 1934, 79.
- flavescens = flavescentium. 1939, 180 ; 1951, 246, 259, 294, 309.
- flavo-virens. 1939, 182 ; 1951, 258, 308.
- friesii. 1951, 275, 322.
- fulgens. 1939, 166, 172 ; 1951, 247, 249, 295, 298.
- fulgoalbus. 1951, 269, 318.
- fuligineus. 1944, 81.
- fulmineus. 1939, 172 ; 1946, 90 ; 1951, 256, 305.
- fulmineus var. sulphureus. 1951, 251, 300.
- fulvaureus. 1944, 69.
- fulvoincarnatus. 1939, 79 ; 1951, 236.
- fulvo-isabellinus. 1941, 33.
- fulvo-ochrascens. 1943, 54 ; 1951, 241, 286.
- fulvo-olivaceus. 1951, 244, 292.
- fuscomaculatus. 1951, 234, 277.
- gentilis. 1938, 89.
- glandicolor. 1936, 97.

Cortinarius glaucopus. 1935, 58 ; 1936, 157 ; 1951, 239, 284.
- glaucopus var. rubrovelatus. 1951, 238, 283.
- glutinosus. 1951, 272, 320.
- gregis. 1951, 273, 320.
- guttatus. 1951, 258, 307.
- helvolus. 1946, 215.
- hemitrichus. 1934, 85.
- herbarum. 1951, 271, 319.
- herpeticus. 1939, 74 ; 1951, 238, 283.
- hillieri. 1938, 107.
- hinnuleus. 1936, 92.
- hinnuleus var. radicata. 1941, 17.
- hinnuloides. 1941, 19.
- holophaeus. 1948, 36.
- illibatus. 1944, 61 ; 1946, 205.
- incinus. 1941, 29.
- infractus.1932, 90 ; 1935, 237.
- infractus f. subhygrophans. 1939, 189.
- infucatus. 1934, 170.
- intermedius. 1951, 248, 296.
- ionochlorus. 1951, 244, 292.
- isabellinus. 1925, 55.
- juranus. Voir caesio-cyaneus var. juranus.
- kauffmanianus. 1946, 213.
- langei. Voir sulphurinus var. langei. 1939, 169.
- largus. 1927, 168 ; 1935, 223 ; 1948, 248.
- largus var. variecolor. 1927, 167.
- lebretonii. 1937, 148.
- leptocephalus. Voir C. multiformis var. leptocephalus. 1939, 166 ; 1951, 271, 320.
- leucophanes. 1951, 274, 321.
- lilacinopes. 1951, 241, 287.
- luci. 1940, 104.
- luteoimmarginatus. 1939, 68 ; 1951, 270, 318.
- lutescens. 1939, 171.
- lutulentus. 1953, 265, 317.
- malachius. 1946, 210.
- metrodii. 1946, 204 ; 1950, 163. = Myxacium illibatum. 1944, 61.
- miniatopus. 1940, 96.
- minor. 1951, 272, 320.
- mucifluoides. 1950, 156.
- mucifluus. 1927, 165 ; 1934, 284 ; 1938, 226.

Cortinarius mucosus. 1927, 165 ; 1934, 278 ; 1938, 226 ; 1950, 163.
- mucosus var. coeruliipes. 1950, 164.
- multiformis. 1935, 93 ; 1939, 61 ; 1951, 266, 271, 317, 319 ; 1954, 421.
- multiformis var. leptocephalus. 1939, 166 ; 1951, 271, 320.
- multivagus. 1941, 34.
- myrtillinus. 1946, 208, 210.
- nanceiensis. 1935, 219.
- napus. 1935, 98 ; 1939, 63 ; 1951, 265, 266, 317.
- napus f. secretani. 1951, 266, 317.
- nemorensis. 1936, 287.
- nemorosus. 1936, 166 ; 1939, 78 ; 1951, 235, 279.
- obtusoides. 1950, 154.
- obtusus. 1926, 127 ; 1940, 109.
- ochropallidus. 1936, 151 ; 1939, 61 ; 1951, 271, 320.
- odorifer. 1951, 260, 311.
- olivascens. 1941, 24.
- olivascentium. 1951, 258, 309.
- olivellus. 1951, 259, 310.
- orellanoides. 1937, 61.
- orellanus. 1936, 85 ; 1937, 61.
- orichalceus. 1936, 170 ; 1951, 255, 260, 305, 311.
- paleaceus. 1933, 207.
- paramenolens. 1951, 241, 285.
- parafulmineus. 1951, 257, 307.
- parherpeticus. 1951, 239, 284.
- parvus. 1935, 79 ; 1951, 242, 289.
- parvulus. Voir C. delibutus var. parvulus. 1941, 27.
- pavonius. 1944, 67.
- percomis. 1935, 216.
- persoonii. 1932, 326.
- phoeniceus. 1935, 333.
- pholideus. 1925, 53 ; 1937, 52.
- pistorius. 1951, 240, 285.
- phyllophilus. 1951, 255, 305.
- plumiger. 1946, 206.
- pluvius. 1950, 164.
- polychrous. 1951, 244, 261, 291.
Cortinarius polymorphus. 1951, 270, 319.
- praestans. 1935, 232 ; 1948, 248.
- prasinocyaneus. 1939, 91 ; 1951, 239, 283.
- prasinus. 1939, 88 ; 1951, 261, 314.
- prasinus var. odoratus. 1949, 180.
- privigno-fulvus. 1948, 43.
- privignoides. 1948, 40.
- privignorum. 1948, 42.
- privignus. 1948, 35.
- psammocephalus. 1925, 53.
- pseudoarcuatus. Voir C. boudieri var. pseudoarcuatus. 1951, 242, 288.
- pseudobolaris. 1935, 330.
- pseudo-crassus. 1948, 18.
- pseudoduracinus. 1938, 41.
- pseudofulgens. 1951, 255, 304.
- pseudofulmineus. 1939, 174 ; 1951, 257, 306.
- pseudonapus. 1951, 266, 317.
- pseudoprivignus. 1948, 41.
- pseudoscutulatus. 1938, 103.
- pumilus = C. collinitus var. pumilus. 1938, 233 ; 1950, 159, 160.
- purpurascens. 1935, 66 ; 1939, 84 (groupe d'espèces) ; 1946, 91.
- purpurascens f. eumarginata. 1939, 85 ; 1951, 234, 278.
- purpurascens f. gracilis. 1951, 235, 278.
- purpurascens f. largusoides. 1939, 87 ; 1951, 233, 276, 277.
- radicata. Voir C. hinnuleus var. radicata. 1941, 17.
- rapaceus. 1936, 148.
- rapaceus var. major. 1939, 62 ; 1951, 265, 316.
- rapaceus var. major f. caesiovergens. 1951, 265, 316.
- rapaceus f. medius. 1936, 148 ; 1939, 62 ; 1951, 265, 316.
- rapaceus var. minor. 1939, 62 ; 1951, 264, 316.
- repandus. Voir C. collinitus var. repandus. 1938, 235.
- rigens. 1937, 124 ; 1940, 102.
- rigidus. 1938, 91.
- romagnesii. 1937, 313.

Cortinarius rubellopes. 1937, 316.
- rufo-olivaceus. 1935, 71 ; 1951, 262, 314.
- rugosus. 1944, 71.
- russus. 1944, 60 ; 1951, 245, 293.
- safranopes. 1938, 95.
- saginus. 1939, 193.
- salor. 1925, 51 ; 1950, 144.
- saporatus. 1951, 263, 315.
- saturninus. 1938, 29.
- saugeti. Voir C. caninus var. saugeti. 1937, 160.
- scandens. 1926, 127.
- scauroides. 1939, 76 ; 1951, 234.
- scaurus. 1939, 199 ; 1943, 52 ; 1951, 261, 314.
- sciophyllus. 1926, 128 ; 1938, 35.
- scutulatus. 1938, 98.
- semi-sanguineus. 1935, 337 ; 1939, 302.
- sodagnitus. 1935, 44 ; 1939, 78 ; 1951, 236, 280.
- solitarius. 1951, 254, 303.
- sordescens. 1944, 66.
- sphaerosperma. 1951, 233, 276.
- spilomeus. 1944, 62.
- spilomeus var. subspilomeus. 1944, 75.
- splendens. 1936, 174 ; 1939, 178 ; 1951, 248, 296.
- splendens var. majusculus. 1951, 248, 296.
- squamosipes. Voir C. collinitus var. squamosipes. 1938, 231.
- squamulosus. 1948, 56.
- stemmatus. 1937, 77.
- striatulus. 1940, 112.
- suaveolens. 1939, 82 ; 1951, 236, 280.
- subanthracinus. 1944, 73.
- subbalaustinus. 1940, 100.
- subcaninus. 1928, 45.
- subelegantior. 1951, 248, 295.
- subfusipes. 1939, 300.
- subincarnatus. 1941, 26.
- subionochlorus. 1951, 244, 292.
- sublanatus. 1927, 169.
- sublimonius. 1931, 101.
- subpurpurascens. 1951, 235, 278.
- subsaturninus. 1938, 32.
Cortinarius subsolitarius. 1951, 254, 302.
- subtortus. 1935, 192.
- subturbinatus. 1939, 167 ; 1951, 269, 318.
- subturbinatus var. langei. 1951, 269, 318.
- subumbilicatus. 1951, 240, 285.
- subvirentophyllus. 1951, 261, 312.
- sulphureus. 1951, 247, 294.
- sulphurinus ou sulfurinus. 1951, 249, 298.
- sulphureus var. langei. 1939, 169.
- talus. 1951, 272, 273, 320, 321.
- testaceus. 1951, 274, 321.
- tophaceus. 1937, 301.
- torvus. 1934, 226.
- tricognandus. 1943, 58.
- triformis. 1948, 45.
- triumphans. 1939, 191.
- turbinatus. 1935, 88 ; 1951, 246, 258, 268, 271, 294, 300, 308, 318, 320.
- turbinatus var. ferrugineus. 1951, 275, 321.
- turbinatus var. fuscescens. 1951, 255, 305.
- turbinatus var. lutescens. 1951, 252, 300.
- turmalis. 1936, 285.
- uliginobtusus. 1940, 107.
- uliginosus. 1939, 301.
- umbonatus. 1946, 217.
- umidicola. 1937, 75.
- uraceus. 1940, 91.
- variecolor. Voir C. largus var. variecolor. 1927, 167 ; 1935, 226.
- variegatus. 1951, 262, 315.
- variegatus var. marginatus. 1951, 263, 315.
- velenovskyi. 1940, 115.
- venetus. 1937, 307.
- veregregius. 1938, 104.
- versicolor. 1941, 31.
- vibratilis. 1935, 210 ; 1938, 227 ; 1950, 152.
- violaceocalcarius. 1951, 235, 279.
- violaceocinereus. 1946, 214.
- violaceus. 1935, 317 ; 1948, 248.
- violascens. Voir C. calochrous f. violascens. 1951, 242, 289.
- vulpinus. 1946, 207.

Cortinarius xanthophyllus. 1951, 245, 293.
Fulvidula. 1942, 88.
- bellula. 1948, 23.
Galera. 1956, 157, 158.
- antipoda. 1932, 291.
- appendiculata. 1951, 148.
- graminea. 1951, 151.
- lactea. 1951, 147.
- lactea f. semi-globata. 1951, 147.
- lateritia. 1951, 147.
- martiana. 1953, 192.
- mycenopsis. 1933, 371 ; 1949, 155 ; 1951, 155.
- paludosa. 1951, 152.
- pygmeoaffinis. 1951, 146.
- ravida. 1951, 149.
- rickeni. 1951, 147.
- siliginea. 1951, 145.
- sphagnorum. 1951, 151.
- spicula. 1951, 140.
- tenera. 1948, 247 ; 1951, 141.
- tenera var. antipus. 1951, 143.
- tenera f. minor. 1951, 144, 145.
- tenera f. tenella. 1951, 144, 145.
- teneroides. 1951, 141.
- triscopoda. 1951, 153.
- triscopa. 1951, 154.
Galerella plicatella. 1953, 190.
Galerina. 1953, 190.
- clavus. 1942, 144, 149.
- gibbosa. 1936, 140.
- graminea. 1937, 121.
- muricellospora. 1951, 153.
- nana. 1951, 155.
- paludosa. 1951, 152.
- pinetorum. 1940, 52.
- stagnina. 1950, 31 ; 1951, 152.
- uncialis. 1951, 155.
Galerula cedretorum. 1928, 49.
- echinospora. 1953, 191.
- hypnorum. 1951, 153.
- hypnorum var. macrospora. 1928, 49.
- martiana. 1953, 192.
- mexicana. 1953, 192.
- reflexa. 1953, 192.
- velenovskyi. 1934, 78.
Hebeloma anthracophilum. 1927, 143.
- cistophilum. 1928, 46.
- crustiliniforme. 1946, 90.
Inocybe. 1928, 170 ; (Classification) 1931, 255 : (Tableau synoptique) 1932, 151 ; (Clé analytique) 1933, 119.
Inocybe acuta. 1932, 130.
- asterospora. 1933, 105 ; 1929, 39.
- bresadolae. 1932, 158.
- brunnea. 1929, 39.
- calospora. 1932, 152.
- casimiri. 1928, 177, 187.
- cookei. 1929, 39.
- decipiens. 1933, 98.
- decipiens subsp. nuda. 1933, 100.
- decipientoides. 1932, 141.
- descissa. 1929, 45.
- eutheles. 1929, 40, 41.
- fastigiata. 1927, 207 ; 1946, 91.
- fibrosoides. 1933, 91.
- geophylla var. lateritia. 1952, 369.
- globocystis var. turgens. 1934, 167.
- grammata. 1933, 101.
- lanuginosa. 1927, 142 ; 1928, 170, (Groupe) 184 ; 1946, 91.
- lasseri. 1953, 176, 197.
- leptophylla. 1928, 187.
- leptophylla var. cystomarginata. 1928, 187.
- longicystis. 1928, 179, 188.
- mixtilis. 1933, 88.
- napipes. 1932, 127.
- oblectabilis. 1933, 109.
- oblectabilis f. decemgibbosa. 1933, 116.
- oblectabilis f. macrospora. 1933, 118.
- ovatocystis. 1928, 181.
- pachycreas. 1931, 250.
- paludinella. 1933, 82.
- patouillardi. 1925, 49.
- petiginosa. 1932, 155.
- piriodora. 1946, 91.
- plumosa. 1928, 182.
- praetervisa. 1933, 93.
- pseudoasterospora. 1932, 121.
- pseudohiulca. 1933, 107.
- queleti. 1929, 40.
- relicina. 1928, 186.
- rimosa. 1927, 158.
- sabuletorum. 1928, 186.
- subcarpta. 1932, 137.
- subrubens. 1932, 290.
- turgens. Voir I. globocystis var. turgens. 1934, 167.
- umbrina. 1932, 124.

Inocybe whitei. 1934, 72.
- xanthomelas. 1933, 84.
- xanthomelas (forme lyonnaise). 1933, 86.
Naucoria (Clé). 1953, 181.
- amarescens. 1934, 179.
- bohemica. 1935, 197.
- camerina. 1951, 154.
- centunculus f. luxurians. 1942, 129, 149.
- centunculus var. obscura. 1942, 130, 149.
- corticola. 1953, 184.
- cyathicola. 1953, 184.
- dasypus. 1937, 121.
- distantifolia. 1953, 183.
- effugiens. 1934, 172.
- erinacea. 1937, 142.
- flexuosa. 1934, 176.
- fulgens. 1937, 267.
- gracilis. Voir N. muricata var. gracilis. 1942, 133.
- granulosa. 1942, 135.
- hepaticicola. 1953, 184.
- jalapensis. 1953, 186.
- luxurians. Voir N. centunculus f. luxurians. 1942, 129, 149.
- mexicana. 1953, 186.
- montana. 1953, 186.
- muricata var. gracilis. 1942, 133.
- myosotis. 1936, 142.
- obscura. Voir N. centunculus var. obscura. 1942, 130, 149.
- pellucida. 1953, 182.
- pygmea. 1934, 173.
- reducta. 1942, 132.
- semiorbicularis. 1932, 292.
- sideroides. 1934, 178 ; 1951, 155.
- siparia f. umbonata. 1942, 136, 149.
- spinulifer. 1953, 187.
- striaepes. 1951, 148.
- striipes. 1951, 148.
- subsphaerospora. 1948, 21.
- submelinoides. 1930, 223.
- temulenta f. flexuosa. 1934, 176.
- temulenta f. typica. 1934, 175.
- tepitensis. 1953, 181.
- umbonata. Voir N. siparia f. umbonata. 1942, 136, 149.
- underwoodii. 1953, 187.
- xuchilensis. 1953, 187.
Nemecomyces n. genre. 1933, 284.
- genezareticus. 1933, 285.
- mongolicus. 1933, 284.
Tubaria lutaria. 1928, 47.
- furfuracea. 1948, 248.
- stagnina. 1950, 31.
- umbrina. 1928, 48.

B. Géophilées.

Deconica. Voir Geophila.
Flammula abstrusa. 1942, 142.
- aureobrunnea. 1953, 171.
- chrysopella. 1953, 169.
- croceolamellata. 1938, 251.
- henningsii. 1937, 279.
- limulata. 1942, 140.
- liquiritiae. 1932, 291.
- lubrica. 1936, 35.
- ochrochlora. 1934, 181.
- penetrans. 1932, 291.
- sapinea. 1935, 391.
- spumosa. 1932, 291.
Geophila bullacea. 1937, 125.
- inquilina. 1937, 125.
Hypholoma. 1936, 9.
- (Clé des petites espèces). 1936, 30.
- agaves. 1928, 50.
- appendiculatum. 1925, 57 ; 1937, 142.
- candolleanum. 1925, 58.
- cyanescens. 1928, 51.
- dispersum. 1936, 21.
- ericaceum. 1936, 23.
- hydrophilum. 1925, 58.
- polytrichi. 1936, 17.
- scobinaceum. 1929, 36.
- subericaeum. 1936, 27.
- subericaeum f. verrucosum. 1936, 28.
- sublateritium. 1934, 213 ; 1946, 90.
- sylvestre. 1934, 183.
Pholiota. 1934, 270.
- adiposa. 1925, 46 ; 1927, 153 ; 1932, 290.
- aurea. 1942, 100.
- aurivella. 1925, 46 ; 1933, 284.
- blattaria. 1951, 148.
- brittoniae. 1953, 175.
- discolor. 1953, 176.
- marginata. 1951, 156.
- mycenoides. 1951, 154.
- flammans. 1932, 291.
- mutabilis. 1946, 90.
- praecox. 1937, 81.

Pholiota rigidipes. 1933, 283.
- squarrosa. 1935, 390 ; 1936, 322 ; 1937, 123 ; 1946, 90.
- spectabilis. 1946, 90.
- suberis. 1928, 45 ; 1937, 141.
- togularis. 1951, 151.
- unicolor. 1926, 126 ; 1951, 156.

Psylocybe aleuriata. 1925, 459 ; 1926, 230.
- sarcocephala. 1951, 82.
- spadicea. 1933, 122.
- turficola. 1939, 196.

Stropharia aeruginosa. 1937, 124; 1946, 90.
- coronilla. 1946, 90.
- depilata. 1949, 175.
- ferrii. 1937, 231.
- inuncta. 1937, 124.
- semiglobata. 1927, 150 ; 1932, 1948, 247.

C. Bolbitiées.

Agrocybe arvalis. 1934, 171.
- broadwayi. 1953, 179.
- dura. 1952, 264.
- sacchari. 1953, 180.
- vervacti. 1942, 138.

Bolbitius broadwayi. 1953, 193.
- mexicanus. 1953, 193.

Conocybe. 1952, 258 (Villosité).
- aberrans. 1940, 50.
- bulbifera f. bispora. 1942, 147.
- crispa. 1953, 188.
- crispa var. microspora. 1953, 189.
- hexagonospora. 1940, 48.
- lactea. 1940, 46.
- lateritia. 1937, 123.
- mesospora var. brunneola. 1937, 123.
- microspora. 1953, 189.
- tenera. 1937, 123 ; 1948, 247 ; (Réaction à l'ammoniaque) 1951, 159.
- teneroides. 1942, 146.
- togularis. 1937, 123.

Panaeolus campanulatus. 1937, 128 ; 1951, 440.
- fimicola. 1951, 440.
- foenisecii. 1937, 128 ; 1951, 440.
- guttulatus. 1926, 230.
- papilionaceus. 1948, 247.
- semi-ovatus f. exannulatus. 1951, 443.

Panaeolus separatus. 1951, 438.
- solidipes. 1951, 443.
- teutonicus. 1950, 106 ; 1951, 443.

Coprinacées.

Coprinus (Clé des Micacei). 1947, 169.
- angulatus. 1944, 14.
- atramentarius. 1937, 125.
- auricomus. 1934, 53, 60 ; 1937, 126.
- boudieri. 1938, 122, 127.
- comatus. 1931, 109 ; 1937, 126.
- congregatus. 1951, 81.
- digitalis. 1946, 89.
- dilectus. 1941, 46.
- disseminatus. 1937, 125 ; 1951, 81.
- ephemerus. 1947, 75.
- erythrocephalus. 1941, 36.
- funariarum. 1937, 346.
- galericuliformis. 1947, 86.
- heterosetulosus. 1947, 78.
- insignis. 1937, 142.
- isabellinus. Voir C. patouillardi var. isabellinus. 1947, 83.
- lagopus. 1944, 28.
- lagopus var. sphaerosporus. 1944, 31.
- lipophilus. Voir C. patouillardi var. lipophilus. 1934, 187.
- martinii. 1937, 286.
- micaceus. 1926, 133 ; 1929, 216 ; 1937, 126 ; 1938, 9 ; 1946, 89.
- microsporus. Voir C. plicatilis var. microsporus. 1934, 57.
- narcoticus. 1944, 43.
- patouillardi var. isabellinus. 1947, 83.
- patouillardi var. lipophilus. 1934, 187.
- picaceus. 1948, 247.
- plicatilis. 1934, 53, 55 ; 1937, 126.
- plicatilis var. microsporus. 1934, 53, 57.
- poliomallus. 1947, 80.
- pseudocortinatus. 1947, 81.
- pseudo-radiatus. 1944, 26 ; 1948, 25.

Coprinus radians. 1925, 358 ; 1937, 142.
- radiatus. 1944, 23.
- similis. 1937, 126.
- tergiversans. 1931, 36 ; 1938, 9.
- utrifer. 1948, 26.
- velox. 1947, 84.
- vermiculifer. 1944, 5.
- verrucispermus. 1944, 9.
Leucocoprinus procerus. 1937, 118.
Drosophila atomata. 1937, 125.
- candolleana. 1937, 125.
- subatrata. 1937, 125.
- torpens. 1937, 125.
- velutina. 1946, 90.
Psathyra barlae. 1953, 118.
- bipellis. 1953, 122.
- corrugis. 1953, 101.
Psathyrella candolleana. 1925, 57.
- gracilis. 1954, 421.
- hydrophila. 1925, 57 ; 1948, 247.
- sphagnicola. 1937, 382.
- sylvestre. 1953, 130.

Lépiotacées.

Cystoderma. 1951, 65.
- (Clé du genre). 1951, 69.
- amiantninum. 1951, 70.
- amianthinum var. album. 1951, 71.
- amiantninum var. longisporum. 1951, 72.
- carcharias. 1951, 75.
- cinnabarinum. 1951, 73.
- granulosum. 1951, 77.
- haematites. 1951, 79.
- ponderosum. 1951, 72.
Hiatula cepaestipes var. lilacino-granulosa. 1934, 184 ; 1937, 118.
- lutea. 1937, 118.
Lepiota (Coloration des spores par l'iode). 1932, 324.
- 1936, 177 ; (Clé des espèces) 181.
- (Liste des espèces). 1951, 365.
- (Synonymie des espèces). 1952, 267.
- acutesquamosa. 1927, 219 ; 1936, 207.
Lepiota acutesquamosa f. typica. 1936, 209.
- acutesquamosa var. furcata. 1936, 210.
- alba. 1936, 229.
- alba. Voir L. clypeolaria var. alba. 1937, 82.
- amianthina var. longispora. 1936, 204.
- badhami. 1927, 220.
- barbieri. Voir L. clypeolaria var. barbieri. 1927, 218.
- brebissoni. 1936, 237.
- brunneo-incarnata. 1927, 145; 1936, 226.
- bucknallii. 1936, 204.
- castanea. 1927, 218.
- cinereo-lilacina. Voir L. pudica var. cinereo-lilacina. 1927, 216.
- clypeolaria. 1927, 217 ; 1931, 90 ; 1937, 82 ; 1946, 88.
- clypeolaria var. alba. 1937, 82.
- clypeolaria var. barbieri. 1927, 218.
- clypeolaria var. latispora. 1936, 230.
- clypeolarioides. 1936, 228 ; 1944, 57.
- cretini. 1931, 108 ; 1944, 52.
- cristata. 1946, 88.
- echinacea. 1936, 211.
- excoriata. 1930, 79 ; 1936, 364.
- excoriata var. squarrosa. 1928, 37.
- felina. 1927, 218 ; 1946, 88.
- forquignoni. 1944, 52.
- fulvella. 1936, 234.
- furcata. Voir L. acutesquamosa var. furcata. 1936, 210.
- fusco-vinacea. 1936, 220 ; 1944, 39.
- gracilenta. 1930, 78.
- grangei. 1944, 41, 53 ; 1947, 209.
- griseo-virens. 1928, 37 ; 1940, 54.
- guttata. 1927, 222.
- haematosperma. 1927, 221.
- helveola. 1927, 221 ; 1931, 52.
- hetieri. 1936, 205.

Lepiota hispida. 1927, 219.
- holosericea. 1930, 79 ; 1927, 216.
- igni-volvata. 1948, 5.
- irrorata. 1936, 202.
- laevigata. 1936, 231.
- latispora. Voir L. clypeolaria var. latispora. 1936, 230.
- lilacea. 1936, 214.
- lilacino-granulosa. 1934, 184.
- longispora. Voir L. amianthina var. longispora. 1936, 204.
- mastoidea. 1927, 217 ; 1930, 78.
- naucina. 1930, 78 ; 1948, 247.
- parvannulata. 1936, 218.
- permixta. 1927, 216.
- procera. 1930, 78.
- pseudofelina. 1936, 236.
- pseudo-helveola. 1936, 221.
- pudica var. cinereo-lilacina. 1927, 216.
- rhacodes. 1927, 216 ; 1930, 78 ; 1948, 246.
- rhodorrhiza. Voir L. setulosa var. rhodorrhiza. 1944, 38.
- serena. 1927, 219 ; 1936, 213 ; 1937, 117.
- setulosa. 1936, 224 ; 1944, 56.
- setulosa var. rhodorrhiza. 1944, 38.
- squarrosa. Voir L. excoriata var. squarrosa. 1928, 37.
- subalba. 1936, 233.
- subgracilis. 1936, 231.
- subincarnata. 1936, 233.
- sublittoralis. 1936, 216.

Leucoagaricus ianthinophaeus. 1952, 175.

Psalliota (Pore germinatif). 1952, 382 ; 1953, 248.
- arvensis. 1942, 109.
- campestris. 1937, 128.
- campestris var. bernardi. 1946, 89.
- campestris var. praticola. 1928, 362.
- cretacea. 1946, 89.
- lepiotoides. Voir P. xanthoderma var. lepiotoides. 1951, 81.
- praticola. Voir P. campestris var. praticola. 1928, 362.

Psalliota perrara. 1932, 293.
- radicata. 1937, 129.
- silvatica. 1946, 89.
- silvicola. 1946, 89.
- xanthoderma. 1942, 110 ; 1946, 89.
- xanthoderma var. lepiotoides. 1951, 81.

Volvariacées.

Pluteus (Clé). 1953, 149.
- aberrans. Voir P. exiguus var. aberrans. 1937, 120.
- aethalus. 1953, 152.
- aethalus var. jamaicensis. 1953, 153.
- aethalus var. pulverulentus. 1953, 153.
- albostipitatus. Voir P. spilopus var. albostipitatus. 1953, 154, 195.
- bambusinus. Voir P. cervinus var. bambusinus. 1953, 154.
- cervinus. 1937, 82 ; 1946, 88.
- cervinus var. atromarginatus. 1927, 148.
- cervinus var. bambusinus. 1953, 154.
- cubensis. 1953, 155.
- exiguus var. aberrans. 1937, 120.
- fuliginosus. 1953, 156.
- hispidulus var. microsporus. 1953, 155, 195.
- jamaicensis. Voir P. aethalus var. jamaicensis. 1953, 153.
- laetifrons. 1953, 152.
- nanus. 1937, 119.
- pulverulentus. Voir P. aethalus var. pulverulentus. 1953, 153.
- roberti. 1934, 166.
- spilopus var. albostipitatus. 1953, 154, 195.
- umbrosus. 1943, 37.

Volvaria bakeri. 1953, 147.
- bombycina. 1948, 247 ; 1953, 146 ; 1954, 436.
- bombycina var. maxima. 1932, 293.
- esculenta. 1947, 121.
- gloiocephala. 1928, 360.
- plumulosa var. griseola. 1928, 44.

Volvaria pseudovolvacea. 1953, 148.
- speciosa. 1928, 360 ; 1937, 120 ; 1954, 421.

Amanitacées.

Amanita. 1926, 257 ; 1935, 427 ; 1948, 50.
- (A propos de deux). 1950, 5.
- (de Barla). 1928, 155.
- (Spores). 1928, 149.
- abietum. 1929, 35 ; 1934, 111 ; 1949, 152 ; 1950, 244 ; 1951, 216, 217.
- aemilii. 1930, 162. = emilii.
- amici. 1930, 160.
- ampla. 1925, 33 ; 1927, 259; 1948, 193, 198.
- aspera. 1927, 215 ; 1928, 112 ; 1930, 213 ; 1948, 198.
- baccata. 1925, 287 ; 1926, 268 ; 1929, 129 ; 1942, 22.
- barlae. 1929, 129.
- boudieri. 1925, 290.
- caesarea. 1925, 96, 404, 406.
- citrina. 1925, 321 ; 1926, 196 ; 1927, 214 ; 1928, 74, 124 ; 1931, 89.
- cocolla. 1942, 15.
- corticelli. 1929, 137.
- echinocephala. 1925, 304 ; 1947, 209 ; 1950, 111.
- eliae. 1930, 165.
- emilii. 1930, 162.
- exelsa. 1927, 259 ; 1948, 194.
- exstria. Voir A. pantherina var. exstria. 1930, 171.
- gemmata. 1926, 279 ; 1930, 159.
- gilberti. 1925, 463.
- junquillea. 1932, 283.
- livido-pallescens. 1954, 426.
- mappa (Toxicité). 1925, 321.
- marci. 1929, 139.
- muscaria (Toxicité). 1953, 450.
- ovoidea. 1951, 81 ; 1954, 428.
- pantherina. 1925, 33 ; 1929, 139.
- pantherina var. exstria. 1930, 171.
- pantherina var. robusta. 1930, 207.
Amanita phalloides. 1928, 74 ; (Toxicité) 1932, 336 ; 1950, 246.
- ponderosa. 1942, 28.
- porphyria. 1925, 476 ; 1927, 298 ; 1948, 198, 246 ; 1952, 263.
- robusta. Voir A. pantherina var. robusta. 1930, 207.
- rubescens. 1927, 215 ; 1928, 74, 112 ; 1948, 198.
- solitaria. 1925, 289.
- solitaria var. strobiliformis. 1926, 280.
- spissa. 1925, 33 ; 1927, 215 ; 1948, 194, 246.
- vaginata. 1932, 283.
- valida. 1925, 33 ; 1927, 215.
- verna. 1925, 87.
- virosa. 1925, 288 ; 1926, 244 ; 1927, 214 ; 1948, 247.
- vittadinii. 1925, 293.
Amanitopsis crocea. 1928, 161, 341 ; 1930, 157.
- fulva. 1946, 88.
- umbrino-lutea. 1928, 117, 164.
- vaginata. 1932, 283 ; 1946, 88.
Chitoniella bahiensis. 1932, 325.
Lepidella. 1925, 303.
- beillei. 1925, 465.
- echinocephala. 1925, 304 ; 1947, 209 ; 1950, 111.
- vittadinii. 1925, 293, 304.

Russulacées.

Lactarius (Classification). 1935, 160, 184.
- (Clé analytique). 1938, 217.
- (Notes critiques). 1938, 204.
- (Spores et ornementation sporique). 1931, 72 ; 1940, 7 ; 1951, 99.
- (Synonymie). 1938, 216.
- aspideus. 1935, 165.
- aurantiacus. 1930, 295 ; 1932, 295.
- azonites. 1925, 80.
- badiosanguineus. 1953, 361, 372.

Lactarius blennius. 1928, 76 ; 1935, 167 ; 1951, 82.
- camphoratus. 1935, 155 ; 1946, 94.
- camphoratus var. serifluus. 1935, 178.
- cnrysorheus. 1935, 167 ; 1951, 82.
- cilicioides. Voir L. torminosus var. cilicioides. 1935, 164.
- controversus. 1946, 94.
- cyathula. 1935, 172.
- decipiens. 1938, 222.
- decipiens var. lacunarum. 1938, 223.
- deliciosus. 1935, 132 ; 1936, 368.
- evosmus. 1953, 361, 367, 378.
- fuliginosus. 1948, 250.
- fuliginosus var. picinus. 1925, 80 ; 1927, 191 ; 1935, 143.
- fulvissimus. 1953, 362, 388.
- glycyosmus. 1935, 148.
- helvus. 1935, 145, 389.
- iners. 1953, 362, 374.
- lacunarum. Voir L. decipiens var. lacunarum. 1938, 223.
- lignyotus. 1925, 80 ; 1927, 193 ; 1935, 144.
- mairei. 1939, 34.
- mitissimus. 1935, 170 ; 1938, 224.
- musteus. 1935, 138.
- paludinellus. 1938, 20.
- pergamenus = piperatus. 1925, 79.
- picinus. Voir L. fuliginosus var. picinus. 1925, 80 ; 1927, 191 ; 1935, 143.
- piperatus. 1925, 79 ; 1933, 126.
- plumbeus. 1935, 131 ; 1951, 82.
- pornensis. 1938, 21.
- pubescens. Voir L. torminosus var. pubescens. 1935, 129.
- quietus. 1948, 250.
- repraesentaneus. 1935, 161.
- rubrocinctus. 1953, 385.
- rufus. 1935, 149 ; 1948, 250.
- rugatus. 1953, 362, 377, 383.

Lactarius sanguifluus. 1948, 250.
- scoticus. 1936, 321.
- scrobiculatus. 1932, 295 ; 1935, 127.
- scrobipes. 1953, 364, 370.
- serifluus. Voir L. camphoratus var. serifluus. 1935, 178.
- squalidus. 1925, 80.
- subalpinus. 1928, 379.
- subdulcis. 1935, 150 ; 1938, 204, 224 ; 1948, 250.
- subumbonatus. 1935, 181.
- tabidus. Voir L. theiogalus.
- theiogalus. 1935, 176 ; 1938, 220.
- theiogalus var. tabidus. 1935, 152 ; 1938, 221.
- torminosus. 1935, 127.
- torminosus var. cilicioides. 1935, 164.
- torminosus var. pubescens. 1935, 129.
- torminosus var. sublateritius. 1953, 364.
- trivialis. 1935, 141 ; 1938, 21.
- uvidus. 1935, 132.
- uvidus var. violascens. 1935, 134.
- vellereus. 1926, 244 ; 1948, 250.
- vietus. 1935, 136.
- violascens. Voir L. uvidus var. violascens. 1935, 134.
- volemus. 1935, 168 ; 1938, 253 ; 1946, 94.
- zonarioides. 1953, 364, 365.
- zonarius. 1925, 59 ; 1953, 380.

Russula (Classification). 1928, 137 ; 1934, 253 ; 1935, 258, 263, 281.
- (Clé de détermination). 1938, 138.
- (Felleinae). 1950, 86 ; 1953, 437 ; 1954, 389, 390, 392 (Russules douces).
- (Généralités). 1932, 253 ; 1930, 209 ; 1936, 111.
- (Réactifs). 1928, 135.
- (Réactions colorées). 1949, 41.
- (Spores). 1931, 72 ; 1951, 99.
- (Couleur des sporées). 1950, 73 ; 1951, 86.
- (Coloration des dermocystides). 1934, 218.

Russula abietina. 1938, 157, 21.
- adulterina. 1928, 146 ; 1953, 69, 71, 72.
- adulterina f. frondosae. 1953, 71?
- adusta. 1925, 61 ; 1928, 348 ; 1929, 288; 1935, 122 ; 1942, 150.
- adusta f. rubens. 1943, 61, 71.
- aeruginea. 1935, 122 ; 1945, 34.
- albida. 1939, 237.
- albidula. 1939, 265.
- albocitrina. 1931, 98.
- albonigra. 1928, 348 ; 1929, 288 ; 1946, 94.
- allescheri. 1953, 73 ; 1954, 400.
- altaica. Voir R. gracilis ssp. altaica. 1938, 143.
- alternata. 1954, 398.
- alutacea. 1935, 104 ; 1943, 143 ; 1953, 447 ; 1954, 422.
- alutacea ssp. ambigua. 1939, 274.
- alutacea f. integrella. 1938, 153.
- alutacea var. olivacea. 1929, 282.
- alutacea f. pseudo-olivascens. 1938, 154.
- alutacea ssp. subalutacea. 1939, 273.
- amarissima. 1943, 64, 71 ; 1944, 105 ; 1953, 435.
- ambigua. Voir R. alutacea ssp. ambigua. 1939, 274.
- americana. Voir R. sphagnophila var. americana. 1938, 149 ; 1939, 264.
- amoena. 1928, 142 ; 1930, 128 ; 1931, 266 ; 1933, 353 ; 1942, 159 ; 1952, 253.
- amoena var. intermedia. 1952, 255.
- amygdalina. 1939, 279.
- anatina. 1946, 68.
- aquosa. 1932, 303.
- aquosa. Voir R. ametica ssp. aquosa. 1939, 261.
- atropurpurea. 1931, 44.
- atropurpurea var. depallens. 1928, 141, 145 ; 1931, 46.
- atropurpurea var. dissidens. 1931, 50.
- atropurpurea var. pantherina. 1931, 49.

Russula aurantiaca. 1942, 165 ; 1954, 403.
- aurantiolutea. 1939, 280.
- aurata. 1930, 129 ; 1936, 365 ; 1946, 94 ; 1952, 236 ; 1953, 448.
- azurea. 1928, 141 ; 1953, 433.
- badia. 1928, 146 ; 1930, 129 ; 1953, 58.
- basifurcata. 1938, 152 ; 1943, 68.
- betulina. 1925, 315 ; 1928, 143 ; 1939, 269.
- borealis. 1939, 253.
- bresadolae. Voir R. delica var. bresadolae. 1938, 132.
- brunneoviolacea. 1939, 271 ; 1946, 65.
- caerulea. 1951, 82.
- caeruleo-malva. 1952, 238.
- carminipes. 1953, 449.
- cavipes. 1928, 145 ; 1930, 130.
- chamaeleon. 1954, 404.
- chameleontina. 1928, 143 ; 1931, 149; 1932, 84, 238 ; 1934, 50.
- chlora. 1942, 158.
- chlorinosma. 1939, 242.
- chloroides. Voir R. delica var. chloroides. 1930, 131.
- cinnabarina. 1939, 260.
- cinnamomicolor. 1953, 70.
- citrina. 1929, 101 ; 1930, 130 ; 1939, 238.
- citrina f. separata. 1938, 136.
- citrinochlora. 1938, 137.
- compacta. 1938, 141 ; 1939, 255.
- consobrina = livescens Quél. var. pectinata. 1939, 235.
- consobrina var. pectinatoides. 1939, 235.
- corallina. 1939, 248.
- crassotunicata. 1938, 132.
- crustosa. 1939, 240.
- cupraeoviolacea. 1953, 440.
- curtipes. 1935, 108 ; 1942, 162 ; 1953, 448.
- cutrefacta. 1942, 152 ; 1944, 102.
- cyanoxantha. 1929, 97 ; 1930, 130 ; 1942, 153 ; 1945, 31.
- decipiens. Voir R. maculata var. decipiens. 1930, 211.
- decolorans. 1928, 141 ; 1933, 183.

Russula delica. 1945, 29 ; 1946, 93.
- delica var. bresadolae. 1938, 132.
- delica var. chloroides. 1930, 131.
- delicula. 1945, 30, 37.
- densifolia. 1925, 61 ; 1930, 131 ; 1943, 61.
- depallens. Voir R. atropurpurea var. depallens. 1928, 141, 145 ; 1931, 46.
- dictyospora. Voir R. roseipes ssp. dictyospora. 1938, 155.
- dissidens. Voir R. atropurpurea var. dissidens. 1931, 50.
- du portii. 1931, 266.
- eccentrica. 1939, 227.
- echinospora. 1939, 270.
- elegans. 1938, 23 ; 1952, 233.
- emetica. 1928, 145 ; 1930, 131 ; 1933, 193 ; (Groupe emetica) 1945, 22.
- emetica ssp. aquosa. 1939, 261.
- emetica ssp. euemetica. 1939, 260.
- emeticicolor ssp. lilacea. 1928, 141 ; 1939, 247 ; 1953, 431.
- erythropoda. Voir R. xerampelina var. erythropoda. 1933, 195.
- europaea. Voir R. sphagnophila var. europaea. 1938, 150.
- exalbicans. 1928, 144.
- exalbicans f. decolorata. 1938, 147.
- fallax. 1939, 262.
- fellea. 1928, 145 ; 1930, 132 ; (Clé des Fellea) 1938, 138 ; 1939, 237.
- ferreri. 1945, 35 ; 1953, 439.
- firmula ex nitida. 1952, 249.
- flava. 1933, 184 ; 1939, 259.
- flavida. Voir R. mariae var. flavida. 1939, 244.
- flavovirens. 1928, 145.
- foetens. 1930, 132 ; 1935, 124 ; 1946, 94.
- foetens var. grata et var. minor. 1938, 135 ; 1939, 234.

Russula font-queri. 1954, 404.
- formosa. 1953, 59.
- fragilis. 1930, 132 ; 1945, 26 ; 1948, 250.
- frondosae. Voir R. adulterina f. frondosae. 1953, 71.
- fulva. 1954, 406.
- furcata. 1928, 143.
- fusca. 1928, 345 ; 1929, 282 ; 1930, 195.
- fuscorosea. 1954, 406.
- fusco-rubra. Voir R. queletii var. fusco-rubra. 1951, 166.
- fusco-rubra var. olivovirens. 1951, 166.
- gaminii. Voir R. seperina var. gaminii. 1928, 115.
- gilva. 1928, 144.
- globispora. Voir R. maculata var. globispora. 1952, 232.
- gracilis. 1939, 263.
- gracilis ssp. altaica. 1938, 143.
- graminicolor. 1928, 76, 143 ; 1930, 132.
- grisea. 1928, 143 ; 1930, 133 ; 1945, 34 ; 1952, 256.
- grisea var. leucospora. 1952, 257.
- grisea var. pictipes. 1953, 438.
- helodes. 1929, 284.
- heterophylla. 1928, 142 ; 1942, 155.
- heterosperma. Voir R. sphagnophila var. heterosperma. 1938, 150.
- hibbardiae. 1945, 36.
- humidicola. 1954, 408.
- incarnata. 1953, 430.
- insignis. 1938, 21.
- integra. 1928, 142 ; 1929, 100, 278 ; 1930, 133 ; 1938, 154 ; 1954, 393.
- integrella. Voir R. alutacea f. integrella. 1938, 153.
- intensior. 1946, 67 ; 1951, 171.
- kauffmanii. 1939, 265.
- kauffmanniana. 1939, 258.
- kavinae. 1928, 146 ; 1938, 22.
- laeta. 1954, 402, 403.
- laeticolor. 1951, 171.
- laricina. 1952, 250.
- lateritia. 1954, 408 ; 1928, 143.

Russula laurocerasi. 1928, 76, 144 ; 1932, 200, 202 ; 1947, 89.
- lepida. 1929, 97 ; 1930, 134 ; 1939, 248 ; 1953, 435.
- leucospora. Voir R. grisea var. leucospora. 1952, 257.
- lilacea. 1928, 141 ; 1939, 247 ; 1953, 431.
- lilacinicolor. 1952, 252.
- livescens. 1928, 145 ; 1930, 135 ; 1931, 99.
- livida. 1928, 141 ; 1942, 155.
- lundellii. 1953, 65.
- lutea. 1939, 272.
- lutea var. subcristulata. 1938, 156.
- lutensis. 1940, 66.
- luteotacta. 1928, 141 ; 1937, 201 ; 1939, 303 ; 1945, 26.
- luteo-viridans. 1942, 167 ; 1948, 252.
- macropoda. 1939, 277.
- maculata. 1928, 146 ; 1952, 231.
- maculata var. alba. 1939, 279.
- maculata var. decipiens. 1930, 211 ; 1938, 22 ; 1952, 233.
- maculata var. globispora. 1952, 232.
- mairei. 1929, 103 ; 1945, 26.
- mariae. 1939, 243.
- mariae var. flavida. 1939, 244.
- mariae var. subflavida. 1939, 244.
- maxima. 1938, 148 ; 1939, 268.
- melitodes. 1942, 164 ; 1943, 62, 71 ; 1954, 397.
- melliolens. 1928, 141 ; 1929, 282 ; 1939, 259.
- melzeri. 1928, 143 ; 1953, 440.
- mesospora. 1938, 161.
- microspora. 1939, 262.
- minutula. 1943, 70 ; 1953, 434.
- modesta. 1939, 245.
- mollis. 1928, 143 ; 1943, 66.
- mordax. 1938, 144 ; 1939, 264.
- morgani. 1939, 226.
- murrillii. 1939, 252.

Russula mustelina. 1928, 144 ; 1929, 99 ; 1930, 135, 195 ; 1935, 120 ; 1954, 405.
- nauseosa. 1928, 143 ; 1929, 101 ; 1952, 247.
- nigricans. 1930, 136 ; 1946, 93.
- nitida. 1928, 146 ; 1929, 98.
- nitida var. oirotica. 1938, 160.
- nitida var. transiens. 1938, 160.
- obtecta. 1939, 233.
- ocellata. 1953, 68.
- ochracea. 1930, 137 ; 1938, 21.
- ochroleuca. 1930, 137 ; 1933, 189 ; 1936, 366.
- ochroleucoides. 1939, 247 ; 1942, 162.
- odorata. 1952, 252.
- oirotica. Voir R. nitida var. oirotica. 1938, 160.
- olivacea. Voir R. alutacea var. olivacea. 1928, 77, 143 ; 1929, 100, 282 ; 1930, 138 ; 1939, 252 ; 1953, 447.
- olivascens. Voir R. xerampelina var. olivascens. 1931, 266 ; 1935, 121.
- olivascens. Voir R. queletii var. olivascens. 1951, 166.
- olivovirens. Voir R. fuscorubra var. olivovirens. 1951, 166.
- operta. 1939, 272.
- oreina. 1938, 142.
- paludosa. 1925, 313 ; 1928, 142 ; 1933, 201 ; 1939, 271.
- palumbina. 1942, 141 ; 1945, 35.
- pantherina. Voir R. atropurpurea var. pantherina. 1931, 49.
- parazurea. 1945, 34.
- pectinata. 1928, 145 ; 1939, 235 ; 1942, 151.
- pectinatoides. Voir R. consobrina var. pectinatoides. 1939, 235.
- persicina. 1928, 144.
- persobria. 1939, 228.
- pictipes. Voir R. grisea var. pictipes. 1953, 438.
- pilati. 1932, 256.
- polychroma. 1939, 274 (en note).

Russula polycystis. 1939, 238.
- pseudodelica. 1942, 150 ; 1945, 31.
- pseudo-emetica. 1952, 235.
- pseudointegra. 1933, 357 ; 1934, 189 ; 1954, 401.
- pseudolepida. 1939, 251.
- pseudolilacea. 1953, 434.
- pseudoluteoviridans. 1944, 101.
- pseudoolivascens. Voir R. alutacea f. pseudoolivascens. 1938, 154.
- pseudoromellii. 1954, 399.
- pseudo-rosea. 1953, 436.
- pseudorosacea. Voir R. sanguinea var. pseudorosacea. 1930, 139.
- pseudoviolacea. 1931, 256.
- puellaris. 1928, 143 ; 1946, 65 ; 1949, 85 ; 1951, 167, 171.
- puellula. 1946, 65.
- pulchralis. 1954, 399.
- pulverulenta. 1939, 230.
- punctata. 1930, 128.
- punctipes. 1939, 235.
- purpurea. 1953, 443.
- purpurina. 1939, 250.
- queletii. 1928, 144 ; 1951, 163 ; 1952, 240.
- queletii var. fusco-rubra. 1951, 165.
- queletii var. olivascens. 1951, 166.
- ravida. 1952, 244.
- rhodella. 1932, 109 ; 1942, 164 ; 1944, 102 ; 1946, 66.
- rhodopoda. 1928, 145.
- rhodopoda var. tianschanica. 1938, 147.
- robertii. 1953, 443.
- romellii. 1928, 142 ; 1929, 98, 282 ; 1930, 138 ; 1938, 153 ; 1948, 250 ; 1954, 396.
- rosacea var. americana. 1938, 146.
- roseicolor. 1952, 246.
- roseipes ssp. dictyospora. 1928, 143 ; 1938, 155 ; 1939, 272.
- roseobrunnea. 1953, 64.
- roseola. 1931, 100.
- rubens. Voir R. adusta f. rubens. 1943, 61, 71.
- ruberrima. 1952, 251.
- rubescens. 1939, 258.
- rubicunda. 1938, 22.

Russula rubra. 1928, 146 ; 1939, 254.
- rutila. 1946, 59 ; 1953, 60.
- sanguinea. 1928, 144 ; 1929, 101.
- sanguinea var. pseudorosacea. 1930, 139.
- sardonia. 1928, 144, 190 ; 1946, 94.
- schaefferiana. 1946, 65.
- schiffneri. 1935, 102 ; 1942, 166 ; 1953, 62.
- separata. Voir R. citrina f. separata. 1938, 136.
- seperina var. gaminii. 1928, 115.
- sericeonitens. 1939, 249.
- serissima. 1939, 252.
- serotina. 1939, 263.
- simillima. 1938, 22 ; 1939, 235.
- smithii. 1938, 140.
- sororia. 1942, 151.
- sphagnophila. 1946, 66 ; 1952, 224.
- sphagnophila var. americana. 1938, 149.
- sphagnophila var. europaea. 1938, 150.
- sphagnophila var. heterosperma. 1938, 150.
- sphagnophila var. subheterosperma. 1938, 150.
- sphagnophila var. subintegra. 1930, 209; 1938, 22 ; 1954, 395.
- straminea. 1942, 44.
- subalutacea. Voir R. alutacea ssp. subalutacea. 1939, 273.
- subcompacta. 1943, 68 ; 1945, 34.
- subdepallens. 1939, 258.
- subflavida. Voir R. mariae var. subflavida. 1939, 244.
- subfoetens Sm. = R. farinipes Rom. 1928, 145 ; 1932, 196, 200 ; 1933, 166.
- subheterosperma. Voir R. sphagnophila var. subheterosperma. 1938, 150.
- subingrata. 1952, 229.
- subintegra. Voir R. sphagnophila var. subintegra. 1930, 209 ; 1938, 22 ; 1954, 395.
- sublevispora. 1945, 35.
- subolivascens. 1939, 266.
- subpunctata. 1939, 264.

Russula subtilis. 1939, 247.
- subvelutina. 1939, 250.
- subveternosa. 1939, 275.
- tennesseensis. 1939, 229.
- tenuiceps. 1939, 278.
- tinctipes. 1954, 401.
- torulosa. 1951, 165.
- transiens. Voir R. nitida var. transiens. 1938, 160.
- turci. 1928, 144 ; 1930, 139 ; 1952, 238.
- uncialis. 1928, 141 ; 1939, 249.
- urens. 1953, 67.
- variecolor. 1953, 445.
- velenovskyi. 1928, 144.
- venosa. 1933, 198 ; 1934, 64 ; 1946, 67 ; 1952, 224.
- versicolor. Voir R. serotina var. versicolor. 1935, 119 ; 1946, 66 ; 1951, 168, 171.
- vesca. 1928, 141 ; 1930, 140, 141, 193 ; 1931, 270 ; 1942, 155.

Russula veternosa. 1930, 142 ; 1953, 74.
- vinnosopurpurea. 1953, 72.
- vinosa. 1936, 129 ; 1939, 257 ; 1954, 409.
- violeipes. 1942, 159.
- virescens. 1926, 247.
- viscida. 1928, 142 ; 1938, 21.
- xerampelina. 1927, 275 ; 1928, 141, 343 ; 1929, 100, 282 ; 1930, 142 ; 1938, 253 ; 1939, 255 ; 1946, 94.
- xerampelina var. abietum. 1953, 429.
- xerampelina var. erythropoda. 1933, 195.
- xerampelina var. olivascens. 1935, 121.
- zonatula. 1946, 66.
- zvarae. 1953, 432.

GASTEROMYCETES

Gastéromycètes européens (Classification). 1934, 45.
Anthurus aseroiformis var. brevipes. 1930, 227 ; 1947, 212.
- aseroiformis var. longipes. 1930, 227.

Astreus stellatus. 1937, 103.
Battarraea guicciardiniana. 1930, 43 ; 1935, 277.
- phalloides. 1934, 240.

Bovista plumbea. 1935, 421 ; 1937, 102, 261.
Bovistella paludosa. 1937, 293.
- radicata. 1937, 102.

Calvatia caelata. 1937, 259.
- cyathiformis. 1933, 333 ; 1935, 422.
- saccata. 1937, 259.

Chlathrus cancellatus. 1927, 265; 1937, 132.
Crucibulum vulgare. 1937, 262.
Cyathus crucibulus. 1951, 84.
- hirsutus. 1947, 40.
- sericeus. 1947, 40.

Disciseda defossum. 1935, 422.
Dodgea n. genre. 1938, 193.
- occidentalis. 1938, 194.

Gastrosporium simplex. 1934, 37; 1949, 63.
Gautiera graveolens. 1937, 262.
Geaster fornicatus. 1931, 112.
- lageniformis. 1937, 103.
- minimum. 1937, 103.
- nanus. 1937, 103.
- pseudostriatus. 1937, 261.
- rufescens. 1954, 425.
- sibiricus. 1935, 423.
- umbilicatus. 1954, 425.

Hydnangium carneum. 1938, 26.
- nudum. 1937, 263.
- virescens. 1937, 263.

Ithyphallus imperialis. 1935, 341.
- impudicus. 1935, 341, 422 ; 1937, 167 ; (Gemellité) 1946, 258 ; (Odeur) 1954, 430.

Leucogaster luteomaculatus. 1937, 263.

Leucogaster liosporus. 1937, 263.
- nudus. 1937, 262.
Lycoperdon bovista. 1951, 84.
- excipuliforme. 1946, 101.
- furfuraceum. 1937, 102, 260 ; 1946, 101.
- gemmatum. 1937, 102, 260.
- giganteum. 1948, 251.
- niemale. 1937, 102.
- hirtum. 1931, 102.
- marginatum. 1931, 102.
- perlatum. 1948, 251.
- piriforme. 1951, 84.
- subpedicellatum. 1937, 260.
Lycoperdon umbrinum. 1937, 260.
Melanogaster variegatus var. broomeianus (Berk.). 1932, 190.
Mutinus caninus. 1946, 101.
Mycenastrum corium. 1950, 101.
Octaviana gautieria var. pityophila. 1937, 263.
Rhizopogon luteolus. 1937, 103, 262.
- rubescens. 1937, 103.
Thelebolus terrestris. 1947, 40.
Tulostoma barlae. 1954, 425.

---oOo---

A D E L O M Y C E T E S

ou

H Y P H O M Y C E T E S

ou

F U N G I I M P E R F E C T I

Hyphales ou Moliniales.

A. Mucédinées.

Antennopsis n. genre. 1951, 337.
- gallica Heim. 1951, 337, 347.
Asterophora lignicola. 1952, 189.
Bainiera n. genre. 1952, 189.
- hyalina. 1952, 189.
Beauveria globulifera. 1938, 245.
Brachyhelicoon n. genre. 1952, 208.
- xylogenum. 1952, 209.
Candelabrum spinulosum. 1953, 303.
Cephalosporium saprolegniae. 1939, 97.
Cercosporella acerina. 1952, 206.
- rhoetica. 1948, 120 ; 1954, 91.
- veratri. 1950, 54.
Chantransiopsis decumbens. 1951, 349, 351.
Chantransiopsis xantholini. 1951, 351.
Cladobotryum elegans. 1952, 191 ; 1953, 298.
Clathrosphaera spirifera. 1952, 214.
Clonostachys cylindrospora. 1952, 196.
Coleomyces n. genre. 1937, 37.
- rufus. 1937, 33, 38.
Cylindrocladium macrosporum var. hederae. 1952, 205.
Cylindrocolla urticae. 1946, 71.
Dactylina. 1952, 203.
Dactylium dendroides. 1928, 304 ; 1952, 203.
- macrosporum. 1928, 304.
Didymaria kriegeriana. 1933, 409.
Diploospora coprophila. 1952, 200.
Diplorhynchus. 1952, 207.
- biloba. 1952, 207.
Dyonisia n. genre. 1952, 212.
- capitata. 1952, 213 ; 1953, 303.

Dyonisia coronata. 1952, 213.
Flahaultia. 1951, 195.
- hyalina. 1951, 195.
Fusarium decemcellulare. 1934, 325.
- merismoides. 1948, 234.
- moniliforme. 1951, 138.
- phragmitis. 1953, 298.
- solani. 1948, 234.
Fusicladina n. genre. 1952, 200.
- lasiosphaeriae. 1952, 200.
Fusicladium amygdali. 1953, 272.
- aronici. 1927, 286 ; 1948, 121.
- dendriticum. 1953, 272.
- depressum. 1927, 284.
- orbiculatum. 1948, 122.
- pirinum. 1933, 409 ; 1953, 272.
- radiosum. 1946, 72 ; 1950, 56.
Fusidium longisporum. 1952, 194.
Geotrichum candidum. 1948, 232.
- cyphellae. 1952, 192.
- purpurascens. 1952, 192.
Gloeohaustoriales (Ordre nouveau). 1951, 354.
Gliocephalis hyalina. 1952, 198.
Gliocladium penicillioides. 1952, 199.
Gonatobotrys ramosissima. 1952, 187.
Goniosporium puccinioides. 1946, 72.
Helicocephalum megalosporum. 1952, 208 ; 1953, 300.
- sarcophilum. 1952, 207.
Helicomyces elegans. 1953, 300.
Heliscus lugdunensis. 1948, 235.
- versaillensis. 1952, 212.
Heterosporium centaureae. 1946, 74.
- phragmitis. 1946, 74.
Jacobia n. genre. 1951, 195.
- conspicua. 1951, 195.
Magdalaenaea n. genre. 1952, 209.
- monogramma. 1952, 209.
Mariannaea. 1952, 196.
- elegans. 1952, 196.
Mirandina. 1952, 205.
- brachyspora. 1952, 206.
- corticola. 1952, 206.
Moeszia cylindroides. 1952, 203.
Monilia. 1930, 143 ; 1952, 192.
- fimicola. 1948, 123.
Muiaria. 1951, 350.
- armata. 1951, 351.
- repens. 1951, 351.
Myrothecium roridum. 1952, 199.
Myxodochium n. genre. 1951, 196.
- hyalinum. 1951, 196.
Nyctalina n. genre. 1952, 189.
- lignicola. 1952, 190.
Oidiodendron griseum. 1952, 194.
Oospora chalaroides. 1952, 195.
- lasiosphaeriae. 1952, 195.
- stercorea. 1952, 195.
- tholispora. 1952, 195.
Ophiodendron n. genre. 1952, 208
- laocooni. 1952, 208.
Osteomorpha n. genre. 1951, 184 1952, 192.
Ovularia alpina. 1931, 211.
- farinosa. 1946, 74.
- haplospora. 1933, 406.
- obliqua. 1946, 39, 74 ; 1948, 123 ; 1950, 53.
- sphaeroidea. 1933, 406 ; 1948, 123.
- tuberculiniformis. 1950, 62
Pachybasium hematum. 1952, 199.
Palmomyces deliensis = Andraeana deliensis. 1926, 42.
Pedilospora (Höhnel). 1952, 210.
- macrospora. 1952, 212.
- tricornis. 1952, 210.
- parasitica. 1952, 210.
Penicillium luteum. 1925, 378.
Peyronelina n. genre. 1952, 213.
- glomerulata. 1952, 213.
Piricularia caricis. 1953, 288.
Pleurocatena n. genre. 1952, 195
- acicularis. 1952, 195.
Raghnildiana manihotis. 1934, 317.
Ramularia acris. 1948, 124 ; 1950, 54.
- aequivoca. 1948, 124.
- ajugae. 1948, 124.
- anagallidis. 1954, 90.
- angelicae. 1933, 407.
- arvensis. 1948, 124.
- calcea. 1933, 407 ; 1948, 125.
- centranthi. 1948, 125.
- coccinea. 1928, 317.
- coleosporii. 1928, 125.
- cylindroides. 1948, 125 ; 1949, 124.
- cynoglossi. 1948, 125.
- decipiens. 1946, 203.
- doronici. 1931, 211.
- epilobii-rosei. 1954, 89.
- filaris. 1946, 39 ; 1948, 125, 126.
- gei. 1948, 126.
- geranii. 1933, 406 ; 1948, 126.

Ramularia hellebori var. nigricans. 1950, 54; 1954, 89.
- heraclei. 1950, 54.
- knautiae. 1954, 90.
- lactucae. 1948, 126.
- lampsanae. 1933, 408 ; 1948, 127 ; 1950, 55 ; 1954, 90.
- macrospora. 1948, 127.
- macularis. 1946, 203.
- menyanthidis. 1933, 408.
- montenegrina. 1948, 127.
- obducens. 1946, 76.
- oreophila. 1933, 407 ; 1954, 89.
- parietariae. 1946, 39 ; 1950, 55.
- pastinacae. 1948, 127.
- phyteumatis. 1933, 408.
- picridis. 1948, 128.
- plantaginea. 1946, 76 ; 1948, 128 ; 1952, 395 ; 1954, 91.
- prenanthis. 1933, 408.
- primulae. 1948, 129 ; 1950, 55 ; 1952, 396 ; 1954, 80.
- punctiformis. 1933, 407 ; 1948, 129.
- ranunculi. 1948, 129, 130.
- repentis. 1929, 145.
- sambucina. 1948, 130.
- scrophulariae. 1954, 91.
- succisae. 1950, 55.
- thesii. 1933, 406.
- tulasnei. 1950, 54.
- urticae. 1931, 211 ; 1948, 130 ; 1950, 55.
- variabilis. 1933, 408.
- veronicae-cymbulariae. 1928, 319.
- vincae. 1954, 91.
- violae. 1933, 407.
- winteri. 1931, 211 ; 1948, 130.
- woronochini. 1953, 300.

Rhinotrichum stellatum. 1952, 190.
Scopula n. genre. 1952, 198.
- hyalina. 1952, 198.

Septocylindrium acerinum. 1953, 290.
- album. 1953, 298.
- major. 1953, 298.
- minor. 1953, 298.

Sporendonema roseum var. album. 1952, 192.
Sporocephalum n. genre. 1952, 187.
- peniophorae. 1952, 189.

Stephanoma strigosum. 1952, 212.
Streptomyces termitum. 1951, 359.
Tetracrium puttemansii. 1952, 210.
Titaeella n. genre. 1951, 196.
- capnophila. 1951, 196.

B. Dématiées.

Dématiées (Nomenclature). 1953, 265.
Acicuariella n. genre. 1953, 298.
- foliicola. 1953, 298.
- lasiosphaeriae. 1953, 298.

Acremoniula n. genre. 1953, 268.
- sarcinellae. 1953, 268.

Acrospeira fusca. 1953, 294.
- xylogena. 1953, 294.

Acrostaphylus n. genre. 1953, 272.
- hypoxyli. 1953, 272.

Acrotheca acra. 1953, 279.
- amoena. 1953, 270.
- capitata. 1953, 270.

Acrothecium aureum. 1953, 288.
- multisporum. 1953, 288.
- obovatum. 1953, 288.
- simplex. 1953, 288.
- tenebrosum. 1953, 288.
- zonatum. 1953, 288.

Alternaria brassicae. 1947, 61.
- solani. 1948, 119.
- stemphylioides. 1947, 64.
- tenuis. 1947, 61.

Arthrinium caricicolum. 1953, 274.
- curvatum. 1953, 274.
- sporophloeum. 1953, 274.

Atractina biseptata. 1953, 290.
Basitorula n. sp. 1953, 276.
- cephalosporioides. 1953, 276.
- cingulata. 1953, 276.

Bispora antennata. 1953, 282.
- punctata. 1953, 282.

Brachydesmiella n. genre. 1953, 287.
- biseptata. 1953, 287.

Brachydesmium puccinioides. 1953, 287.
- claviforme. 1953, 287.

Brachysporium bicolor. 1953, 288.
- coryneoides. 1953, 288.

Carlosia n. genre. 1953, 294.
- meliolae. 1953, 294.

Ceratophorum intermedium. 1953, 287.
Ceratosporium fasciculare. 1953, 296.
- strepticeras. 1953, 296.

Cercosperma n. genre. 1953, 290.
- subsessile. 1953, 290.

Cercospora cerasella. 1933, 410 ; 1948, 119.

Cercospora depazeoides. 1948, 119.
- fabae. 1948, 119.
- ferruginea. 1948, 119.
- medicaginis. 1933, 410.
- mercurialis. 1948, 119.
- opuli. 1948, 120.
- periclymeni. 1950, 57.
- plumbaginea. 1948, 120.
- polymorpha. 1949, 124.
- pulvinata f. angulosa. 1930, 190.
- radiata. 1952, 387.
- sagittariae. 1950, 57.
- scandens. 1950, 56.
- violae. 1948, 120.
- violae var. microcarpa. 1946, 39.
- voanuzeiae. 1953, 290.
- zonata. 1948, 120.
Cercosporina marmorata. 1948, 120.
- olivascens. 1949, 124.
Cercosporula n. genre. 1953, 290.
- corticola. 1953, 290.
- crassiuscula. 1953, 290.
Chalara ampullula. 1953, 278.
- variospora. 1953, 278.
Chloridiella n. genre. 1953, 270.
- leucopoda. 1953, 270.
Cirrhomyces caudiger. 1953, 278.
Cladosporium herbarum. 1933, 410; 1946, 70 ; 1948, 121, 233.
Clasterosporium carpophilum. 1946, 203.
- hormiscioides. 1953, 287.
- pedicellatum. 1953, 287.
- scirpicolum. 1953, 287.
Coniosporium arundinis. 1953, 208.
- duplicatum. 1930, 244.
Coniothecium didymum. 1950, 57.
- duplicatum. 1930, 244.
Cordana quercina. 1953, 284.
- reticulata. 1953, 284.
Cryptostroma corticale. 1951, 406.
Curculiospora n. genre. 1953, 287.
- sydowii. 1953, 287.
Cycloconium oleaginum. 1950, 56.
- phillyreae. 1928, 301 ; 1929, 259.
Cystodendron dryophilum. 1931, 211.
Dictyosporium elegans. 1953, 298.
Didymotrichella n. genre. 1953, 284.
- quercina. 1953, 284.
Didymotrichum chrysospermum. 1953, 284.
Diplocladiella n. genre. 1953, 296.
- scalaroides. 1953, 296.
Diplococcium heterosporum. 1953, 284.
Epicoccum neglectum. 1933, 411.
- nigrum. 1926, 194.
- vulgare. 1933, 411 ; 1948, 121.
Geotrichella n. genre. 1953, 274.
- alternata. 1953, 274.
Goidanichia n. genre. 1953, 281.
- scopula. 1953, 281.
Gonatobotryum fuscum. 1953, 276.
Gonytrichum caesium. 1953, 281.
Graphiothecium parasiticum. 1933, 411.
Graphium caliciiforme. 1930, 243.
- pallescens. 1931, 211.
Haplochalara enigmatica. 1953, 278.
Haplotrichella n. genre. 1953, 282.
- linkii. 1953, 282.
Helicodendron lombricoides. 1953, 292.
Helicoon elegans. 1953, 294.
- hyalosporum. 1953, 294.
Helicosporella n. genre. 1953, 292.
- hyalospora. 1953, 292.
- luteofusca. 1953, 292.
Helicosporina n. genre. 1953, 292.
- globulifera. 1953, 292.
Helicosporium mulleri. 1953, 292.
- vegetum. 1953, 292.
Helminthosporium apiculatum. 1953, 288.
- biforme. 1953, 288.
- gongotrichum. 1953, 288.
- lycopersici. 1936, 84.
- puttemansii. 1953, 288.
- turcicum. 1950, 56.
Heterosporium gracile. 1950, 56.
- pruneti. 1933, 409.
Hirudinaria macrospora. 1953, 296.
Hormiscium myrmecophilum. 1951, 348.
Isaria densa = Sporotrichum. 1926, 136.
- guignardi. 1926, 136.
Isariopsis albo-rosella. 1933, 410 ; 1948, 123.
Macrosporium cookei. 1933, 410.
- gemmivorum. 1939, 95.

Menispora caesia. 1953, 282.
Microbasidium sorghi. 1953, 272.
Monostachys n. genre. 1953, 278.
- transversalis. 1953, 278.
Napicladium arundinaceum. 1953, 287.
- tremulae. 1953, 287.
Oncopodiella n. genre. 1953, 296.
- tetraedrica. 1953, 296.
Passalora dactylina. 1953, 282.
- depressa. 1953, 282.
- epilobii. 1953, 282.
Periconia caespitosa. 1953, 276.
- helicotricha. 1953, 276.
Phialophora albipes. 1953, 282.
Pilulina n. genre. 1953, 268.
- nigrospora. 1953, 268.
Piminella n. genre. 1953, 281.
- castaneae. 1953, 281.
Polyscytalina n. genre. 1953, 284.
- grisea. 1953, 284.
Questieriella n. genre. 1953, 284.
- corni. 1953, 287.
- puttemansii. 1953, 287.
- ramundi. 1953, 287.
Rhinotrichella n. genre. 1953, 272.
- globulifera. 1953, 272.
- grisea. 1953, 272.
- pilulifera. 1953, 272.
Rhinotrichum repens. 1953, 272.
Sarcinella questieri. 1953, 294.
- variospora. 1953, 294.
Selenosporella n. genre. 1953, 292.
- curvispora. 1953, 292.
Septosporium instipitatum. 1953, 298.
Spegazzinia ornata. 1953, 296.
Speira toruloides. 1953, 296.
Sphaerocybe n. genre. 1945, 5.
- concentrica. 1945, 5.
Sphaeromyces n. genre. 1953, 279.
- clavisporus. 1953, 279.
Sphaeromycetella n. genre. 1953, 279.
- leucocephala. 1953, 279.
- macrospora. 1953, 279.
Spondylocladiella botryoides. 1953, 290.
Spondylocladium macrocarpum. 1953, 288.
Sporendocladia n. genre. 1953, 279.
- castaneae. 1953, 279.
Sporodesmium nitidum. 1953, 298.
- polymorphum. 1953, 298.
Stachybotrys dichroa. 1953, 281.
- robusta. 1953, 281.
Stachylidium bicolor. 1953, 281.
- ramosum. 1953, 281.
Stemphylium botryosum var. botrytis. 1947, 67.
Tetrachia bakeri. 1953, 294.
- quadrigemminata. 1953, 294.
- quadrigemminata var. denticulata. 1953, 294.
Tetraploa aristata. 1953, 296.
Trichosporium allantosporum. 1953, 270.
- dryodonis. 1953, 270.
- macrosporum. 1953, 270.
- ochraceum. 1953, 270.
- roseum. 1953, 270.
- scabrum. 1953, 270.
Triposporium elegans f. dubium. 1953, 296.
Zygosporium oscheoides. 1934, 329 ; 1953, 268.

Mélanconiales.

(Nomenclature). 1948, 187.
Colletotrichum armeriae. 1954, 88.
- gloeiosporioides. 1933, 404.
- herbarum. 1946, 70.
- iridis. 1949, 125.
Cylindrosporium aceris. 1949, 125.
- asphodeli. 1949, 126.
- hamatum. 1933, 404.
- heraclei. 1925, 278.
- microspermum. 1950, 53.
Gloeosporium aroniae. 1928, 241.
- heliosciadii. 1949, 127.
- politis. 1930, 239.
- salicis. 1950, 53 ; 1954, 88.
Marssonina castagnei. 1946, 37.
- delastrei. 1946, 38 ; 1954, 88.
- graminicola. 1946, 74.
- juglandis. 1946, 37, 202.
- truncatula. 1933, 405.
Microstroma juglandis. 1952, 391.
Monochaetia uncinata. 1949, 128.
Myxosporium subfulcatum. 1946, 202.
Pestalozzia nymphaeae. 1930, 243.
- quercicola. 1949, 128.

Septogloeum ulmi. 1933, 405.
Steganosporium centaureae. 1946, 38.
Vermicularia eryngii. 1926, 51.
- herbarum. 1933, 405.
- sipnonis. 1946, 202.
Wakefieldia n. genre. 1953, 303.
- punctata. 1953, 303.

Sphaerioidales

ou Sphaeropsidales.

Clé de détermination des genres. 1954, 223.
Aposphaeria violacea. 1952, 352.
Ascochyta graminicola. 1946, 69, 70 ; 1949, 128.
- orobi f. macrocarpa. 1946, 34.
- velata. 1949, 128.
Ascochytulina. 1954, 345.
Asteroma corni. 1926, 217.
- juncaginearum. 1933, 403.
- radiatum. 1946, 202.
Asteronectrioides heveicola. 1948, 176.
Blennoria buxi. 1953, 302.
Botryodiplodia. 1954, 309.
- amelanchieris. 1954, 312.
- caespitosa. 1954, 315.
- cerasi. 1954, 317.
- compacta. 1954, 317.
- compacta f. hranicensis. 1954, 317.
- compressa. 1954, 312.
- congesta. 1954, 314.
- digitata. 1954, 311.
- heterospora. 1954, 319.
- juglandicola. 1954, 310.
- juglandicola f. toxicodendri. 1954, 320.
- longipes. 1954, 318.
- meliae. 1954, 310.
- mirbeckii. 1954, 342.
- mixta. 1954, 318.
- ostiolata. 1954, 314.
- peperomiae. 1954, 318.
- pruni. 1954, 342.
- ravenellii. 1954, 315.
- ravenellii f. spathodeae. 1954, 316.
- ribis. 1954, 316.
- ribis f. majuscula. 1954, 316.
- sphaerioides. 1954, 313.
Botryodiplodia valsoides. 1954, 311.
- varians. 1954, 312.
- variispora. 1954, 319.
Camarosporium armeriae. 1954, 87.
- coronillae. 1949, 98.
- incrustans. 1946, 70.
- laburni. 1949, 98.
- oequivocum. 1949, 97.
- polymorphum. 1946, 70.
Chaetodiplodia. 1954, 273.
- anceps. 1954, 275.
- anceps f. hirtella. 1954, 275.
- anthurii. 1954, 276.
- arachnoidea. 1954, 274.
- caesalpiniae. 1954, 275.
- caulina. 1954, 274.
- chaetomioides. 1954, 274.
- clavulispora. 1954, 276.
- hirta. 1954, 342.
- lecardiniana. 1954, 276.
Cicinnobolus cesati. 1933, 400.
Coniothyriella theobromae. 1936, 83.
Coniothyrium berberidis. 1946, 37.
- chimonanthi. 1949, 129.
- concentricum. 1926, 178 ; 1928, 215.
Coryneum beyerinckii. 1950, 53.
- foliicolum. 1946, 70.
- foliicolum var. aceris. 1930, 242.
- foliicolum var. cotini. 1930, 242.
Cytospora foliicola. 1933, 403.
Darluca filum. 1933, 403.
Dendrophoma convallariae. 1933, 403.
Diblastospermella = Cicinnobella. 1954, 344.
- aequatorialis. 1954, 345.
Dilophospora graminis. 1946, 71.
Diplodia. 1954, 258.
- ailanthina. 1954, 267.
- ailanthina f. anglicae. 1954, 267.
- betae. 1954, 341.
- buxi. 1949, 98.
- cincta. 1954, 269.
- conigena. 1954, 271.
- cylindrospora. 1954, 266.
- cytisi. 1954, 264.
- diversa. 1954, 268.
- galactis. 1954, 265.
- guineae. 1954, 271.
- inconspicus. 1954, 261.
- inconspicus f. compressa. 1954, 262.

Diplodia inconspicus f. legumi-
nis cytisi. 1954, 262.
- inconspicus f. sclerotiorum.
1954, 262.
- longispora. 1954, 270.
- maculata. 1954, 266.
- mamillana. 1954, 267.
- mangini. 1931, 210.
- microsporella. 1954, 260.
- microsporella f. pruni.
1954, 260.
- microsporella f. hypoxyloi-
des. 1954, 261.
- obiones. 1954, 263.
- philodendri. 1954, 343.
- pinea. 1946, 71.
- profusa. 1946, 71.
- psoraleae. 1949, 98.
- pterocarpi. 1954, 259.
- punctata. 1954, 263.
- punctipetiola. 1954, 270.
- rosarum. 1946, 71.
- rosmarini. 1954, 265.
- sparsa. 1954, 268.
- sparsa f. macropyrena. 1954,
269.
- spurca. 1954, 264.
- tecomae. 1954, 270.
- tenuis. 1954, 262.
- thymelea. 1954, 342.
- trichini. 1954, 259.
- trichini f. navarrica. 1954,
260.
- ulmi. 1954, 264.
- vaccini. 1954, 265.
- vaccini f. mühlenbeckiae.
1954, 266.
Diplodiella. 1954, 239.
- anatolica. 1954, 243.
- apiospora. 1954, 222, 241.
- caryotae. 1954, 240.
- crustacea. 1954, 240.
- decorticata. 1954, 241.
- lata. 1954, 242.
- lignicola. 1954, 242.
- oospora. 1954, 241.
Diplodina alchemillae. 1949, 130.
- arenicola. 1946, 71.
- chenopodii. 1950, 50.
- rhinanthi. 1946, 71.
Diplodiopsis. 1954, 348.
Dothiorella sisalanae. 1938, 51.
Granulodiplodia. 1954, 330.
- abnormis. 1954, 333.
- adelinensis. 1954, 333.
- granulosa. 1954, 332.
- granulosella. 1954, 223,
332.
- megalospora. 1954, 332.
Granulodiplodia pinea. 1954,
331.
- sapinea. 1954, 331.
- stangeriae. 1954, 333.
Heimiodiplodia n. genre. 1954,
224.
- paraphysata. 1954, 224,
225.
- zeylanica. 1954, 225.
Hendersonia arundinis. 1949,
100.
- asparagi. 1946, 72.
- culmicola. 1946, 72.
- desmazieri. 1952, 389.
- lathyri-latifolii. 1949,
100.
- maculans. 1950, 52.
- mollis. 1949, 100.
- pulchella. 1946, 72 ; 1949,
101.
- sylvatica. 1946, 72.
Hendersonina. 1954, 347.
Lasiodiplodia theobromae. 1954,
236.
Lasiodiplodiella. 1954, 229.
- thomasana. 1954, 230.
- triflorae. 1954, 229.
- ricini. 1954, 230.
Leprieurina. 1954, 348.
Leptostromella pteridina. 1946,
37.
Leptothyrium periclymeni. 1946,
202.
Macrodiplodia. 1954, 237.
- curreyi. 1954, 238.
- oncospermatis. 1954, 238.
- ulmi. 1954, 238.
Macrodiplodiopsis. 1954, 345.
Macrophoma ilicis. 1946, 74.
- oleae. 1949, 101.
Metadiplodia. 1954, 278.
- acerina. 1954, 281.
- acerina f. phloeospora.
1954, 282.
- agrostidis. 1954, 297.
- agrostidis f. ricini. 1954,
297.
- alni. 1954, 293.
- alni f. millegrana. 1954,
293.
- aucubae. 1954, 294.
- buxi. 1954, 286.
- buxi f. euterpes. 1954, 287.
- canthiifolia. 1954, 300.
- canthiifolia f. intermedia.
1954, 301.
- coryphae. 1954, 300.
- curta. 1954, 299.
- diatrype. 1954, 294.

Metadiplodia emeri. 1954, 288.
- eucalypti. 1954, 278.
- georginae. 1954, 285.
- ilicicola. 1954, 288.
- ilicicola f. lilacis. 1954, 288.
- ilicis. 1954, 291.
- ilicis f. barringtoniae. 1954, 291.
- kansensis. 1954, 297.
- lantanae. 1954, 284.
- lecanidion. 1954, 302.
- libera. 1954, 296.
- libera f. benzoina. 1954, 296.
- libera f. veronensis. 1954, 296.
- lophiostomoides. 1954, 302.
- macrosperma. 1954, 295.
- melaena. 1954, 283.
- mutila. 1954, 284.
- mutila f. maclurae. 1954, 285.
- nuttaliae. 1954, 299.
- nuttaliae f. elaeagnella. 1954, 299.
- passifloricola. 1954, 295.
- phoradendri. 1954, 298.
- phoradendri f. pseudosphaeropsis. 1954, 298.
- phoradendri var. major. 1954, 298.
- piriformis. 1954, 290.
- pustulosa. 1954, 279.
- pustulosa f. auerswaldii. 1954, 280.
- pustulosa f. aurantii. 1954, 281.
- pustulosa f. celastrina. 1954, 280.
- pustulosa f. perseana. 1954, 280.
- pustulosa f. xanthoxyli. 1954, 281.
- radicicola. 1954, 297.
- ramulicola. 1954, 292.
- ramulicola f. eucalypti. 1954, 293.
- ramulicola f. multijugae. 1954, 292.
- rosae. 1954, 301.
- sambucicola. 1954, 301.
- sambucina. 1954, 284.
- spiraeae. 1954, 285.
- spiraeae f. agenariae. 1954, 286.
- subsolitaria. 1954, 289.
- subsolitaria f. viticola. 1954, 290.

Metadiplodia tephrostoma. 1954, 287.
- tephrostoma f. viscicola. 1954, 287.
- thujae. 1954, 298.
- veratri. 1954, 300.
- visci. 1954, 295.

Microbotryodiplodia. 1954, 306.
- atra. 1954, 307.
- cyanostroma. 1954, 308.
- minor. 1954, 307.
- myopori. 1954, 307.
- subtectoides. 1954, 308.

Microdiplodia acervata. 1954, 250.
- ascochytula. 1954, 339.
- brachyspora. 1954, 249.
- caballeroi. 1954, 257.
- centrophila. 1954, 255.
- clavispora. 1954, 253.
- clavispora f. sterculiae. 1954, 253.
- constrictula. 1954, 246.
- constrictula f. linderae. 1954, 246.
- depazeoides. 1954, 248.
- depazeoides f. cordiae. 1954, 249.
- fibricola. 1954, 255.
- granulosa. 1946, 74.
- helichrysi. 1946, 36.
- imperialis. 1954, 251.
- imperialis f. oryzae. 1954, 252.
- koelreuteriae. 1954, 251.
- lecanorae. 1954, 257.
- lecanorae f. ferrugineae. 1954, 257.
- lichenicola. 1954, 250.
- maculata. 1954, 255.
- melaena. 1954, 246.
- melaena f. carpini. 1954, 247.
- melaspora. 1954, 253.
- microspora. 1954, 247.
- minor. 1954, 246.
- minuta. 1954, 253.
- minuta f. secalis. 1954, 254.
- minuta f. seminulum. 1954, 254.
- myriospora. 1954, 256.
- myriospora f. physalidis. 1954, 256.
- nobilis. 1954, 247.
- osmanthi. 1954, 256.
- paupercula. 1954, 249.
- paupiana. 1954, 254.
- perpusila. 1954, 244.

Microdiplodia perpusila f. symphoricarpi. 1954, 245.
- phyllodiorum. 1954, 251.
- ribesia. 1954, 339.
- rusci. 1946, 37.
- tanaceti. 1954, 252.
- tanaceti f. oryzae. 1954, 252.
- warburgiana. 1954, 257.
Nemadiplodia. 1954, 226.
- anomala. 1954, 227.
- gongrogena. 1954, 228.
- guaranitica. 1954, 228.
- nematospora. 1954, 227.
- paraphysaria. 1954, 228.
Paradiplodiella n. genre. 1954, 320.
- acinosa. 1954, 321.
- arecae. 1954, 322.
- aurantiorum. 1954, 321.
- macrosperma. 1954, 322.
- microspora. 1954, 323.
- forsythiae. 1954, 322.
- pritzelliana. 1954, 322.
Pellionella. 1954, 272.
- cardonia. 1954, 272.
- deformans. 1954, 273.
- tetonensis. 1954, 273.
Phaeodomus rauwolfiae. 1950, 228.
Phaeostagonosporopsis. 1954, 336.
- zeae. 1954, 336.
Phleospora heraclei. 1930, 241.
- jaapiana. 1950, 52.
Phoma acuta. 1946, 75 ; 1950, 50.
- artemisiae. 1946, 75.
- cyparissiae. 1946, 75.
- euphorbiphila. 1946, 75.
- herbarum. 1946, 75.
- hibernica. 1952, 355.
- origani. 1946, 75.
- siliquastrum var. arabidis alpinae. 1952, 394.
- siliquastrum var. arabidis hirsutae. 1952, 393.
- subtruncata. 1946, 76.
Phyllosticta ambiguella. 1930, 84.
- auerswaldii. 1950, 50.
- botrychii. 1949, 130.
- campestris. 1933, 400.
- daphniphylii. 1928, 212.
- fici-elasticae. 1928, 213.
- hieraclei. 1952, 394.
- ilicis. 1950, 50.
- latemarensis. 1946, 34.
- mercurialicola. 1949, 130.
- rhamni. 1954, 86.
- saponariae. 1933, 400.
- veratri. 1930, 240.
Placodiplodia. 1954, 326.
- agropyri. 1954, 330.
- chamaeropis. 1954, 327.
- copelandi. 1954, 327.
- ficina. 1954, 328.
- ingae. 1954, 329.
- insitiva. 1954, 327.
- parinari. 1954, 222, 330.
- saginata. 1954, 329.
- spiraeae. 1954, 328.
- tanaria. 1954, 328.
- yuccae. 1954, 329.
Pleuroplaconema pinicae. 1934, 153.
Polystigmina rubra. 1950, 53.
Polythrincium trifolii. 1946, 76 ; 1954, 88.
Pycnothyrium gracile. 1933, 404.
Pyrenochaeta fallax. 1946, 76.
Rhabdospora betonicae var. teucrii. 1946, 77.
- cannabina. 1946, 77.
- lactucae. 1946, 77.
- lunulata. 1946, 36.
Rhodosticta coluteae. 1930, 240.
Rhynchodiplodia. 1954, 277.
- citri. 1954, 277.
Schizodiplodia n. genre. 1954, 303.
- aeluropodis. 1954, 304.
- australis. 1954, 306.
- catalpae. 1954, 306.
- centaurae. 1954, 304.
- epilobii. 1954, 304.
- herbarum. 1954, 303.
- leptodactyli. 1954, 305.
- leptospora. 1954, 305.
- resurgens. 1954, 305.
Septoria allorgei. 1946, 77.
- anaxeoides. 1949, 131.
- chelidonii. 1933, 402 ; 1954, 86.
- cirsii. 1950, 51.
- cirsiicola. 1949, 130.
- cornicola. 1931, 209.
- cornina. 1952, 396.
- cruciatae. 1933, 403.
- cytisi-hirsuti. 1930, 185.
- dauci. 1939, 118.
- domini. 1933, 401.
- donacis. 1950, 52.
- dubia. 1946, 201.
- gei. 1933, 402.
- gilletiana. 1933, 401.
- guepini. 1946, 201.
- hederae. 1946, 201 ; 1950, 51.
- humili. 1950, 52.
- hyperici. 1950, 86.

Septoria lapsanae. 1952, 396.
- laserpitii. 1950, 51.
- lavandulae. 1950, 51.
- lepidii. 1946, 34.
- melissae. 1950, 51.
- oenotherae. 1952, 397.
- oleandrina. 1950, 51 ; 1954, 86.
- piricola. 1946, 34.
- plantaginea. 1950, 51.
- polygonina. 1933, 401 ; 1954, 87.
- polygonorum. 1933, 401.
- radiatum. 1946, 202.
- ribis. 1946, 202.
- ribis alpini. 1933, 402.
- robiniae. 1933, 402.
- rubi. 1946, 35, 202.
- saponariae. 1950, 50.
- scabiosicola. 1931, 209 ; 1949, 101.
- sedi. 1952, 397.
- sibthorpiae. 1930, 240.
- sinarum. 1946, 77.
- sonchifolia. 1933, 403.
- stellariae. 1933, 402 ; 1946, 35.
- tormentillae. 1933, 402.
- tritici. 1946, 35.
- urticae. 1950, 52.
- vandasii. 1949, 102.
- vincetoxici. 1949, 102.

Sphaeropsis crataegicola. 1952, 397.

Stagonospora brachypodii. 1946, 77.
- bromi. 1946, 78.
- crini. 1929, 297.
- macrospora. 1928, 216 ; 1950, 52.
- sexseptata. 1946, 78.
- subseriata. 1946, 78.

Striodiplodia. 1954, 334.

Striodiplodia agaves. 1954, 334.
- palmarum. 1954, 335.
- striata. 1954, 335.

Strionemadiplodia. 1954, 233.
- cactorum. 1954, 234.
- frumenti. 1954, 234.
- phoenicum. 1954, 235.

Syndiplodia. 1954, 323.
- coryli. 1954, 324.
- hypoxuloidea. 1954, 325.
- loculata. 1954, 325.
- microsporella. 1954, 324.
- robiniae. 1954, 326.

Synnemadiplodia n. genre. 1954, 230.
- fiorii. 1954, 232.
- marantae. 1954, 232.
- morina. 1954, 232.
- mutans. 1954, 231.

Zernya. 1954, 346.
- clypeata. 1954, 347.

Mycelia sterilia.

Bartheletia n. genre. 1953, 300.
- paradoxa. 1953, 300.

Ectostroma liriodendri. 1928, 63.

Ophiopodium. 1953, 300.
- humiriae. 1953, 300.

Overeemia. 1953, 300.
- glomerelae. 1953, 300.
- glomerelae var. myrmecophilum. 1953, 300.

Papulaspora appendicularis. 1948, 213.
- immersa. 1948, 209.
- pannosa. 1948, 216.

Sclerotiomyces dissipabilis. 1953, 300.

Zygodesmus. 1936, 335.

-----oOo-----

L I C H E N S

Germination des spores de Lichens. 1930, 199.
Nomenclature des Umbilicariacées. 1952, 141.
Nomenclature des Endocarpacées. 1954, 162.
Clé des genres et sections des Endocarpacées. 1954, 175.

Abrothallus parmeliarum. 1926, 233.
Baeomyces roseus. 1946, 50.
Cladonia. 1926, 249 ; 1927, 267; 1929, 184.
Illosporium carneum. 1935, 382.
Lecidea. 1927, 209.
Lithothelidium. n. genus. 1954, 177.
Xanthoria parietina. 1925, 385.

TABLE DES PLANCHES

ET DES FIGURES

MYXOMYCETES

Chytridiales

Ceratiomyxa arbuscula. XLVIII (1932), Atlas, pl. XLIX, fig. 3 (photo).
Comatricha typhoides. XLVIII (1932), Atlas, pl. XLVIII et XLIX (photos).
Diderma rugosum var. sessile. XLIV (1928), pl. XVII.
Fuligocinereae. LII (1936), p. 338, fig. E (spores).
- megaspora. LII (1936), p. 338, fig. M (spores).
- muscorum. XLII (1926), pl. IX, fig. 2-4 et p. 163 (capillit., (sp.).
- rufa. XLII (1926), p. 166, fig. 4 (capillit., sp.).
- septica. XLII (1926), p. 161, fig. 2 (capillit.) ; LII (1936), p. 338, S (var. candida, sp.).

Hemitrichia clavata. XLVIII (1932), Atlas, pl. LVIII (photo).
- serpula. XLVIII (1932), Atlas, pl. L (photo, sp.).
- vesparium. XLVIII (1932), Atlas, pl. XLIX (photo).

Lamproderma columbinum car crucheti. XLIV (1928), p. 294, fig. 2 (spores).
Ligniera pilorum. XLI (1925), pl. X.
Myzocythium proliferum. LXVIII (1952), p. 183, fig. D.
Olpidiopsis saprolegniae. LXVIII (1952), p. 183, fig. 1.
- vuilleminiae. LXVIII (1952), p. 183, fig. G.
- sp. LXVIII (1952), p. 183, fig. 1 B (zygote).

Physarum aureum. XLIV (1928), pl. XVI.
- cinereum var. scintillans. XLIV (1928), pl. XIV.
- diderma. XLII (1926), p. 151, fig. 1.
- sessile. XLIV (1928), pl. XV.

Physoderma muscari. LXV (1949), p. 121, fig. 1 (sporanges).

PHYCOMYCETES

Absidia spinosa, var. madecassensis. LXV (1949), p. 145, fig. 2.
Albugo mangenoti. LXVII (1951), pl. 1 M, p. 119.
Apodachyla brachynema. LXIV (1948), p. 230, fig. 3.
Choanephora curcubitarum. LXVI (1950), p. 223, fig. 1, et p. 225, fig. 2.
Cunninghamella bertholletiae. LXV (1949), p. 149, fig. 4.

Cunninghamella echinulata. LXVI (1950), p. 27, fig. 1.
- elegans. LXVI (1950), p. 29, fig. 2.
Cystopus bliti. LXVII (1951), p. 420 (hab., oospores).
Isoachlya toruloides var. paucispora. LXIV (1948), p. 228, fig. 2.
Mucor lamprosporus. LXV (1949), p. 143, fig. 1.
Peronoplasmopara densa. LIV (1938), p. 116 et 118.
Peronospora atriplicis halimi. L (1934), p. 91.
- coronillae-minimae. LXIX (1953), p. 333, fig. 1.
- coronopi-procumbentis. LXIX (1953), p. 337, fig. 2.
- erini. LXIX (1953), p. 337, fig. 3.
- favargeri. LXVII (1951), p. 116, fig. 1.
- lathyrina. LXVI (1950), p. 65.
- maublancii. L (1934), p. 94.
- minuta. LXIX (1953), p. 337, fig. 4.
- moreaui. XLIX (1933), p. 387.
- sanguisorbae. XLIX (1933), p. 389 (oospores).
- trifolii-hybridi. XLVII (1931), p. 205 (oospores).
Saprolégniacées diverses. XLI (1925), pl. I et 2 (cultures).
Sapromyces androgynus. LII (1936), pl. XI (photos).
- reinschii. LII (1936), pl. X (photos).
Syncephalastrum racemosum var. paucisporum. LXV (1949), p. 147, Fig. 3.

ASCOMYCETES

Levures

Candida melinii. LXX (1954), p. 361, fig. 1 A (pseudomycélium).
- mesenterica. LXX (1954), p. 361, fig. 1 C (pseudomycélium).
- mycoderma. LXX (1954), p. 363, fig. 3 (pseudomycélium).
- solani. LXX (1954), p. 361, fig. 1 B (pseudomycélium) et p. 364, fig. 4.
- guilliermondii. LXX (1954), p. 362, fig. 2 (pseudomycélium).
Petasospora chambardi. LXX (1954), p. 366, fig. 8.
- rhodanensis. LXX (1954), p. 361, fig. 1 D ; p. 365, fig. 6 (asques).
- strasburgensis. LXX (1954), p. 365, fig. 7 (asques), 375-380.
Pichia pseudopolymorpha. LXX (1954), p. 364, fig. 5 (asques, conjugaison), p. 372, 376 et 377.

DISCOMYCETES

Discales

Abrothallus parmeliarum. XLII (1926), pl. XIII.
Acetabula aestivalis. XLI (1925), p. 461 (revêtem.), p. 462 (hyménium) ; pl. XXIX, fig. 10-13.
- vulgaris. LXVII (1951), p. 189, fig. 4 Q (base d'un asque).
Aleuria granulosa. XLVIII (1932), p. 62 (asques, spores) ; pl. X, fig. 3 (f. laricina).

Aleuria umbrina. LXII (1946), p. 220, fig. 1 (sommet de l'asque).
Aleuroniscina apiculata. LV (1939), p. 55, f.5 (asques, spores).
Antinoa acuum. LXVII (1951), p. 206 (hab., anat.).
Anthrocobia simillima. XLIII (1927), p. 98, fig. 2 (anat.) ; pl. VI, fig. 1-4.
Arachnopeziza aranea. LXVII (1951), p. 185, fig. 2 G et H (formation des asques).
- aurelia. LXVII (1951), p. 185, fig. 3 F (base de l'asque).
Ascobolus pusillus. LXVII (1951), p. 185, fig. 3 D (base de l'asque).
Ascophanus fusco-lilacinus. XLII (1926), pl. VIII, fig. 17-22 (anat.).
Belonioscypha chrysosperma. LXX (1954), p. 208 (hab.) et 209, fig. 10 (hym., spores) ; p. 211, fig. 11 (coupe).
Boudiera anarcyspora. XLII (1926), pl. VIII, fig. 14-16 (anat.).
Calycella citrina. LXVII (1951), p. 185, fig. 3 E (base de l'asque).
- sulfurina. LXII (1946), p. 220, fig. 7 (asque, foramen).
Celidium stictarum. XLIV (1928), pl. IX et X.
Ciliaria hirta var. aurantiaca. XLII (1926), pl. VIII, fig. 4-7 (anat.).
- lusatiae. LXI (1945), p. 48, fig. 1 (hab., hymén., poils) ; p. 50, fig. 2 (spores).
- pseudotrechispora. LXII (1946), p. 243.
- umbrorum var. cancrina. LXI (1945), p. 51, fig. 3 (poils marg.).
- sp. LXVII (1951), p. 185, fig. 3 P (base des asques).
Cookeina sulcipes. LIV (1938), p. 112, fig. 1.
- tricholoma. LIV (1938), p. 113 (asques).
Dasyscypha flavo-virens. XLVIII (1932), p. 72 (anat.) et pl. IX, fig. 6.
- fusco-sanguinea. XLVIII (1932), p. 74 (hymén., spores).
Erinella discolor. LXVII (1951), p. 185, fig. 3 U (asque).
Galactinia atroviolacea. LXX (1954), p. 194, fig. 3 (paraph., sp.) ; p. 196, fig. 4 (coupe).
- boltoni. LIII (1937), p. 133 (paraph., sp.).
- nivalis. XLVIII (1932), p. 64 (hymén., sp.) et pl. X, fig. 2.
- phlebospora. LXII (1946), p. 220, fig. 2 et 4 (opercule).
- praetervisa. XLVI (1930), p. VI (cytol.).
Helotium melanosporum. LXX (1954), p. 208, fig. 9 (spores).
- rimosum. XLIII (1927), p. 104 et pl. VI, fig. 5-6.
- rubescens. LXII (1946), p. 220, fig. 1-6 (sommet de l'asque).
- sulphuratum. LXX (1954), p. 205, fig. 7 (hab., sp.) et p. 206.
- sp. LXVII (1951), p. 185, fig. 3 J et K (asque).
Helvella lacunosa. XLVIII (1932), p. 57, fig. 2 ; LXVII (1951), p. 191, fig. 5 L (base d'un asque).
- queletii. XLVIII (1932), p. 57, fig. 2 II (hab.).
- queletii var. alpina. XLVIII (1932), p. 55 (hymén., sp.) ; pl. IX, fig. 5.
Humaria coccinea var. maritima. XLII (1926), pl. VIII, fig. 8-10 (anat.).
- umbrosa. LXX (1954), p. 189, fig. 1 ; p. 191, fig. 2.
Hyaloscypha uncipila. LXX (1954), p. 215, fig. 12 (hab., anat.).
Lamprospora modestissima. XLII (1926), pl. VIII, fig. 11-13 (anat.).
- polytrichi. LVI (1940), p. 40 et 44 (hymén. sp.) ; LXII (1946), p. 222, fig. 2-9 (sommet de l'asque) ; p. 220, fig. 1-3 (opercule).
Leptopodia corbieri. XLIII (1927), p. 96 (anat.) et pl. VI, fig. 7.
- murina var. alpestris. XLVIII (1932), p. 59 (anat.) et pl. X, fig. 4.
Mitrula rehmii. XLVIII (1932), p. 69 (hab.), 70, 71 ; pl. IX, fig. 7-8.
Melascypha melaena. LXII (1946), p. 222, fig. 2-9 (sommet de l'asque) ; p. 223, fig. 3-8 et 3-10.

Melachroia livida. XLIII (1927), p. 102, fig. 1 (anat.) et pl. VI, fig. 8-10.
Ombrophila palumbina. XLIII (1927), pl. VI, fig. 12-13 ; p. 99, fig. 3 (anat.).
Orbilia aurantio-rubra. LXVII (1951), p. 185, fig. 3 T (asque).
- polyspora. XLII (1926), pl. VIII, fig. 26-29 (anat.).
- xanthostigma. LXVII (1951), p. 185, fig. 3 S (asque).
Pachydisca umbilicata. LXII (1946), p. 220, fig. 1-5 (sommet de l'asque) et 1-8 (foramen).
Peziza aurantia. LXVII (1951), p. 189, fig. 4 O-P (base de l'asque).
Phialea echinophila. LXVII (1951), p. 185, fig. 3 M et N (base de l'asque).
- rubicola. LXVII (1951), p. 189, fig. 4 R (asque).
Phillipsia domingensis. LXII (1946), p. 231, fig. 7 2-11 (appareil apical de l'asque).
- gigantea. LXII (1946), p. 231, fig. 7-1 (appareil apical).
Pithya cupressina. LXII (1946), p. 223, fig. 3-1 à 5 (appar. apic.).
- vulgaris. LXII (1946), p. 223, fig. 3 6-7 (opercules).
Plicaria leiocarpa. XLIV (1930), pl. VII et VIII, fig. 20-32 (cytol.).
- planchonis var. ovalispora. XLII (1926), pl. VIII, fig. 4 (anat.).
Pseudoplectania nigrella. LXII (1946), p. 222, fig. 2 1-8 (sommet de l'asque).
Pulvinula pallida. LXVII (1951), p. 185, fig. 3-1 (asque).
Pustularia velata. LXX (1954), p. 200, fig. 5 (voile) ; p. 202, fig. 6.
Pyronema confluens. XLVIII (1932), p. 281 (cytol.) ; LXIX (1953), p. 217, fig. 9.
Rhizina inflata. LXVII (1951), p. 185, fig. 3 R (base de l'asque).
Sarcoschypha coccinea. XLVI (1930), pl. VIII, fig. 33-34 (cytol.) ; LXII (1946), p. 229, fig. 6 9-13 (appar. apic.).
- protracta. XLI (1925), p. 455 (asques, spores) ; pl. XXIX, fig. 1-4.
Sarcosoma decaryi. LXII (1946), p. 227, fig. 5 4-9 (appar. apic.).
- orientale. LXII (1946), p. 227, fig. 5 10 à 12 (appar. apic.) ; LXVII (1951), p. 102, fig. 1 (spores) ; p. 104, fig. 2 (poils).
- rufum. LXVII (1951), p. 105, fig. 3 (spores).
- sarasini. LXII (1946), p. 227, fig. 5 1-3 (appar. apic.).
Sclerotinia tuberosa. XLVI (1930), pl. VIII, fig. 35-47 (cytol.).
Stenocybe major var. macvicaris. XLII (1926), pl. VIII, fig. 33-34.
Stictis elegans. XLII (1926), pl. VIII, fig. 30-32 (anat.).
Tapezia sp. LXVII (1951), p. 185, fig. 3 O et P (base de l'asque).
Taphrina purpurascens. LXVII (1951), p. 185, fig. 3 A (asques).
Trichopeziza hepaticola. XLI (1925), p. 85 (anat.).
Urceolella ilicis. XLII (1926), pl. VIII, fig. 23-25 (anat.).
Urnula craterium. LXII (1946), p. 225, fig. 4 1-3 (appar. apic.).
- geaster. LXII (1946), p. 233 et 235 (pore apical).
- melastoma. LXII (1946), p. 225, fig. 4 5-10 (appar. apic., spores).
- platensis. LV (1939), p. 55, fig. 5 A-D (hab., sp.) et pl. I, fig. II.
Wynnea americana. LXII (1946), p. 229, fig. 6 1-8 (appar. apic.).
- atrofusca. XLI (1925), p. 447 (hymén. et sp.) ; XLV (1929), Atlas, pl. XXXV ; XLI (1925), p. 449-450.

PYRENOMYCETES

Sphériales

Ascopolyporus polychrous (forma). LXIX (1953), pl. V ; p. 420, (asque et spore).
Anixia perichaenoides. LXVIII (1952), p. 215, fig. 8 L et M.
- truneigena. LXVIII (1952), p. 215, fig. 8 N.

Bertia moriformis. LXVIII (1952), p. 155, fig. 3 ; p. 157, fig. 4 (anat.); p. 159, fig. 5 (asques et ascosp.) ; LXX (1954), p. 105, fig. 2 (asques).
Calonectria hederae. LXVIII (1952), p. 215, fig. 8 I à K.
Ceratosphaeria lanuginosa. XLVI (1930), p. 232 (asque et ascosp.).
Clathrosphaeria spicifera. LXVIII (1952), p. 211, fig. 7 P et Q.
Comoclatris milliarakisii. XLVI (1930), p. 234.
Cordyceps necater. LVII (1941), p. 14.
Didymella proximella. LXV (1949), p. 105, fig. 2 (asque et sp.).
Didymosphaeria brunneola. LXII (1946), p. 79, fig. 27 (ascosp.).
- cephalariae. LXV (1949), p. 104, fig. 3 (asque, sp.).
- polyspora. LXIV (1948), p. 174, fig. 6 ; p. 175, fig. 7.

Dothidella ulmi. LXX (1954), p. 101, fig. 1 (asques).
Eidamella papyricola. LXVI (1950), p. 125, fig. 1 ; p. 128, fig. 2 ; p. 131, fig. 3 ; p. 134, fig. 4.
Eutypa acharii. LXVII (1951), p. 407, fig. 1 ; p. 409, fig. 2 ; p. 411, fig. 3.
Eutypella amorphae. LXV (1949), p. 172.
Gnomonia fimicola. LXIV (1948), p.239, fig. 1-9 ; p. 243, fig. 10-12.
Guignardia euphorbiae. LXII (1946), p. 20, fig. 1.
Hypocreopsis lichenoides. LXVIII (1952), pl. VII (hab.) ; p. 362, fig. 1 (coupe) ; p. 365, fig. 2 (ascosp.).
Hysteriographium flexuosum. XLVI (1930), p. 237.
Irenina coffeae. L (1934), p. 321.
- isertiae. L (1934), p. 319, fig. 2.

Leptosphaeria eustoma. LXV (1949), p. 110, fig. 5 (asque et spores).
- eustomella. LXV (1949), p. 111, fig. 6 (asque, spores).
- ischaemi. LXV (1949), p. 113, fig. 7.
- niessleana. LXIV (1948), p. 103, fig. 1 ; p. 107, fig. 2 ; p. 110, fig. 3 (spores).
- verdoni. LXV (1949), p. 105, fig. 4.

Melanospora brevirostrata. LXI (1945), p. 55, fig. 1-11 ; p. 57, fig. 12-22.
Meliola disciseta. LII (1936), p. 81 et 82.
- sp. LXIX (1953), p. 273, fig. 3 S ; p. 299, fig. 15 H-M (mycél. et stigmop.).

Metasphaeria affinis. LXV (1949), p. 117, fig. 8 (asque, spore).
- errabunda. LXII (1946), p. 79, fig. 28 (ascosp.).

Microthyriella guineensis. LIV (1938), pl. I.
Mycosphaerella aquilina. LXII (1946), p. 79, fig. 29 (ascosp.).
- chelidonii. LXII (1946), p. 79, fig. 30 (ascosp.).
- pachyasca. LXV (1949), p. 119, fig. 10 (asque et sp.).
- tassiana. LXII (1946), p. 79, fig. 31 (ascosp.).
- (sp. punctiformis aff.). LXX (1954), p. 101, fig. 1 (asques).
- thironi. LXII (1946), p. 79, fig. 32 (ascosp.).

Mytilidion decipiens. LXV (1949), p. 118, fig. 9 (asque, ascosp.).
Nectria lichenicola. XLI (1925), pl. VIII (périth. et conidies).
- cacaoicola. L (1934), p. 326, fig. 2-3.

Phaedomus rauwolfiae. LXVI (1950), p. 229, fig. 1 ; p. 231, fig. 2.
Phyllachora digitariae. LXVII (1951), p. 137 (hab., périth.).
- podagrariae. XLIII (1927), pl. III et IV.
Physalospora moliniae. LXII (1946), p. 79, fig. 33 (ascosp.).
Pyrenophora coppeyana. XLVI (1930), p. 236 (asque, ascosp.).
Rosenscheldia paraguaya. LXVII (1951), p. 189, fig. 4 M et N (base de l'asque).
Sphaerostilbe polycephala. L (1934), p. 331.
Systremma natans. LXVIII (1952), p. 151, fig. 1 ; p. 152, fig. 2 (anat.).
Ustulina vulgaris. XLIII (1927), pl. I et II (anat., développem.).
Xylaria sicula. XLV (1929), pl. I - III.

Erysiphales

Leveillula taurica. LXVIII (1952), p. 390, fig. 2 (conidioph.).
Microsphaera mougeotii. XLI (1925), pl. XXIV et XV (conidies).
Phyllactinia corylea. XLI (1925), pl. XXII-XXIII (conidies).
Podosphaera leucotricha. XLI (1925), pl. XIX-XX (conidies) ; pl. XXI (périth.) ; pl. XXVI (hab.).
- oxyacanthae. XLI (1925), pl. XVIII (conidies).
Sphaerotheca pannosa. XLI (1925), pl. XII-XIV (conidies) ; pl. XV-XVII (hab.).

Laboulbéniales

Laboulbenia colasi. LVIII (1942), p. 190.
Rhachomyces anophtalmi. LVIII (1942), pl. II, fig. 7.
- aphaenopsis. LVIII (1942), pl. II, fig. 2-3.
- bolivari. LVIII (1942), pl. III, fig. 3.
- canariensis. LVIII (1942), pl. V, fig. 6.
- capucinus. LVIII (1942), pl. II, fig. 4-5.
- dedyi. LVIII (1942), pl. IV, fig. 4.
- fagniesi. LVIII (1942), pl. VI, fig. 1.
- furcatus. LVIII (1942), pl. VI, fig. 2-3.
- girardi. LXIII (1947), p. 205 et 206.
- glyptomeri. LVIII (1942), pl. VI, fig. 7.
- grassei. LVIII (1942), pl. IV, fig. 5-6.
- hypogaeus. LVIII (1942), pl. II, fig. 1.
- jeanneli. LVIII (1942), pl. II, fig. 6.
- maublanci. LVIII (1942), pl. III, fig. 1-2.
- peyerimhoffi. LVIII (1942), pl. III, fig. 9.
- philonthinus. LVIII (1942), pl. VI, fig. 6.
- pilosellus. LVIII (1942), pl. VI, fig. 4-5.
- proliferans. LVIII (1942), pl. V, fig. 3-5.
- reymondi. LVIII (1942), pl. IV, fig. 2.
- stipitatus. LVIII (1942), pl. III, fig. 4-7.
- stipitatus var. pallidus. LVIII (1942), pl. III, fig. 8.
- tenenbaumi. LVIII (1942), pl. VI, fig. 8.
- urbaini. LVIII (1942), pl. V, fig. 1-2.
- vayssierei. LVIII (1942), pl. IV, fig. 3.

Ustilaginales

Cintractia caricis. LI (1935), p. 114 (spore) ; LXIX (1953), p. 407, fig. A (spores).

Cintractia chinensis. LI (1935), p. 114 (spore).
- externa. LI (1935), p. 114 (spore).
- scleriicola. LXIV (1948), p. 168, fig. 2.
- subinclusa. LXIX (1953), p. 407, fig. B (spores).

Entyloma gaudinae. LXIX (1953), p. 337, fig. 5.
Mycosyrinx microspora. LXIV (1948), p. 167, fig. 1; LXVII (1951), p. 121, fig. 2 M (chlamydosp.).
Schizonella cocconii. LXIX (1953), p. 407, fig. C (glomér., sp.).
Sphacelotheca panici-miliacei. LIII (1937), p. 344 (germinat. des spores).
Tilletia sphanopodis. LXII (1946), p. 25, fig. 3 (spores).
Tuburcinia agropyri-juncei. LXIX (1953), p. 337, fig. 6.
- pulsatillae. LXIX (1953), p. 407, fig. F (sp.).
- ranunculi. LXIX (1953), p. 407, fig. E (sp.).
- sesleriae. LXIX (1953), p. 337, fig. 7.

Ustilago abstrusa. XLV (1929), p. 255, fig. 1-5 (hab., spore).
- bouriqueti. L (1934), p. 328.
- capensis. XLV (1929), p. 255, fig. 8 (hab., spore).
- olivacea var. microspora. LIII (1937), p. 341 (spores) et 340 (germinat.).
- scolymi. LIII (1937), p. 343 (germination des spores).
- striiformis. LXIX (1953), p. 407, fig. D (sp.).
- urgineae. LXII (1946), p. 24, fig. 2 (sp. et germinat.).

Urédinales

Aecidium cissicola. LXIV (1948), p. 170, fig. 3.
- dorsteniae-walteri. LXIV (1948), p. 171, fig. 4.
- endophylloides. XLV (1929), p. 114 (germinat. sp.).
- le testuanum. LXIV (1948), p. 173, fig. 5.
- narcissi. XLV (1929), p. 214.
- serratae. XLV (1929), p. 212, fig. 14 (écidiosp.) ; p. 213, fig. 15 (péridium).

Caeoma mercurialis. LXVII (1951), p. 175, fig. 1 R (début d'écid.).
- pulcherrimum. XLV (1929), p. 214 (écidiosp.).

Coleosporium campanules-trachelii. LIX (1943), p. 90, fig. 17 (téliosores).
Cronartium flaccidum. LIX (1943), p. 118, fig. 37-39 (téliosores).
Cumminsiella mirabilissima. LX (1944), p. 48, fig. 1-6 ; p. 49, fig. 7-9 (format. des spores).
Cystopsora oleae. LXVII (1951), p. 179, fig. 2.
Endophyllum euphorbiae-characiatis. XLV (1929), p. 107, 108, 109.
- euphorbiae-nicaeensis. XLV (1929), p. 107, 110, 113.

Gymnoconia interstitialis. LXVII (1951), p. 175, fig. 1 T.
Gymnosporangium sabinae f. oxycedri. LXVII (1951), p. 191, fig. 5 O à Q (germinat.).
Hemileia coffeicola. L (1934), p. 196, 197, 198, 199.
- gardeniae-thunbergiae. L (1934), p. 201 (uréd. et téleutosp.).
- pavetticola. LIV (1938), p. 49, 50.
- scholzii. LXVII (1951), p. 119, fig. 1 S.
- vastatrix. L (1934), p. 194 (urédosp.).

Kuehneola albida. LXVII (1951), p. 179, fig. 2 E et F (basides).
Maravalia pallida. LXVII (1951), p. 179, fig. 2 C et D.
Ochrospora sorbi. LXVII (1951), p. 179, fig. 2 A (baside).
Olivea capituliformis. LXVII (1951), p. 179, fig. 2 B.
Phragmidium fusiforme. XLIII (1927), p. 87 (probas.).

Phragmidium rosae-pimpinellifoliae. XLIII (1927), p. 88 (probas.).
- subcorticium. XLIII (1927), p. 89 (probas.) ; LIX (1943), p. 114, fig. 34-35 (téliosore, probas.).
- violaceum. LXVII (1951), p. 179, fig. 2 (J à L, probas.).
Pileolaria terebenthi. XLV (1929), p. 208 (probas.).
Puccinia alpestris. XLIII (1927), p. 71.
- alpina. XLIII (1927), p. 72 (hab.).
- aristolochiae. LXV (1929), p. 204 (probas.)
- athamanthae. LIX (1943), p. 107, fig. 27 (paraphyses).
- bahuensis. LXVII (1951), p. 121, fig. 2 D (sore, urédosp., probas.).
- bakoyana (Puccinia). LXVII (1951), p. 119, fig. 1 B (probas.).
- carthami. LXVIII (1952), p. 331, fig. 1 ; p. 334, fig. 2 (hab.) ; p. 336, fig. 3 ; p. 337, fig. 4 ; p. 339, fig. 5 ; p. 340, fig. 6-7 ; p. 341 (anat. de la plante et du parasite) ; p. 347, fig. 13 ; p. 348, fig. 14-15.
- centaureae. XLIII (1927), p. 76 (mésosp.) ; LIX (1943), p. 83, fig. 4-5 (probas.) et fig. 9 (urédo).
- centaureae-asperae. LIX (1943), p. 83, fig. 6-8 (téleutosore).
- cerasi. LXVII (1951), p. 179, fig. 2 M (probas. et bas.).
- cerinthes-agropyrina. LXIX (1953), p. 221, fig. 1 (probas.).
- circumacta. LXV (1949), p. 73 (hab., probas.).
- cirsii-lanceolati. XLIII (1927), p. 78 (sp.).
- clematidis-secalis. LXIV (1948), p. 183, fig. 1-6.
- coronata. LXV (1949), p. 123, fig. 2 (probas.).
- crepidicola. XLIII (1927), p. 79 (hab.).
- cynodontis. LIX (1943), p. 107, fig. 30 (sore) ; p. 108, fig. 31 (probas.).
- epilobii-tetragoni. XLIII (1927), p. 81 (spores) ; LXV (1929), p. 199.
- flahaultii. LXX (1954) ; p. 433 (probas.).
- gladioli. LXIX (1953), p. 225, fig. 2 (téleutosore).
- glechomatis. LIX (1943), p. 80, fig. 1 (stroma).
- graminis. LIX (1943), p. 88, fig. 15-16 (téleutosore).
- helianthi. LIX (1943), p. 107, fig. 26 (probas.).
- istriaca. LXV (1949), p. 73, fig. 1 (probas.).
- jasmini. LIX (1943), p. 95, fig. 21-22 (téleutosores).
- lantanae. LXVII (1951), p. 121, fig. 2 L (probas.).
- malvacearum. LXVII (1951), p. 191, fig. 5 N (base des probas.).
- menthae. XLV (1929), p. 203 (téleutosp.) ; LIX (1943), p. 116 (téliosp.) ; p. 133 (urédosp.).
- milii-effusi. LXI (1945), p. 62.
- picridis. (LIX (1943), p. 88, fig. 14.
- romagnoliana. LIX (1943), p. 109, fig. 32 (téliosore).
- salviae. LIX (1943), p. 80, fig. 2-3 (probas.).
- simplex. LIX (1943), p. 90 (mésosp.
- sonchi. LIX (1943), p. 112, fig. 33 (paraphyses).
- xanthii. LVIII(1942), p. 193, 194, 197, 198 ; LIX (1943), p. 97, fig. 23.
Trachyspora intrusa. LXVII (1951), p. 179, fig. 2 (D', probas.).
Uromyces acetosae. LIX (1943), p. 85, fig. 12-13 (sores).
- alpestris. XLV (1929), p. 123, fig. 2 (probas.).
- arenariae-leptoclados. LXIX (1953), p. 337, fig. 8.
- caryophyllinus. LXIX (1953), p. 337, fig. 9 (probas.).
- charmelii. XLV (1929), p. 207 (téleutosp.).
- dactylidis. LIX (1943), p. 105, fig. 26 (probas.).
- doricus. XLVI (1930), p. 230 (spores).
- excavatus. XLV (1929), p. 123, fig. 1 (probas.).
- flavicomae. XLV (1929), p. 123, fig. 4 (probas.).

Uromyces hybernae. XLV (1929), p. 123, fig. 3 (probas.).
- magnusii. LXIX (1953), p. 337, fig. 11 (probas.).
- ononidis. XLIII (1927), p. 69 (probas.).
- petitmengini. XLVI (1930), p. 231 (uréd. et téleutosp.).
- phyteumatum. XLIII (1927), p. 69 (probas.); XLV (1929), p. 207 (probas.).
- polygoni-avicullariae. LIX (1943), p. 98, fig. 25 (téliosores) ; p. 107, fig. 29 (probas.).
- prunellae. LXV (1929), p. 206 (téleutosp.).
- rumicis. LIX (1943), p. 85, fig. 10-11.
- spartei-juncei. LIX (1943), p. 90, fig. 20 (urédosore).
- striatus. LIX (1943), p. 229, fig. 3 ; p. 334, fig. 12 et 13 (probas.).
- suffruticosae. LXIX (1953), p. 337, fig. 10 (probas.).
- valerianae. XLV (1929), p. 206 (probas.).

Xenodochus carbonarius. LXVII (1951), p. 179, fig. 2(I, probas.).

Auriculariacées

Platygloea sp. LXX (1954), p. 123, fig. 1 A (baside).
Saccogloea sebacea. LXVII (1951), p. 179, fig. 2 Q (baside).
Septobasidium bagliotoanum. LXVII (1951), p. 179, fig. 2 P (baside).
- gossypinum. XLI (1925), p. 341 (anat.).

Trémellacées

Bourdotia caesio-cinerea. LXX (1954), p. 123, fig. 1 D (gloeocyst., sp.).
- deminuta. LXX (1954), p. 123, fig. 1 E (hymén. et sp.).
- galzini. LXX (1954), p. 123, fig. 1 F (dendroph., sp.).

Eichleriella spinulosa. LXVIII (1952), p. 303, fig. 1 C-D (baside, spore).
Exidia thuretiana. LXX (1954), p. 123, fig. 1 B (coupe, dendroph., sp.).
Sebacina calcea. LXX (1954), p. 123, fig. 1 C (spores).

Calocéracées

Dacryomitra pusilla. LXVIII (1952), p. 303, fig. 1 A et B (hab., bas., sp.).

Aphyllophorales

Acia denticulata. XLII (1926), pl. VI, fig. 9-10 (anat.).
- sibirica. LI (1935), pl. XI, fig. 4 (photo).

Aleurodiscus atlanticus. LXX (1954), p. 129, fig. 2 A (paraph. et sp.).

Aleurodiscus candidus. XLIX (1933), pl. XXIV, fig. 5 (photos).
- monilifer. LXX (1954), p. 131, fig. 3 (hymén.).
- polygonioides. LXX (1954), p. 129, fig. 2 C (paraph., bas. et sp.).
- roseus. LXX (1954), p. 129, fig. 2 B et D (anat.).
- scutellatus. XLII (1926), pl. VI, fig. 18-20 (anat.) ; p. 111, fig. 2 (photo).

Asterodon ferruginosum. LI (1935), pl. VIII, fig. 1 et 3 (photos).
Asterostroma ochroleucum. LXX (1954), p. 137, fig. 4 (stelles).
Asterostromella granulosa. XLIX (1933), p. 329 (gamén.) ; pl. VII, fig. 4 (photo).
Botryoconis saccardiana. LXIX (1953), p. 95, fig. 9 A et B (bas. et sp.).
Caldesiella crinalis. XLII (1926), pl. VI, fig. 3-5 (anat.).
- sajanensis. LII (1936), pl. V, fig. 2 (photo) ; p. 315 (sp.).

Calodon caeruleum. XLIX (1933), pl. II (photos).
Clavaria argillacea. LV (1939), p. 217 (hab., bas., sp.) ; p. 218 (var. obtusata).
- aurea. XLIX (1933), pl. I, fig. 1-3 (photos).
- falcata. LXVIII (1952), p. 305, fig. 2 (hab., bas. et sp.).
- fistulosa. XLI (1925), Atlas, pl. VIII.
- flaccida. LXVIII (1951), p. 175, fig. 1 L et M (boucles mycél.).
- mairei. LIV (1938), p. 45, fig. 1-2 (photos) ; p. 46, fig. 3 (anat.).
- microspora. LXIV (1948), p. 31, fig. 8 (hab., spores).
- pallida. XLI (1925), Atlas, pl. III.
- pulchra f. coccineo-basalis. LIII (1937), pl. VI, fig. II (photo) ; p. 223 (hab., bas., sp.).
- pyxidata. XLIX (1933), pl. V-3 (photo).
- sphagnicola. LV (1939), p. 215 (hab., bas., sp.).

Climacodon septentrionale. XLIX (1933), p. 311 (anat.).
Clinoconidium bullatum. LXIX (1953), p. 95, fig. 9 C à F (bas. et sp.).
Clitopilina striata. LXVIII (1951), p. 185, fig. 1 F (baside).
Conodyctium chevalieri. LXIX (1953), p. 79, fig. 1 (hab.) ; p. 80, fig. 2 ; p. 81, fig. 3 (anat.) ; p. 83, fig. 4 (basidiosp.) ; p. 85, fig. 5 (bas.) ; p. 87, fig. 6 ; p. 89, fig. 7 ; p. 90, fig. 8 (germinat. et développem.).
Coniophora betulae. XLII (1926), pl. VI, fig. 1-2 (anat.).
- fusispora. XLIX (1933), p. 35 (anat.).

Coniophorella laeticolor. XLIX (1933), p. 297 (hymén.).
- olivacea. LI (1935), p. 395, fig. 9 (anat.).

Coriolus abietinus. XLVIII (1932), pl. II, fig. 1 ; pl. XVI, fig. 1-3 (photo) ; pl. XXI, fig. 2-3 (f. resupinata) ; pl. XXII, fig. 1-2 ; LII (1936), p. 315 (spores).
- favoliporus. LII (1936), pl. III, fig. 4 (photo) ; p. 315 (spores).
- hirsutus. XLIX (1933), pl. XVI, fig. 2 (photo).
- lenzitoidea. LI (1935), p. 367 (hymén.) ; pl. VII, fig. 4.
- ravidus. LII (1936), p. 315 (sp.).
- subradula. LI (1935), pl. VII, fig. 3.

Corticium caeruleum. LXVII (1951), p. 191, fig. 5 D (mycél., anastom.).
- deflectens. LXVIII (1952), p. 321, fig. 7 A (spores).
- laetum var. tatrense (Corticium) ... XLII (1926), pl. VI, fig. 16-17 (anat.).
- rickii. LXVIII (1952), p. 321, fig. 7 B (spores).

Cotylia carpathica. LXX (1954), p. 58 (hab., anat.).
Craterellus konradii. XLIV (1930), pl. X, fig. 17-21.

Cyphella albomarginata. LXX (1954), p. 149, fig. 7 A (revêtem.).
- anomala. LXX (1954), p. 149, fig. 7 C (revêtem. pil.).
- crucaeformis. XLIX (1933), p. 48 (hab., sp.) ; pl. VII, fig. 1-3 (photos.
- muscigena. LXX (1954),p. 149, fig. 7 B (spores).
- poriaeformis. LXX (1954), p. 149, fig. 7 D (revêtem.).

Drepanoconis fructigena. LXIX (1953), p. 95, fig. 9 J à L (bas., sp.).
- larviformis. LXIX (1953), p. 95, fig. 9 G à I (bas., sp.).

Dryodon caput-ursi. XLIX (1933), pl. I, fig. 4 (photo).
- cirrhatum. XLIX (1933), p. 314 (hymén.).
- coralloides f. caput-ursi. XLIX (1933), pl. I, fig. 4 (photo).
- fragile. LI (1935), p. 407 (anat.).
- pulcherrimum. XLIX (1933), p. 316 (hymén.) ; pl. XVII (photos); pl. XVIII (photos).

Entolomina paludosa. LXVII (1951), p. 175, fig. 1 E (baside).
Fomes scutatus. XLIX (1933), pl. XV, fig. 2 (photo).
Ganoderma colossum. XLII (1926), pl. XIV (en noir).
- frondosum. XLII (1926), pl. XV, fig. II (en noir).
- lucidum f. valesiacum. XLIX (1933), pl. XIII (photo).

Gloeocystidium alutaceum. LXVIII (1952), p. 324, fig. 8 A et B (cyst., sp.).
- luridum. LXVIII (1952), p. 324, fig. 8 C et D (bas., cyst., spores).
- tenue. LXVI (1950), p. 206, 207, 209 et 217 (mycél., cyst.).

Grandinia bonderzewii. XLIX (1933), pl. VI (photos).
- brinkmanni. XLII (1926), pl. VII, fig. 3-4 (anat.).
- farinacea. XLII (1926), pl. VII, fig. 5 (anat.).
- helvetica. XLII (1926), pl. VII, fig. 1-2 (anat.) ; XLIX (1933), pl. VI, fig. 3 (photo).
- mutabilis. XLII (1926), pl. VI, fig. 14-15 (anat.).

Grifola castaneae. LII (1936), pl. I (photos).
Hexagona nitida. LIII (1937), pl. I (photo).
Hydne hérisson. LXVIII (1952), pl. III (ex Bulliard).
Hymenochaete subfuliginosa. LXVIII (1952), p. 314, fig. 5 A et B (hymén., sp.).
- tabacina var. konradi. LI (1935), p. 413 (anat.).

Hypochnus capnophilus. LXVII (1951), p. 191, fig. 5 H (mycél., bas.).
- effusus. LXVII (1951), p. 175, fig. 1 H (baside).
- sambuci. LXVII (1951), p. 175, fig. 1 J (baside).
- solani. LXVII (1951), p. 175, fig. 1 D (hymén.) ; p. 191, fig. 5 E et F (mycél., anastom.).
- subcoronatus. LXVII (1951), p. 175, fig. 1 G (baside).
- sp. LXVII (1951), p. 191, fig. 5 B et C (mycél., anastom.) et G (boucle).

Irpex raduloides. LII (1936), pl. VII, fig. 2 (photo) ; p. 315 (sp.).
Lenzites betulina. XLIX (1933), pl. XVI, fig. 4 (photo).
- tricolor. XLIX (1933), pl. XVI, fig. 3 (forma) (photo).

Leptoporus albellus. XLVIII (1932), pl. I, fig. 4.
- albidus. LII (1936), pl. IX, fig. 3 (photo) ; p. 315 (spores).
- alma-atensis. LII (1936), pl. III, fig. 1-2 (photos) ; p. 315 (spores).
- imberbis. XLIX (1933), p. 158 (oidies).
- litschauerii. XLVIII (1932), pl. VIII, fig. 1 (photo) ; LII (1936), pl. IV, fig. 3 (photo) ; p. 315 (spores).
- micantiformis. LI (1935), pl. VII, fig. 2 (photo).
- resupinatus. XLVIII (1932), pl. XIV, fig. 1-2 (photos) ; p. 16, fig. 2 (spores).
- undatus. XLVIII (1932), p. 16, fig. 3 (spores).

Leptoporus uralensis. XLVIII (1932), pl. I, fig. 1-3 (spores) ; p. 16, fig. 1 (spores).
- zameriensis. LI (1935), pl. VI, fig. 2 (photo).
- zilingianus. XLIX (1933), pl. XII, fig. 3 (photo).

Leucoporus brumalis. L (1934), Atlas, pl. LXV.
- forquignoni. XLV (1929), Atlas, pl. XXXIV.

Melanopus guyanensis. LVII (1941), pl. I.
- rhizomorpha. LVII (1941), p. 11 et pl. I et II.
- squamosus. LII (1936), p. 350 et 352 (spores), 353, 355, 357, 358, 359, 360, 361 (mycél., oidies, cytol.).

Merulius niveus. XLIX (1933), pl. XVIII, fig. 1 (photo) ; p. 292 (anat.).
- rubicundus. XLIX (1933), pl. XXV, fig. 2 (photo) ; p. 294 (anat.).
- rufus. LXVII (1947), III à VI (mycél., oidies) ; p. 159, fig. 1 ; p. 161, fig. 2 ; p. 163, fig. 3 ; p. 165, fig. 4 ; p. 167, fig. 5.
- stratosus. LII (1936), p. 323 ; pl. V, fig. 1 (photo).

Mucronella agregata. XLII (1926), pl. VI, fig. 6-8 (anat.).

Mycoleptodon corneum. XLIX (1933), p. 306 (anat.) ; pl. XVIII, fig. 4 (photo) ; LI (1935), p. 405 (photo).
- dichroum. XLIX (1933), p. 305 (anat.).
- fimbriatum. XLII (1926), p. 102, fig. 1 (photo).
- fuscoatrum. LI (1935), p. 402, fig. 12 (anat).
- kavinae. LI (1935), pl. VIII, fig. 2 (photo) ; p. 400, fig. 11 (anat.).
- ljubarskyi. LII (1936), p. 327, fig. 38 (hymén., sp.) ; p. 315 (spores).
- murashkingskyi. XLIX (1933), pl. XXI, fig. 1-7 (photos) ; p. 301 (anat.).
- mycophilum. LI (1935), pl. VIII, fig. 4 (photo) ; p. 399.
- narymicum. LI (1935), pl. IX, fig. 3 (photo) ; p. 404, fig. 13 (anat.).
- ochraceum. XLIX (1933), pl. III, fig. 1 (photo).
- reflexum. XLIX (1933), pl. XXI, fig. 8-10 (photos) ; p. 303 (anat.).
- rhizoideum. LI (1935), pl. IX, fig. 4 (photo) ; p. 406, fig. 15 (anat.).

Odontia arguta. XLII (1926), fig. 6-7 (anat.) ; XLIX (1933), pl. V, fig. 4 (photo) ; pl. VI, fig. 2 (photo).
- barba-jovis ssp. abieticola. XLIX (1933), pl. V, fig. 1 (photo).
- bicolor. XLIX (1933), pl. VI, fig. 4 (photo).
- bugellensis. XLII (1926), pl. VII, fig. 20-21 (anat.).
- carneola. LII (1936), p. 325 (hymén., sp.) ; pl. VII, fig. 1 (photo).
- conspersa. XLII (1926), pl. VII, fig. 18-19 (anat.).
- nemecii. XLIX (1933), pl. III, fig. 3-4 (photos) ; pl. IV, fig. 1, 2, 3, 4 (photos).
- papillosa. XLII (1926), pl. VII, fig. 15-17 (anat.).
- queletii. XLIX (1933), pl. III, fig. 2.
- stipata. XLII (1926), pl. VII, fig. 13-14 (anat.).
- subalbicans. XLII (1926), pl. VII, fig. 8-9 (anat.).
- sudans. XLII (1926), pl. VII, fig. 10-12 (anat.) ; XLIX (1933), pl. V, fig. 2 (photo).

Peniophora byssoidea. LXX (1954), p. 140, fig. 5 A (trame, cyst. et sp.).
- glebulosa ssp. cineracea. XLII (1926), pl. VI, fig. 21-22 (anat.).
- glebulosa ssp. sororia. XLII (1926), pl. VI, fig. 23 (anat.).

Peniophora gracillima. LXX (1954), p. 143, fig. 6 A (cyst., bas., sp.).
- greschikii. LXX (1954), p. 143, fig. 6 B (hyphes, cyst.).
- heterogenea. LXVIII (1952), p. 317, fig. 6 A-B (gléocyst., sp.).
- hilitzeri. LIII (1937), p. 99 (anat.) ; pl. IV (photos).
- incarnata. LXX (1954), p. 143, fig. 6 C (cyst.).
- incrassata. LXVIII (1952), p. 317, fig. 6 D (bas., cyst., sp.).
- lindtneri. LIII (1937), p. 98 (anat.) ; pl. III (photo).
- longispora. LXVII (1951), p. 175, fig. 1 K (bas. et spin.).
- mollis. XLII (1926),pl. VI, fig. 24-25 (anat.).
- pallidula. XLII (1926), pl. VI, fig. 26-27 (anat.).
- subcrema. LIII (1937), p. 256.
- subulata. LXVIII (1952),p. 314 (cyst. et sp.), fig. 5 C-D.
- tomentella. LXX (1954), p. 140, fig. 5 B (trame et cyst.).
- velutina. LXX (1954), p. 143, fig. 6 D (bas., cyst., sp.).
- sp. LXVII (1951), p. 191, fig. 5 A (anastom. et boucles).

Phaeolus fibrillosus. XLIX (1933), pl. XX, fig. 7 (f. semiresupinatus) (photo).
- schweinitozii. XLVIII (1932), pl. XVI, fig. 4 (photo).

Phellinus baumii. XLVIII (1932), pl. II, fig. 2 ; pl. V, fig. 3 ; pl. VIII, fig. 3 (photos) ; p. 16, fig. 5-6 (hymén., sp.).
- contiguiformis. LI (1935), pl. X, fig. 2 (photo).
- ferrugineo-fusceus. LI (1935), p. 369 (anat.) ; p. 371 (var. namyricus).
- friesianus. XLVIII (1932), pl. VIII, fig. 4 (photo).
- gilvus. XLIX (1933), pl. XX, fig. 4-6 (photos).
- nigrolimitatus. LII (1936), pl. VI, fig. 3 (photo).
- robustus f. hartigii. XLIX (1933), pl. XVI, fig. 1 (photo).
- salicinus. XLVIII (1932), pl. XIX, fig. 2-3 (photos) et pl. XX, fig. 4(f. minor).
- sulphurascens. LI (1935), p. 373 (anat.).

Phlebia macra. XLIX (1933), pl. XXV, fig. 1 (photo) ; p. 288 (anat.).

Pistillaria fulgida. LXVIII (1952), p. 307, fig. 3 A à D (bas., sp.).
- micans. LXVIII (1952), p. 307, fig. 3 D et E (hab., sp.).
- pusilla. LIX (1943), p. 32, fig. 6 (bas., sp.).
- quisquiliaris. LIII (1937), p. 226 (hab., sp.) ; LXVIII (1952), p. 307, fig. 3 H (spores).
- setipes. LXVIII (1952), p. 307, fig. 3 F-G (spores et carpophores).

Polyporellus albiceps. XLIX (1933), pl. XIX, fig. 3 (photo).
- arcularius. XLIX (1933), pl. XIX, fig. 4-5 (photo) (var. minutipora).
- brumalis. XLIX (1933), pl. XVI, fig. 5 ; pl. XVIII, fig. 4, (photos) (f. incendiarius).
- chakasskensis. XLIX (1933), pl. XIV, fig. 3-4.
- varius. XLIX (1933), pl. XIX, fig. 1-2 (f. melanopodiformis) (photos).

Poria ambigua. XLVIII (1932), pl. IV, fig. 4 ; pl. VII, fig. 2 (photos).
- aneirina. XLVIII (1932), pl. III, fig. 2 (photo).
- bombycina. XLVIII (1932), pl. XVIII (photo).
- calcea (type et var.). XLVIII (1932), pl. XVII et XIX, fig. 4 (photos).
- cinerea. XLVIII (1932), p. 16, fig. 7 (spores).
- consobrinoides. LI (1935), pl. X, fig. 4 (photo).
- corticola. XLVIII (1932), p. 39 (anat.) ; pl. VII, fig. 1 (photo) ; XLIX (1933), pl. XIV, fig. 2 (photo).

Poria eupora. XLVIII (1932), p. 46, fig. 7 (anat.) ; pl. IV, fig. 1-2 (photo) ; XLIX (1933), pl. XV, fig. 3 (photo).
- gelatinoso-tubulosa. LI (1935), pl. XI, fig. 3 (photo).
- gilvescens. XLVIII (1932), p. 16, fig. 8 (spores).
- greschikii var. subiculosa. XLVIII (1932), pl. III, fig. 3 (photo).
- kazakstanica. LII (1936), pl. IV, fig. 1-2 (photos) ; p. 315 (sp.).
- krawtzewi. XLIX (1933), pl. XIII, fig. 3 (photo).
- litschauerii. XLVIII (1932), pl. VII, fig. 3 (photo).
- lunulispora. LI (1935), pl. X, fig. 3 (photo).
- mollusca. XLVIII (1932), p. 16, fig. 9 (spores) ; pl. XX, fig. 2 ; pl. XXIV, fig. 3-4 (photos).
- phellinoides. LI (1935), pl. VI, fig. 1 (photo).
- pilati. XLVIII (1932), pl. XXV.
- polycystidiata. XLIX (1933), p. 335 (cyst.) ; pl. XIV, fig. 1 (photo).
- pseudogilvescens. LI (1935), pl. XI, fig. 1 (photo).
- purpurea. XLVIII (1932), pl. III, fig. 4 (photo).
- radula. XLVIII (1932), p. 46, fig. 8 (anat.) ; pl. IV, fig. 3 (photo).
- reticulato-marginata. LI (1935), pl. X, fig. 1 (photo).
- rixosa. LI (1935), p. 386 (cyst., spores).
- shakaskensis. XLIX (1933), pl. XIV, fig. 3-4 (photos).
- sinuosa. XLVIII (1932), p. 16, fig. 10 (spores).
- trametopora. LI (1935), pl. VI, fig. 3 (photo).
- tschulymica. XLVIII (1932), p. 36, fig. 5 (anat.) ; pl. VI, fig. 4 (photo).
- turkestanica. LII (1936), pl. IV, fig. 4 (photo).
- vaporaria. XLVIII (1932), pl. V, fig. 1, 2, 4 (photos).
- wasjuganica. LI (1935), pl. VI, fig. 4 ; pl. XI, fig. 2 (photos).

Porostereum phellodendri. LII (1936), p. 331, fig. 39 (hymén., sp.); pl. V, fig. 3-4 (photo).

Radulum fuscescens. LII (1936), pl. VII, fig. 3-4 (photos).
- mucidum. XLII (1926), pl. VI, fig. 11-13 (anat.).

Sarcodon abietum. LXVII(1951), Atlas, pl. XCIX.

Sclerodon strigosum. XLIX (1933), p. 309 (anat.) ; pl. XVIII, fig. 3 (photo).

Shepperia carpathica. XLIII (1927), pl. V.

Solenia svrcekii. LXIII (1947), pl. VII (photo).

Spongipellis litschaueri. XLIX (1933), pl. XXV, fig. 3-4 (photos).
- spumeus. LXIII (1947), p. 139, fig. 2 (chlamydosp.).

Stereum chailleti. XLIX (1933), p. 322 (anat.).
- rameale. XLIX (1933), pl. XXIV, fig. 1 (photo).
- sponheimeri. LIII (1937), pl. II (photo).
- sulcatum. XLIX (1933), pl. XXIV, fig. 5 (photo).
- versiforme. XLIX (1933), pl. XXIV, fig. 2-4 (photos).

Tomentella atro-violacea. XLIX (1933), p. 54, fig. 4 (anat.).
- cervina. XLIX (1933), p. 59, fig. 6 (basides, spores).
- ferruginea. LXVII (1951), p. 175, fig. 1 I (baside).
- flaccida var. fungicola. XLIX (1933), p. 64, fig. 9 (basides et spores).
- gibbosa. XLIX (1933), p. 71, fig. 11 (bas., sp.).
- ochraceo-olivacea. XLIX (1933), p. 63, fig. 8 (bas., sp.).
- pilati. XLIX (1933), p. 73, fig. 12 (bas., sp.).
- ruttneri. XLIX (1933), p. 68, fig. 10 (bas., sp.).
- subcervina. XLIX (1933), p. 61, fig. 10 (hymén., sp.).
- subclavigera. XLIX (1933), p. 58, fig. 5 (hymén., sp.).

Tomentella tenebrosa. LXX (1954), p. 154, fig. 8 (trame, bas., sp.).
- sp. LXVII (1951), p. 191, fig. 5 M (chlamydosp.).
Trametes carnea. XLIX (1933), pl. XII, fig. 1-2 (photos).
- cervina. XLIX (1933), pl. XX, fig. 8-9 et fig. 1 (f. levis) (photos).
- cinnabarina. L (1934), p. 102 (mycél., cytol.) ; pl. V et VI, fig. 11-12.
- gibbosa f. amurensis. XLIX (1933), pl. XX, fig. 2-3 (photos).
- hispida. L (1934), pl. VI, fig. 17-20 (cytol.).
- irpicoides. LII (1936), pl. VI, fig. 2 (photo).
- ljubarskyi. LII (1936), pl. VIII, fig. 3 (photo).
- mollis. XLIX (1933), pl. XII, fig. 4 (photo).
- namyricus. LI (1935), pl. IX, fig. 1 (photo).
- odorata var. piceae-schrenjianae. LI (1935), pl. VII, fig. 1 (photo).
- rubescens. XLIX (1933), pl. XVI, fig. 3 (photo).
- squalens. XLIX (1933), pl. XXI, fig. 11 et 12.
- suaveolens. XLIX (1933), p. 136 (oidies) et 141 (mycél.).
- subsinuosa f. heteromorpha. XLVIII (1932), pl. VIII, fig. 2 (photo).
- trabea. XLVIII (1932), pl. XX, fig. 1 (photo).
Ungulina annosa. XLVIII (1932), pl. XV, fig. 4 (photo).
- betulina. XLIV (1928), p. 329 (photo).
- corrugis. XLVIII (1932), pl. XV, fig. 1 (photo).
- fraxinea. LII (1936), pl. VIII, fig. 1, 2, 4 ; pl. IX, fig. 1-2 (photos) ; pl. VI, fig. 1.
- fuliginosa. XLVIII (1932), pl. XIX, fig. 1 ; pl. XXI, fig. 1 et 4 (photos).
- lapponica. XLIX (1933), pl. XV, fig. 1 (photo) ; p. 269 (anat.).
- marginata. XLVIII (1932), pl. XV, fig. 3 (photo).
- pseudobetulina. XLVIII (1932), p. 16, fig. 3 (spores).
- rosea. XLVIII (1932), pl. XV, fig. 2 (photo).
- scutellata. XLIX (1933), pl. XV, fig. 2 (photo).
Veluticeps berkeleyi. LV (1939), p. 43, fig. 3 H (coupe) ; p. 49, fig. 4 E-F (anat.).
- heimii. LV (1939), p. 43, fig. 3 (hab., hymén.) ; p. 49, fig. 4 A-D (anat.).
Xanthochrous abietis. XLVIII (1932), pl. II, fig. 3-4 (f. murashkinskyi) ; pl. VII, fig. 4 (f. micropora) (photos).
- cuticularis. XLVII (1931), Atlas, pl. XLVII.
- glomeratus ssp. heinrichii. LXVIII (1932), p. 29 (anat.) ; pl. VI, fig. 1-2 (photos).
- krawtzewii. XLIX (1933), pl. XXII (photos).
- pini. XLIX (1933), p. 334 (f. laricis) ; pl. XXIII (type et formes) (photos) ; LII (1936), p. 315, fig. 13 (spores).
- pseudobliquus. LI (1935), pl. IX, fig. 2 (photo).
- radiatus. LII (1936), p. 315, fig. 22 (sores).
- rheades. XLVIII (1932), pl. III, fig. 1 (photo).
- suberoso-mollis. LII (1936), p. 315, fig. 24 (soies hymén.) ; pl. VI, fig. 4 (photo.

Bolétacées

Bolet rude. LXVIII (1952), pl. V (ex Bulliard).
Boletellus russelii. LII (1936), p. 257, fig. 4 (bas., cyst., sp.).
Boletinellus paluster. LII (1936), p. 253, fig. 2 (bas., cyst., sp.).

Boletus dupainii. XLVII (1931), Atlas, pl. XLIV ; LXVI (1950), p. 97, fig. 1 (bas., cyst., sp.), et p. 99, fig. 2 (trame).
- erythropus. XLVIII (1932), pl. XXII, fig. 4 (photo).
- flavidus. LIII (1937), p. 291 (hab., anat.).
- fragrans. XLVII (1931), Atlas, pl. XLV.
- impolitus. XLVII (1931), Atlas, pl. XLVI.
- lupinus. LXIV (1948), Atlas, pl. XC.
- lupinus ss. Bres. XLIV (1948), pl. II et III.
- purpureus. XLII (1926), Atlas, pl. XII.
- queletii. XLII (1926), Atlas, pl. XI ; LI (1935), Atlas, pl. LXVI et LXVII.
- regius. XLII (1926), Atlas, pl. XVII et XVIII (var.).
- subtomentosus. XLVII (1931), Atlas, pl. XLII et XLIII (var.).
- tridentinus. LXII (1947), Atlas, pl. LXXXIX.
- viscidus. LXV (1949), Atlas, pl. XCI.

Gyrodon lividus. LXVI (1950), Atlas, pl. XCIV.
Strobilomyces lepidellus. LII (1936), p. 259 (bas., sp.).
Tubiporus erythropus var. junquilleus. XVI (1950), pl. III.
Xerocomus tumidus. LII (1936), p. 251 (bas., cyst., sp.) ; LXX (1954), Atlas, pl. C.

Agaricacées

Agaric azuré. LXVIII (1952), pl. II (ex Bulliard).
Agaricus campester. LIII (1937), p. 129 (développem. de l'anneau) ; LXVIII (1952), p. 385 (spore, pore germin.).
- rubellus. XLIII (1927), Atlas, pl. XXII.

Agrocybe aegerita. LXII (1946), p. 156, fig. 4-5 (mycél. et boucles).
- broadwayi. LXIX (1953), pl. IV, fig. 2.
- vervacti. LVIII (1942), p. 138, fig. 10 (anat.).

Alnicola alnetorum. XLVII (1931), p. 241, fig. F (spores).
- badia. XLVII (1931), p. 241, fig. C (spores).
- bohemica. LI (1935), p. 199 (anat.).
- clavuligera. LVIII (1942), p. 125 (anat.).
- luteofibrillosa. XLVII (1931), p. 241, fig. A (spores).
- suavis. XLVII (1931), p. 241, fig. D (spores).
- submelinoides. XLVII (1931), p. 241, fig. E (spores).
- umbrina. XLVII (1931), p. 241, fig. B (spores).

Amanita baccata. XLII (1926), p. 269 (spores) ; LVIII (1942), p. 23 (hab., coupes).
- barlae. XLII (1926), p. 269 (spores).
- eliae. XLVI (1930), Atlas, pl. XXXVI.
- gilberti. XLI (1925), pl. XXX.
- lepiotoides. XLII (1926), p. 269 (spores).
- ovoidea. XLII (1926), p. 269, fig. 1 (spores).
- pantherina var. abietum. L (1934), pl. VII.
- ponderosa. LVIII (1942), p. 31 (bas., sp.), et p. 33 (hab.).
- umbrinolutea. XLV (1929), Atlas, pl. XXIX.
- vaginata. XLVIII (1932), pl. XXVII (photo).

Androsaceus epiphyllus. XLIII (1927), p. 113 (anat.).
- eufoliatus. XLIII (1927), p. 111 (anat.).
- hederae. XLIII (1927), p. 115 (anat.).

Armillaria kuraiana. XLIX (1933), pl. XIII, fig. 1-2 (photos).
Bolbitius broadwayi. LXIX (1953), pl. IV, fig. 1.
- mexicanus. LXIX (1953), pl. IV, fig. 3.

Chitoniella bahiensis. XLVIII (1932), pl. XXXVII.

Clitocybe angustissima. LV (1939), p. 103, fig. 3, et pl. II, fig.3.
- atrostriata. LXVII (1951), p. 396, fig. 16, et pl. V, fig. 16.
- chudacae. XLIV (1928), pl. I (photos).
- concava. LXVII (1951), p. 391, fig. 11, et pl. V, fig. 11.
- diatreta. LV (1939), p. 103, fig. 5, et pl. II, fig. 5.
- dicolor. LXVII (1951), p. 391, fig. 10, et pl. V, fig. 10.
- ditopoda var. longispora. LV (1939), p. 103, fig. 1, et pl. II, fig. 1.
- expallens. LXVII (1951), p. 391, fig. 9, et pl. V, fig. 9.
- fuligineipes. LV (1939), p. 111, fig. 6, et pl. II, fig. 6.
- gallinacea. L (1934), Atlas, pl. LXIV.
- gangraenosa. LV (1939), p. 103, fig. 2, et pl. II, fig. 2.
- gyrans. LXVII (1951), p. 401, fig. 18 (hab., sp.).
- hydrogramma var. werneri. LVIII (1942), p. 33, fig. 3 (hab.), et p. 37, fig. 4 (anat.).
- incarnata. LXVII (1951), p. 396, fig. 17, et pl. V, fig. 17.
- incilis. LV (1939), p. 111, fig. 8, et pl. II, fig. 8.
- lignatilis. L (1934), p. 163 (spores).
- litua. LXII (1946), p. 44, fig. 1, et pl. II, fig. 1 ; LXIX (1953), p. 310, fig. 1 ; p. 311, fig. 2 (mycél.) ; p. 314, fig. 3 (bas., cytol.) ; p. 317, fig. 4 ; p. 319, fig. 5 ; p. 320, fig. 6 (sp. germinat.).
- mortuosa. LXVII (1951), pl. V, fig. 8 ; p. 391, fig. 8.
- obsoleta. LV (1939), p. 111, fig. 7, et pl. II, fig. 7.
- orbiformis. LXVII (1951), pl. V, fig. 12 ; p. 391, fig. 12.
- osmophora. LI (1935), p. 115 (bas., sp.).
- pausiaca. LXVII (1951), p. 396, fig. 14, et pl. V, fig. 14.
- pulla. LXVII (1951), p. 396, fig. 13, et pl. V, fig. 13.
- rivulosa. LXII (1946), p. 44, fig. 1 (coupe, bas. et sp.), et pl. II, fig. 2.
- rivulosa var. gracilis. LV (1939), p. 103, fig. 4, et pl. II, fig. 4.
- rufulo-alutacea. LXII (1946), p. 44, fig. 4, et pl. II, fig. 4.
- salmona. LXII (1946), p. 44, fig. 3, et pl. II, fig. 3.
- senilis. LXIV (1948), p. 13, fig. 3 (spores).
- sinopica var. microspora. LIV (1938), p. 74 (hab., anat.).
- straminea. LXII (1946), p. 44, fig. 6, et pl. II, fig. 6.
- tabescens. XLIX (1933), Atlas, pl. LV.
- tornata. LXVII (1951), p. 401, fig. 1, et pl. V.
- trullaeformis. LXIV (1948), p. 13, fig. 3.
- umbilicata. LXVII (1951), p. 396, fig. 15, et pl. V, fig. 15.
- vibecina var. floccipes. LXII (1946), p. 44, fig. 5 (coupe, bas., sp.), et pl. I, fig. V.

Clitopilopsis hirneola. LXII (1946), p. 156, fig. 4 (1, hyphes).

Clitopilus pinsitus. LIII (1937), p. 210 (spores), et pl. VI, fig. 1 (photos).

Collybia ambusta. LIII (1937), p. 185 et 189 (hab., sp.).
- atrata. LIII (1937), p. 183 (spores, hab.).
- cycadicola. LI (1935), p. 245 (hab., anat.).
- myriadophylla. LIII (1937), p. 179 (hab., anat.).
- tylicolor. LIV (1938), Atlas, pl. LXXX, fig. 11.
- velutipes. LXIX (1953), p. 239, fig. 1 (oïdies) ; p. 240, fig. 2 ; p. 241, fig. 3 (mycél.).

Conocybe aberrans. LVI (1940), p. 51, fig. 3 (hab., anat.).
- crispa. LXIX (1953), pl. IV, fig. 11.
- crispa var. microspora. LXIX (1953), pl. IV, fig. 10.
- hexagonospora. LVI (1940), p. 49, fig. 2 (hab., anat.).
- lactea. LVI (1940), p. 47, fig. 1 (hab., anat.).
- microspora. LXIX (1953), pl. IV, fig. 9.
- pubescens. LXII (1946), p. 156, fig. 3 (mycél. et boucles).
- teneroides. LVIII (1942), p. 147, fig. 15 (coupes).

(Coprinus) vermiculifer. LX (1944), pl. I (photo) ; p. 7, fig. 1 (hab., anat.).
- verrucispermus. LX (1944), p. 12, fig. 2 (hab., anat.).
- xanthothrix. LXIII (1947), p. 172, fig. 1 (spores).
Cortinarius acutus. LV (1939), p. 202, fig. 3 (hab., anat.) ; LVI (1940), p. 117, fig. 6 (hab.).
- albofimbriatus. LVI (1940), p. 94 (hab.).
- arcifolius. LII (1936), pl. II, fig. 3.
- armillariellus. LVI (1940), p. 89 (hab.).
- bivelus. L (1934), p. 236 (hab., bas., sp.).
- caesiocyaneus. LI (1935), p. 41 (sp., arête lam.).
- caninus f. saugetii. LIII (1937), p. 161 (hab.).
- cyanopus. LI (1935), p. 63.
- depressus. LIV (1938), Atlas, pl. LXXIX.
- dibaphus. LI (1935), p. 51 (hymén.) ; LII (1936), p. 165 (arête des lam.) ; LXX (1954), Atlas, pl. CI.
- dionysae. XLIX (1933), pl. X ; LI (1935), pl. II, fig. 5.
- elegantior. LI (1935), p. 84 (arête des lam., sp.) ; pl. II, fig. 4.
- finitimus. L (1934), p. 81, 82, 83 (hab., anat.).
- hemitrichus. L (1934), p. 86 (hab., sp.).
- holophaeus. LXIV (1948), p. 37 (hab.), et p. 39 (anat.).
- (Myxacium) illipatus. LX (1944), pl. III, fig. 2.
- infucatus. L (1934), p. 170 (arête des lam., sp.).
- luci. LVI (1940), p. 105, fig. 4 (hab.).
- mucifluus. L (1934), p. 288 (hab., bas., sp.).
- mucosus. L (1934), p. 279 (hab., sp.), et p. 280.
- multiformis. LI (1935), p. 95 (arête lam., sp.).
- nemorosus. LII (1936), pl. II, fig. 2.
- paleaceus. XLIX (1933), p. 211 (hab.) ; p. 215 et 223 (sp.).
- parvus. LI (1935), pl. I, fig. 2, et p. 80, fig. 7.
- persoonii. XLVIII (1932), p. 327 (hab., sp.).
- praestans. LI (1935), p. 233 (bas., arête lam.).
- pseudobolaris. LI (1935), pl. XII (II, arête lam.).
- pseudo-crassus. LXIV (1948), p. 19, fig. 4 (hab., anat.).
- (Phlegmacium) russus. LX (1944), pl. III, fig. 1.
- scaurus. LV (1939), p. 200, fig. 2 (hab., bas., sp.).
- sodagnitus. LI (1935), p. 46 (hymén.), et pl. I, fig. 1.
- (Dermocybe) spilomeus. LX (1944), pl. III, fig. 3.
- splendens. LII (1936), pl. II, fig. 1.
- striatulus. LVI (1940), p. 113, fig. 5 (hab.).
- suaveolens. LVI (1940), Atlas, pl. LXXXIII.
- subcaninus. XLIV (1928), pl. IV, fig. 7-11.
- subtortus. LI (1935), p. 193 et 195 (cyst., bas., sp.) ; pl. III, fig. 6-9.
- turbinatus. LI (1935), pl. I, fig. 3, et p. 89 (arête lam., sp.).
- torvus. L (1934), p. 230 (anat.).
- uraceus. LVI (1940), p. 91 (hab.).
- violaceus. LI (1935), pl. XII, fig. 1 (arête des lam., sp.).
Crepidotus applanatus. LIII (1937), p. 220 (hab., cyst., sp.).
- fragilis. LIII (1937), p. 217 (hab., cyst., sp.).
Crinipellis mauretanicus. XLIV (1928), pl. II, fig. 6-8, et pl. III.
Cystoderma amianthinum. LXVII (1951), p. 70, fig. 1 (spores).
- carcharias. LXVII (1951), p. 76, fig. 4 (hab., anat.).
- cinnabarinum. LXVII (1951), p. 74 (hab., revêtem., sp.).
- fallax. LXVII (1951), p. 79, fig. 5 (anat.).
- granulosum. LXVII (1951), p. 78, fig. 5 (bas., revêtem., sp.).
- ponderosum. LXVII (1951), p. 73, fig. 2 (revêtem. pil., sp.).

Deconica atrorufa. LII (1936), Atlas, pl. LXXIII.
Delicatula bagnolensis. XLII (1926), pl. IV, fig. 5-6, et p. 62, fig. 1 (bas. et sp.).
Drosophila bipellis. LXIX (1953), p. 123, fig. 3 ; p. 125, fig. 4 (cyst. et sp.) ; pl. I, fig. A à C.
Eccilia rugosa. LVIII (1942), p. 31, fig. 3 (hab.) ; p. 41, fig. 5 (anat.).
Entoloma aripoanum. LXIX (1953), p. 161, fig. 3, 172, et p. 164, fig. 5 (hab., sp.).
- bakeri. LXIX (1953), p. 161, 316 (sp.), et p. 163, fig. 3 (hab.).
- brunneostriatum. LXIX (1953), pl. II, fig. 14 ; p. 161, fig. 3, 204 (spores),
- cubensis. LXIX (1953), p. 161, fig. 3, 318 (spores).
- cyathiformis. LXIX (1953), p. 161, fig. 3, 416 (sp.), et p. 164, fig. 4 et 5 (hab., cyst.).
- metale. LXIX (1953), pl. II, fig. 1 ; p. 161, fig. 3, 108 (spores).
- naranjanum. LXIX (1953), pl. II, fig. 15.
- obscurum. LXIX (1953), pl. II, fig. 16 ; p. 161, fig. 3, 206 (spores).
- papillatum. LXIX (1953), pl. II, fig. 13 ; p. 161, fig. 2, 207 (sp.).
- sericatum. LIII (1937), p. 274 (coupes, bas., sp.).
- sericeum. LXII (1946), p. 159, fig. 15 (1, mycél., boucles).
- siparianum. LXIX (1953), p. 161, fig. 2, 286 (sp.).
- trinitensis. LXIX (1953), pl. II, fig. 7 ; p. 161, fig. 3, 82 (spores).
- tucuchensis. LXIX (1953), pl. IV, fig. 14 ; p. 161, fig. 2, 107 (sp.).
- umbilicatum. LXIX (1953), pl. II, fig. 9 ; p. 161, fig. 3, 245 (spores).
- underwoodii. LXIX (1953), pl. II, fig. 11 ; p. 161, fig. 3, 54 (spores).
Flammula abstrusa. LVIII (1942), p. 143, fig. 13 (hab., cyst., sp.).
- alnicola. L (1934), p. 182.
- aureobrunnea. LXIX (1953), pl. III, fig. 6.
- carbonaria. XLV (1929), Atlas, pl. XXXI.
- chrysopella. LXIX (1953), pl. III, fig. 5.
- croceolamellata. LIV (1938), p. 251 (arête des lames, sp.) ; pl. III.
- henningsii. LIII (1937), p. 280 (coupes, anat.).
- limulata. LVIII (1942), p. 140, fig. 11 ; p. 141, fig. 12.
- ochrochlora. L (1934), p. 182 (anat.).
Fulvidula bellula. LXIV (1948), p. 25, fig. 6 (hab., anat.).
Galera lateritia. XLIX (1933), Atlas, pl. LVI.
- mycenopsis. XLIX (1933), p. 372 (hab., anat.) ; LXV (1949), p. 157, fig. 1 ; p. 158, fig. 2 (mycél., oïdies).
- triscopa. LXIII (1947), p. 138, fig. 1 (cyst., mycél.).
Galerina clavus. LVIII (1942), p. 145, fig. 14 (hab., cyst., sp.).
- gibbosa. LII (1936), p. 141 (hab., anat.).
- pinetorum. LVI (1940), p. 53, fig. 4 (hab., anat.).
- stagnina. LXVI (1950), p. 32, fig. 1 et p. 34, fig. 2 (hab., anat.).
Galerula velenovskyi. L (1934), p. 74 (cyst., sp.).
Hiatula cepaestipes f. lilacino-granulosa. L (1934), pl. XI, fig. 1 ; p. 185, fig. 12 (bas.).
Hygrophorus croceus. XLVIII (1932), pl. XXXII, fig. 1 (photo).

Hygrophorus eburneus var. pseudodiscoideus. XLIV (1928), pl. II fig. 4-5, et pl. III, fig. 4-6 (anat.).
- foetens. XLI (1925), Atlas, pl. VI.
- hypothejus var. aureus. L (1934), pl. XII.
- lacmus. XLVI (1930), Atlas, pl. XL.
- laetus. XLV (1929), Atlas, pl. XXXVII.
- miniatus. XLIX (1933), p. 369 (hab., bas., sp.).
- poetarum. LXX (1954), Atlas, pl. CII.
- purpurascens var. cedretorum. XLIV (1928), pl. II, fig. 1-3, et pl. III, fig. 1-3 (anat.).

Hypholoma agaves. XLIV (1928), pl. V.
- cyanescens. LVIII (1942), p. 51, fig. 7 (bas., cyst., sp.) ; pl. I, fig. 2.
- dispersum. LII (1936), p. 22 (cyst., sp.).
- ericaeum. LII (1936), p. 25 (coupes, cyst., sp.).
- polytrichi. LII (1936), p. 19 (arête des lam., bas., cyst., sp.).
- subericaeum. LII (1936), p. 29 (coupes, cyst., sp.).
- sublateritium. L (1934), p. 215 (mycél.).
- sylvestre. L (1934), p. 183 (cyst., sp.), et pl. XI, fig. 3.

Inocybe acuta. XLIII (1932), p. 131 (cyst., sp.), 132, 134, 136 (anat.).
- asterospora. XLIX (1933), p. 105, fig. 46 (spores) ; p. 106, fig. 47 (cyst.).
- bresadolae. XLVIII (1932), p. 158 (spores) ; p. 160 (cyst.).
- calospora. XLVIII (1932), p. 153 (spores) ; p. 154 (cyst.).
- casimiri. XLIV (1928), p. 178 (spores et poils d'arête).
- decipiens. XLIX (1933), p. 98, fig. 42 (spores) ; p. 99, fig. 43 (cyst.).
- decipientoides. XLVIII (1932), p. 143 et 145 (cyst., sp.).
- fibrosoides. XLIX (1933), p. 92, fig. 38 et 39 (sp., cyst.).
- geophylla var. lateritia. LXVII (1952), pl. VIII ; p. 371, fig. 1 ; p. 373, fig. 2 ; p. 375, fig. 3 ; p. 376, fig. 4 ; p. 377, fig. 5 (cyst., sp.).
- globocystis. XLVIII (1932), Atlas, pl. LIV.
- globocystis f. turgens. L (1934), p. 168 (cyst., sp.) ; pl. XI, fig. 2.
- grammata. XLIX (1933), p. 102, fig. 44 (spores) ; p. 103, fig. 45 (cyst.).
- lasseri. LXIX (1953), p. 177, fig. 6 (sp.) ; pl. III, fig. 7.
- longicystis. XLIV (1928), p. 180, fig. 6 (sp.), fig. 7 (cyst.).
- mixtilis. XLIX (1933), p. 88, fig. 36 (sp.) ; p. 89, fig. 37 (cyst.).
- napipes. XLVIII (1932), p. 127 (cyst., sp.) ; Atlas, pl. LVII.
- oblectabilis. XLIX (1933), p. 112, fig. 50 (sp.) ; p. 114, fig. 51 (cyst.) ; p. 117, fig. 52 ; p. 118, fig. 53 (cyst. et sp. de formes voisines).
- ovatocystis. XLIV (1928), p. 182 et 183 (cyst., sp.).
- pachycreas. XLVII (1931), pl. VII.
- paludinella. XLIX (1933), p. 82, fig. 32 (sp.) ; p. 83, fig. 33 (cyst.).
- petiginosa. XLVIII (1932), p. 156 (sp.) ; p. 157 (cyst.).
- praetervisa. XLIX (1933), p. 94, fig. 40 (sp.) ; p. 95, fig. 41 (cyst.).
- pseudoasterospora. XLVIII (1932), p. 122, fig. 10 (sp.) ; p. 123, fig. 11 (cyst.).
- pseudohiulca. XLIX (1933), p. 107, fig. 48 (sp.) ; p. 108, fig. 49 (cyst.).
- subcarpta. XLVIII (1932), p. 138, fig. 20 (spores) ; p. 140, fig. 21 (cyst.).

Inocybe subrubens. XLVIII (1932), pl. XXXII, fig. 3-4 (photos).
- umbrina. XLVIII (1932), p. 124, fig. 12 (spores) et p. 125, fig. 13 (cyst.).
- xanthomelas. XLIX (1933), p. 86, fig. 34 (spores), et p. 87, fig. 35 (cyst.).
Lacrymaria velutina. LXII (1946), p. 159, fig. 5 (mycél., boucles).
Lentinellus castoreus. LXI (1945), p. 42, fig. 2 (coupe du carpophore).
- cochleatus. LXIII (1947), p. 139, fig. 2 (chlamydosp.).
- ursinus. LXI (1945), p. 42, fig. 2 (coupe du carpophore).
Lentinus castoreus. XLVIII (1932), pl. XXVIII, fig. 1-2 et pl. XXIX, fig. 1 (photos).
- densifolius. XLI (1925), pl. XXVIII.
- gallicus. XLV (1929), Atlas, pl. XXX.
- squamosus. XLI (1925), pl. XXVII, fig. 3 ; XLVIII (1932), pl. XXVIII, fig. 3-4 (photos).
- suavissimus. XLIX (1933), pl. XX.
- variabilis. XLIV (1928), pl. XX (cytol.) ; Atlas, pl. XXV.
Lepidella bellei. XLI (1925), pl. XXI.
- echinocephala. LXVI (1950), p. 112 (anat. des verrues).
- vittadinii. XLI (1925), pl. VII (photo).
Lepiota acutesquamosa. LII (1936), p. 189 (hab., anat.) ; p. 196, fig. 5-14 (var. furcata), et fig. 5-15 (spores).
- alba. LII (1936), p. 193, fig. 7 (2, anneau) ; p. 196, fig. 8 (32, spores).
- amianthina. LII (1936), p. 196, fig. 8 (7, spores) et fig. 8 (8, var. longispora).
- brebissonii. LII (1936), p. 197, fig. 9 (16, spores).
- badhami. XLI (1925), Atlas, pl. I.
- brunneo-incarnata. LII (1936), p. 191, fig. 6 (10, voile) ; p. 196, fig. 8 (25, spores).
- bucknalii. LII (1936), p. 196, fig. 8 (16, spores) ; Atlas, pl. LXXII, fig. II.
- carcharias (Lepiota)... LII (1936), p. 196, fig. 8 (9, spores).
- castanea. LII (1936), p. 184 et p. 197, fig. 9 (3, spores) : LIII (1937), Atlas, pl. LXXXIV, fig. II.
- citrophylla. LII (1936), p. 191, fig. 6 (7, voile) ; p. 196, fig. 8 (22, spores).
- clypeolaria. XLIII (1927), pl. VIII, fig. I (var. barbieri) ; LII (1936), p. 193, fig. 7 (1, voile) ; p. 196, fig. 8 (31, spores).
- clypeolaria var. latispora. LII(1936), p. 193, fig. 7 (4, voile) ; p. 196, fig. 8 (35, spores).
- clypeolarioides. LII (1936), p. 191, fig. 6 (18, voile) ; p. 196, fig. 8 (28, spores).
- cretini. LII (1936), Atlas, pl. LXXI, fig. I.
- cristata. LII (1936), p. 196, fig. 8 (20, spores).
- denudata. LII (1936), p. 197, fig. 9 (15, spores).
- echinacea. LII (1936), p. 189 (hab.) ; p. 196, fig. 8 (16, spores).
- echinata. LII (1936), p. 196, fig. 8 (13, spores) ; Atlas, pl. LXXII, fig. I.
- excoriata. LII (1936), p. 197, fig. 9 (12, spores), et p. 178.
- fulvella. LII (1936), p. 197, fig. 9 (2, spores) ; Atlas, pl. LXXIV,(1937) LIII.
- fusco-vinacea. LII (1936), p. 191, fig. 6 (5, anneau) ; p. 196, fig. 8 (24, spores) ; LX (1944), pl. II, fig. I.
- georginae. LII (1936), p. 197, fig. 9 (7, spores).
- grangei. LII (1936), p. 197, fig. 9 (6, spores) ; LX (1944), pl. II, fig. 3.

Lepiota granulosa. LII (1936), p. 196, fig. 8 (6, spores).
- griseovirens. LII (1936), p. 197, fig. 9 (5, spores).
- helveola. XLVII (1931), pl. III.
- hetieri. LII (1936), p. 196, fig. 8 (12, spores).
- igni-volvata. LXIV (1948), p. 6, fig. 1 (hab., anat.).
- irrorata. LII (1936), p. 196, fig. 8 (18, spores).
- laevigata. LII (1936), p. 196, fig. 8 (33, spores) ; Atlas; pl. LXXI, fig. I.
- lilacea. LII (1936), p. 196, fig. 8 (21, spores) ; p. 184 (anat.).
- mastoidea. LII (1936), p. 197, fig. 9 (10, spores) ; p. 178.
- metulaespora. LII (1936), p. 196, fig. 8 (30, spores) ; p. 184.
- naucina. LII (1936), p. 197, fig. 9 (14, spores) ; LXII (1946), p. 156, fig. 4 (2, mycél.).
- parvannulata. LII (1936), p. 191, fig. 6 (3, anneau) ; p. 196, fig. 8 (23, spores).
- procera. LII (1936), p. 197, fig. 9 (11, spores) ; LXII (1946), p. 155 (mycél.).
- pseudo-felina. LII (1936), p. 197, fig. 9 (4, spores).
- pseudo-helveola. LII (1936), p. 191, fig. 4 (anneau) ; p. 196, fig. 8 (25, spores).
- pudica var. cinereo-lilacina. XLIII (1927), pl. VII, fig. II.
- rhacodes. LII (1936), p. 178 ; p. 197, fig. 9 (13, spores).
- rubens. LII (1936), p. 191, fig. 6 (2, anneau) ; p. 197, fig. 9 (spores).
- rufipes. LII (1936), p. 196, fig. 8 (19, spores).
- seminuda. LII (1936), p. 196, fig. 8 (11, spores).
- serena. LII (1936), p. 196, fig. 8 (17, spores).
- setulosa. LII (1936), p. 191, fig. 6 (9, voile) ; LX (1944), pl. II, fig. 2.
- subalba. LII (1936), p. 197, fig. 9 (1, spores).
- subgracilis. LII (1936), p. 193, fig. 7 (3, voile) ; p. 196, fig. 8 (34, spores).
- subincarnata. LII (1936), p. 191, fig. 6 (6, anneau) ; p. 196, fig. 8 (26, spores).
- sublittoralis. LII (1936), p. 191, fig. 6 (1, voile) ; p. 197, fig. 9 (9, spores).
Leptonia dystales. XLII (1926), p. 79 (anat.) ; pl. V, fig. 2.
- fulviceps. XLVIII (1932), pl. XXXVI, fig. 4.
- rickenii. XLVIII (1932), pl. XXXVI, fig. 1-3 (type et var.).
Leucopaxillus amarus. XLIV (1928), Atlas, pl. XXIV.
Limacella delicata. LII (1936), p. 183, fig. 1 A (revêtem. pil.), et 1 B (poils arête) ; p. 196, fig. 8 (5, spores).
- furnacea. LII (1936), p. 186, fig. 4 (2, anneau) ; p. 196, fig. 8 (3, spores).
- glioderma. LII (1936), p. 183, fig. 2 (revêtem. pil.) ; p. 186, fig. 4 (3, hab.) ; p. 196, fig. 8 (4, spores).
- illinita. LII (1936), p. 196, fig. 8 (1, spores).
- lenticularis. LII (1936), p. 186, fig. 4 (1, anneau) ; p. 196, fig. 8 (2, spores).
- megalopoda. XLII (1926), Atlas, pl. XV.
Limacium gliocyclum. XLIII (1927), Atlas, pl. XX.
Lyophyllum leucophaeatum. LVIII (1942), p. 91 (coupes) ; LIX (1943), Atlas, pl. XXXVII.
Macrocystidia occidentalis. LXIX (1953), p. 178, fig. 7 (cyst., sp.) ; pl. IV, fig. 5.
Marasmius acicola. LXVIII (1952), p. 137, fig. B et C (coupe, sp.).
- brassicolens. LXVIII (1952), p. 137, fig. A (hab., sp.).
- brizarum. LXX (1954), p. 160, fig. 1 (hab., sp.).

Marasmius confluens. LXVII (1951), p. 200 (hab., anat.).
- cupricolor. LXX (1954), p. 160, fig. 2 (hab., coupe, sp.).
- cupilicola. LXX (1954), p. 160, fig. 4 (hab., sp.).
- epodius. L (1934), p. 68 (hab., anat.).
- hariolorum. LXVII (1951), p. 201 (hab., anat.).
- sulcatipes. LXX (1954), p. 160, fig. 3 (hab., coupe, sp.).
- torquescens. XLIX (1933), p. 219 (anat.), 220, 223.
- varicosus. LIII (1937), p. 272 (hab., anat.).

Melanoleuca amara. LXIV (1948), p. 145, fig. 2 (spores).
- brevipes. LXIV (1948), p. 146, fig. 10 (cyst., sp.).
- cavipes. LXIV (1948), p. 149, fig. 20 (cyst., sp.) ; pl. I, fig. 10.
- constricta. LXIV (1948), p. 145, fig. 4 (spores).
- contracta. LXIV (1948), p. 147, fig. 12 (cyst., sp.) ; pl. I, fig. 5.
- excissa. LXIV (1948), p. 146, fig. 11 (cyst., sp.) ; pl. I, fig. 3.
- grammopodia. LXIV (1948), p. 146, fig. 9 (cyst., sp.).
- humilis. LXIV (1948), p. 148, fig. 17 (cyst., sp.) ; pl. I, fig. 4.
- intervenosa. LXIV (1948), p. 148, fig. 15 (cyst., sp.) ; pl. I, fig. 6.
- leucophylla. LXIV (1948), p. 148, fig. 16 (coupe, cyst., sp.) ; pl. I, fig. 8.
- luscina. LXIV (1948), p. 145, fig. 6 ; pl. I, fig. 1.
- microcephala. LXIV (1948), p. 146, fig. 7 (coupe, cyst., sp.) ; pl. I, fig. 2.
- nigripes. LXIV (1948), p. 149, fig. 19 (cyst., sp.) ; pl. I, fig. 9.
- paradoxa. LXIV (1948), p. 145, fig. 3 (spores).
- rasilis. LXIV (1948), p. 146, fig. 8 (cyst., sp.).
- subpulverulenta. LXIV (1948), p. 147, fig. 14 (cyst., sp.).
- strictipes. LXIV (1948), p. 147, fig. 13 (cyst., sp.) ; pl. I, fig. 7.
- stridula. LXIV (1948), p. 145, fig. 5 (poils du pied, spores).
- vulgaris. LXIV (1948), p. 149, fig. 18 (cyst., sp.).

Mycena amicta. XLIX (1933), p. 346, fig. 2 (sp., cyst.).
- citrino-marginata. XLIX (1933), p. 351, fig. 3 (hab., sp., cyst.).
- crispata. LXIV (1948), p. 9, fig. 2 (hab., anat.).
- cyanorhiza. LIII (1937), p. 191 (hab., anat.).
- flavipes. LXVI (1950), Atlas, pl. XCVI, fig. B.
- flavo-alba. XLVI (1930), pl. I (fig. du haut).
- floridula. XLVI (1930), pl. I (fig. du bas).
- invisibilis. LIX (1943), p. 16, fig. 2 (hab., anat.).
- langei. XLIV (1928), pl. II, fig. 9-11, et pl. III, fig. 7-12 (anat.).
- lenta. XLIV (1928), pl. II, fig. 16-17, et pl. III, fig. 14-19.
- maura. XLIV (1928), pl. II, fig. 12-15, et pl. III, fig. 20-24 (anat.).
- osmondicola. LII (1936), Atlas, pl. LXX.
- polygramma. LXII (1946), p. 156, fig. 4-4, et p. 159, fig. 5-6 (mycél.).
- rorida. LXII (1946), p. 159 (mycél.).
- seynii. LXVI (1950), Atlas, pl. XCVI, fig. A.
- speirea. LIII (1937), p. 194 (hab., anat.).
- stylobates. XLIX (1933), p. 342, fig. 1 (développem., anat.).
- tenerrima. XLIII (1927), p. 108 (voile).
- viscosissima. LXIX (1953), p. 129 (anat.).

Mycenella kuehneri. LVI (1940), p. 62 (hab., anat.).
Naucoria amarescens. L (1934), p. 180, fig. 9 (poils et spores) ; pl. IX, fig. 2.
- bohemica. LI (1935), pl. III, fig. 1-5, et p. 198-199.
- centunculus. LVIII (1942), p. 130 (f. luxurians) ; p. 131 (var. obscura).
- christinae. XLVI (1930), Atlas, pl. XXXVIII.
- corticola. LXIX (1953), p. 185, fig. 9 A.
- cyathicola. LXIX (1953), p. 185, fig. 9 B.
- distantifolia. LXIX (1953), pl. IV, fig. 13.
- effugiens. L (1934), p. 172, fig. 4 (poils d'arête, spores).
- fulgens. LII (1937), p. 269 (coupes, anat.).
- granulosa. LVIII (1942), p. 135, fig. 8 (anat.).
- hepaticola. LXIX (1953), p. 185, fig. 9 E.
- (Phaeocollybia) lugubris. XLVI (1930), Atlas, pl. XXXIX.
- montana. LXIX (1953), p. 185, fig. 9 C.
- muricata var. gracilis. LVIII (1942), p. 133 ; p. 135, fig. 7 (poils margin., sp.).
- myosotis. LII (1936), p. 143 (hab., cyst., sp.).
- pectinata. LXIX (1953), p. 185, fig. 9 F.
- pellucida. LXIX (1953), pl. IV, fig. 7.
- pygmaea. L (1934), p. 174, fig. 5 (poils d'arête, spores) ; pl. IX, fig. 1.
- reducta. LVIII (1942), p. 132 (anat.).
- sideroides. L (1934), p. 179, fig. 8 (poils margin., sp.) ; pl. IX, fig. 3.
- sphaerospora. LXIV (1948), p. 22, fig. 5 (hab., anat.).
- spinulifer. LXIX (1953), p. 185, fig. 9 H.
- submelinoides. XLVI (1930), pl. X, fig. 7-16.
- temulenta. L (1934), p. 175, fig. 6 (poils margin., spores) ; pl. X, fig. 1 ; p. 177, fig. 7 ; pl. X, fig. 2 (f. flexuosa).
- tepitensis. LXIX (1953), p. 182, fig. 8 (anat.) ; pl. IV, fig. 6.
- umbonata. LVIII(1942), p. 137, fig. 9 (revêtem., poils margin.).
- xuchilensis. LXIX (1953), p. 185, fig. 9 D.
- yalapensis. LXIX (1953), p. 185, fig. 9 G.
Nolanea fusco-grisella. XLIX (1933), pl. XXVI, fig. 2.
- juncea var. cuspidata. LII (1936), p. 138 (hab., anat.).
- minuta. LIII (1937), p. 215 (hab., sp.).
- rhodoura. XLIX (1933), pl. XI.
- vinacea. LIII (1937), p. 277 (hab., sp.).
Nyctalis parasitica. LXIII (1947), p. 139, fig. 2 ; LXVII (1951), p. 175, fig. 1 Q (chlamydosp.).
Omphalia browni. LV (1939), p. 213 (hab., bas., sp.).
- chrysophylla. XLIV (1928), Atlas, pl. XXVIII.
- cyathella. LVII (1942), p. 106 (hab., anat.).
- discorosea. XLIX (1933), p. 279 (hab., sp.).
- fibula. LII (1936), p. 135, fig. 3 (hab., anat.).
- griseo-palida. LIV (1938), Atlas, pl. LXXX, fig. I.
- mairei. XLII (1926), pl. IV, fig. 7-11, et p. 64.
- maura. LIII (1937), p. 197 (anat.
- tubarioides. XLVI (1930), p. 219 (hab., sp.).
Panaeolus fimicola. LXVII (1951), p. 441, fig. 2 (cyst., bas., sp.).
- semi-ovatus. LXVII (1951), p. 446, fig. 4 (sp.).
- semi-ovatus f. exannulata. LXVII (1951), p. 444, fig. 3 A (spores).
- separatus. XLVIII (1932), Atlas, pl. LI et LII ; LXVII (1951), p. 439, fig. 2 (cyst.) et p. 446, fig. 4 (sp.).

Panaeolus solidipes. LXVII (1951), p. 444, fig. 3 C (sp., cyst.).
- teutonicus. LXVI (1950), p. 107 (hab., anat.) ; LXVII (1951), p. 444, fig. 3 B (cyst., sp.).

Panellus stipticus. LXI (1945), p. 40 (trame).
Pholiota aurea. LIII (1937), Atlas, pl. LXXV.
- aurivella. XLIX (1933), p. 152 et 153 (oïdies), p. 154.
- britoniae. LXIX (1953), pl. III, fig. 1.
- discolor. LXIX (1953), pl. III, fig. 2.
- heteroclita. LIV (1938), Atlas, pl. LXXVIII.
- lucifera. LXII (1946), p. 156, fig. 4-6 (mycél.) ; p. 159, fig. 5 (boucles).
- rigidipes. XLIX (1933), p. 335 (hymén., cyst., sp.).
- suberis. XLIV (1928), pl. IV, fig. 1-6.

Pleurotus applicatus. XLIX (1933), p. 362 (hab., sp.).
- auriscalpium. XLVI (1930), p. 221 (hab., anat.), et p. 222 (photo).
- geogenius. L (1934), p. 210 (sp., cytol.).
- lignatilis. LIX (1943), p. 28, fig. 5 (hab., sp.).
- mitis. XLIX (1933), p. 335 (anat.).
- mutilus. LIX (1943), p. 23, fig. 4 (hab., spores).
- nemecii. XLVIII (1932), pl. XXXIII (photos).
- ostreatus f. peregrinus. LXIII (1947), p. 73 (hab., anat.).
- petaloides. XLI (1925), Atlas, pl. V.
- pinsitus. L (1934), p. 210 (sp., cytol.).
- serotinus. XLIX (1933), p. 334 (anat.).
- silvanus. XLIX (1933), p. 362, fig. 9 C (hab., sp.).

Pluteus aethalus. LXIX (1953), pl. II, fig. 8, et fig. 5 (var. jamaicensis).
- cervinus. LII (1936), p. 103 (cyst.) ; LXII (1942), p. 172, fig. 10 (mycél.).
- cervinus var. bambusinus. LXIX (1953), p. 151, fig. 1 A (cyst.).
- cubensis. LXIX (1953), pl. II, fig. 10 ; p. 151, fig. 1 (15 a, cystides).
- fibrillosus. LXIX (1953), p. 151, fig. 1 B (cyst.).
- fuliginosus. LXIX (1953), p. 151, fig. 1 H (cyst.) ; pl. II, fig. 4.
- hispidulus var. microsporus. LXIX (1953), pl. II, fig. 2.
- jamaicensis. LXIX (1953), pl. II, fig. 5.
- harrisii. LXIX (1953), p. 151, fig. 1 G (cystide).
- laetifrons. LXIX (1953), pl. II, fig. 6.
- reticulatus. LXIX (1953), p. 151, fig. 1 E (cyst.).
- spilopus var. albostipitatus. LXIX (1953), pl. II, fig. 3 ; p. 151, fig. 1 D (cyst.).
- spinulosus. LXIX (1953), p. 151, fig. 1 F (cyst.).
- umbrosus. LIX (1943), p. 39 (hab., anat.).
- villosus. LIII (1937), Atlas, pl. XIX.

Psalliota haemorrhoidaria. LXII (1946), p. 164, fig. 6 (mycél.).
- perrara. XLVIII (1932), pl. XXVII (photo).

Psathyra barlae. LXIX (1953), p. 119, fig. 1 ; p. 120, fig. 2 (cyst. et sp.) ; pl. I, fig. D et E.
Psathyrella sphagnicola. LIII (1937), p. 283 (hab., anat.).
- sylvestre. LXIX (1953), p. 131 (anat.).

Psilocybe aleuriata. XLI (1925), pl. XXIX, fig. 5-9 ; p. 460, fig. 6.
- semilanceata. XLI (1925), Atlas, pl. VII.
- turficola. LV (1939), p. 197, fig. 1 (hab., anat.).

Pyrroglossum hepatizon. LXIX (1953), pl. III, fig. 3.
- pyrrhus. LXIX (1953), pl. III, fig. 4.

Rhodopaxillus lutetianus. XLII (1926), pl. IV, fig. 1-4, et p. 68.
Rhodophyllus aprilis. LXIII (1947), Atlas, pl. XCII.

Rhodophyllus cancrinus. LIII (1937), p. 121 (hab., sp.).
- fulviceps. XLVIII (1932), p. 322, fig. 4 b (spores), et pl. XXXVI, fig. 4.
- fusco-grisellus. XLIX (1933), p. 436 (spores) ; pl. XXXVI, fig. 2.
- hypopolius. XLVIII (1932), p. 315 (spores) ; pl. XXXV, fig. 2.
- obscurior. XLVIII (1932), pl. XXXVI, fig. 2 et fig. 3 (var. subrugosus).
- putus. XLVIII (1932), p. 322, fig. 4 c (spores) ; pl. XXXV, fig. 3.
- rhodocylix. XLVIII (1932), p. 313, fig. 2 (spores) ; pl. XXXV, fig. 1.
- rickeni. XLVIII (1932), p. 322, fig. 4 a (spores) ; pl. XXXVI, fig. 3.
- saundersi. LXVII (1951), Atlas, pl. XCVII.
- sepium. LXVI (1950), Atlas, pl. XCV.
- woodianus. XLIX (1933), p. 435 (spores) ; pl. XXVI, fig. 1.

Rhodotus palmatus. XLVIII (1932), p. 79 (anat.) ; pl. XI.
Stropharia depilata. XLV (1949), pl. I.
- ferrei. LIII (1937), p. 232.
- squamosa. XLIV (1928), Atlas, pl. XXVI.

Tephrophana palustris. LV (1939), p. 205, fig. 4 (coupes, bas., sp.).
Tricholoma atrocinereum. LIX (1943), p. 12, fig. 2 (spores) ; pl. I, fig. 1 ; LXIII (1947), p. 140, fig. 3 A (renflem. mycél.).
- aurantium. XLVIII (1932), pl. XXXII, fig. 2 (photo).
- buxeum. XLVI (1930), pl. X, fig. 1-6.
- cuneifolium. LIX (1943), p. 12, fig. 2 (revêtem. pil., sp.) ; pl. I, fig. 2.
- decorum. XLI (1925), Atlas, pl. II.
- elytroides. LXV (1949), p. 133, fig. 1 (hab.) ; p. 134, fig. 2 (revêtem. pil.).
- equestre. LXIII (1947), p. 140, fig. 3 E (renflem. mycél.).
- fucatum. XLVI (1930), Atlas, pl. XLI.
- inamaenum. LV (1939), p. 207, fig. 5 (hab., bas., sp.).
- infumatum. XLIV (1928), p. 110 (spores).
- olivascens. LIX (1943), p. 7, fig. 1 (hab., anat.).
- orirubens. LXIII (1947), p. 157, fig. 4 (renflem. mycél., cytol.).
- striatum. XLVIII (1932), pl. XXIX, fig. 2 (photo).
- sulfureum. LXIII (1947), p. 140, fig. 3 S (renflem. mycél.).
- trigonosporum. XLIV (1928), p. 110 (spores).
- ustale. LXIII (1947), p. 140, fig. 3 U (renflem. mycél.).

Volvaria bombycina var. maxima. XLVIII (1932), pl. XXX et XXXI.
- esculenta. LXIII (1947), pl. I et II (photos) ; p. 123 et 125 (sp., anat.).
- murinella. XLIII (1927), Atlas, pl. XXI.
- pseudovolvacea. LXIX (1953), pl. IV, fig. 12.

Russulacées

Lactarius badiosanguineus. LXIX (1953), p. 363, fig. 1 d (sp.) ; p. 375, fig. 5 (coupe).
- blennius. LVI (1940), pl. III, fig. 31-32 (spores).
- camphoratus. LVI (1940), pl. X, fig. 105-107, et pl. XI, fig. 108-109 (spores).
- chrysorheus. LVI (1940), pl. IV, fig. 36-37 (spores).
- controversus. LVI (1940), pl. I, fig. 7-12 (spores).

Lactarius cyathula. LVI (1940), pl. IX, fig. 88-89 (spores).
- decipiens var. lacunarum. LV (1939), Atlas, pl. XXXII.
- deliciosus. LVI (1940), pl. II (spores) fig. 13-24.
- evosmus. LXIX (1953), p. 363, fig. 1 b (sp.) ; p. 368, fig. 3 (coupes) ; p. 381, fig. 6 A (sp.).
- fuliginosus. LVI (1940), pl. VI, fig. 57-58, et pl. XII, fig. 122-123 (spores).
- glycyosmus. LVI (1940), pl. VI, fig. 64-68 (spores).
- griseus. XLIV (1928), Atlas, pl. XXVII, fig. 6-10.
- helvus. LVI (1940), pl. VI, fig. 61-63 (spores).
- hysginus. LVI (1940), pl. IV, fig. 42-44 (spores).
- iners. LXIX (1953), p. 363, fig. 1 e (sp.) ; p. 375, fig. 5 (coupe, cyst.).
- lignyotus. LVI (1940), pl. VI, fig. 59-60 (spores).
- lilacinus. LVI (1940), pl. VII, fig. 68-69 (spores).
- mairei. LV (1939), p. 36, fig. 1 (bas., cyst.) ; pl. I, fig. 1 ; LVII (1941)
- mitissimus. LVI (1940), pl. VIII, fig. 83-84 (spores) ; LVII (1941), Atlas, pl. LXXXIV.
- obnubilus. LVI (1940), pl. IX, fig. 90-91 (spores).
- pallidus. LVI (1940), pl. III, fig. 33-35 (spores).
- piperatus. LVI (1940), pl. VII, fig. 73-77 (spores).
- plumbeus. LVI (1940), pl. I, fig. 5-6 (spores).
- pyrogalus. LVI (1940), pl. IV, fig. 38-41 (spores).
- quietus. LVI (1940), pl. IX, fig. 94-96 ; pl. X, fig. 99-104 (spores) ; pl. XI, fig. 112-113 (ornement. sp.).
- representaneus. LV (1939), Atlas, pl. LXXXI.
- rubrocinctus. LXIX (1953), p. 386, fig. 7 (coupes) ; p. 387, fig. 8 (sp., cyst., poils pil.).
- rufus. LVI (1940), pl. VII, fig. 70-72 (spores).
- rugatus. LXIX (1953), p. 363, fig. 1 (f, sp.) ; p. 381, fig. 6 (F, poils pil.).
- scrobiculatus. XLVIII (1932), pl. XXIX, fig. 3 (photo) ; LVI (1940), pl. I, fig. 1-4 (spores).
- scrobipes. LXIX (1953), p. 363, fig. 1 (c, sp.) ; p. 371, fig. 4 (coupes, pied).
- serifluus. LVI (1940), pl. XI, fig. 110-112 (spores).
- spinulosus. XLIV (1928), Atlas, pl. XXVII, fig. I-5.
- subalpinus. XLIV (1928), pl. XXII.
- subdulcis. LVI (1940), pl. VIII, fig. 81-82 (spores) ; LVII (1941), Atlas, pl. LXXXV.
- tabidus. LVI (1940), pl. VIII, fig. 85-86 (spores).
- theiogalus. LVI (1940), pl. IX, fig. 32-33 (spores).
- trivialis. LVI (1940), pl. IV, fig. 45-46 (spores).
- uvidus. LVI (1940), pl. III, fig. 25-28 (spores).
- vellereus. LVI (1940), pl. V (spores).
- vietus. LVI (1940), pl. III, fig. 29-30 (spores).
- volemus. LVI (1940), pl. VIII, fig. 78-80 (spores).
- zonarioides. LXIX (1953), p. 363, fig. 1 (a, sp.) ; p. 366, fig. 2 (hab.).
- zonarius. LXIX (1953), p. 381, fig. 6 (C, sp.), (D, cyst.).

Russula adulterina. LXVII (1951), Atlas, pl. XCVIII.
- amarissima. LIX (1943), p. 65, fig. 2 (anat.).
- amoena. XLVII (1931), pl. IX et X ; XLIX (1933), p. 355, fig. 7 (sp., cyst.).
- anatina. LXII (1946), pl. I.
- aquosa. XLVIII (1932), pl. XXXIV.
- atropurpurea. XLVII (1931), pl. I et II.
- atrorubens. XLV (1929), Atlas, pl. XXXII.

Russula aurata. XLVII (1931), pl. I et II.
- badia. XLIX (1933), Atlas, pl. LVII.
- betulina. XLI (1925), p. 315 (anat.).
- chemaleontina. XLV (1929), Atlas, pl. XXXIII ; XLVII (1931), pl. V et VI.
- curtipes. LI (1935), pl. V.
- decolorans. XLVII (1931), pl. IV, fig. 5-12.
- foetens. LVI (1940), pl. XI, fig. 116 (ornement. sp.) ; LIX (1943), pl. II, fig. 1-2 (spores).
- gracillima. L (1934), Atlas, pl. LXI.
- helodes. XLV (1929), pl. VI.
- integra. XLIX (1933), Atlas, pl. LVIII ; XLV (1929), p. 280 (anat.).
- laeta. L (1934), Atlas, pl. LXII.
- laurocerasi. XLVIII (1932), pl. XXIV, fig. B ; LVI (1940), pl. XI, fig. 114, et pl. XII, fig. 118-121 (ornement. sp.) ; LIX (1943), pl. II, fig. 111 (spores).
- lilacea. L (1934), p. 221 (hyphes).
- livida. LIII (1937), Atlas, pl. LXXVI.
- lutensis. LVI (1940), p. 67 (sp., cyst.), et pl. XIII.
- luteotacta. LIII (1937), p. 203 (hab., cyst., sp.).
- mairei. LVII (1941), Atlas, pl. LXXXVI.
- meliolens. LI (1935), Atlas, pl. LXIX.
- melitodes. LIX (1943), p. 62, fig. 1 (anat.).
- mollis. LIX (1943), p. 67, fig. 3 (anat.).
- parazurea. L (1934), Atlas, pl. LIX.
- pilati. XLVIII (1932), pl. XXVI.
- pseudo-integra. XLIX (1933), p. 358 (hab., cyst., sp.) ; L (1934), p. 190, fig. 4 (cyst., poils, sp.), et p. 220.
- pseudo-violacea. XLVII (1931), p. 257 (anat.), et pl. VIII.
- puellula. LXV (1949), Atlas, pl. XCIII.
- punctata. L (1934), p. 223, fig. 3 (hyphes primord.).
- rhodella. XLVIII (1932), pl. XII.
- rosea. XLVII (1931), pl. IV, fig. 11.
- sardonia. XLIV (1928), pl. VIII.
- schiffneri. LI (1935), pl. IV.
- sclaris. LIX (1943), Atlas, pl. LXXXVIII.
- straminea. LVIII (1942), p. 45, fig. 6 (cutic., bas., sp.) ; pl. I, fig. I.
- subfoetens. XLVIII (1932), p. 201 (cyst., sp.) ; pl. XXIV, fig. A.
- venosa. L (1934), pl. IV.
- versicolor. L (1934), Atlas, pl. LX.
- veternosa. L (1934), Atlas, pl. LXII.
- violacea. L (1934), Atlas, pl. LXIII.
- xerampelina. XLIII (1927), pl. XI et XII.
- zonatula. L (1934), Atlas, pl. LXI.
- zvarae. L (1934), p. 224 (hyphes primord.) ; LIII (1937), Atlas, pl. LXXVII.

GASTEROMYCETES

Anthurus aseroiformis. LI (1935), Atlas, pl. LXVIII.
Battarraea guiccardiniana. XLV (1930, p. 48, 49, 51, 53, 55 et 57 (anat.) ; pl. II à V.
- phalloides. L (1934), p. 241 (photo).
Bovistella paludosa. LIII (1937), p. 294 (hab., capillit., sp.).

Bovistella radicata. XLII (1926), Atlas, pl. XIV ; LIII (1937), pl. V (photo).
Calvatia fragilis. XLI (1925), Atlas, pl. IX.
- utriformis. XLI (1925), Atlas, pl. X.
Dodgea occidentalis. LIV (1938), p. 199 (hab., gleba, spores).
Gastrosporium simplex. L (1934), pl. I-III.
Gautiera graveolens. LIII (1937), pl. VIII (photos).
Geaster sibiricus. LI (1935), p. 423 (photo).
Ithyphallus imperialis. LI (1935), p. 343 et 344.
- impudicus. LI (1935), p. 343 et 344 ; LXII (1946), p. 258 et 259 (anomalie).
Leucogaster nudus. LIII (1937), pl. VII (photos) ; p. 260 (spores).
Lycoperdon cruciatum. XLII (1926), Atlas, pl. XVI, II.
- hungaricum. XLI (1925), Atlas, pl. IV A.
- montanum. XLII (1926), Atlas, pl. XVI, I.
- pusillum. XLI (1925), Atlas, pl. IV B.
- umbrinum. XLII (1926), Atlas, pl. XIII.
Lysurus borealis. XLI (1925), pl. XI (photo).
Melanogaster variegatus var. broomeianus. XLVIII (1932), pl. XXIII.
Mycenastrum corium. LXVI (1950), pl. I et II (photos) ; p. 103 (anat.).
Vesse de loup hérissée. LXVIII (1952), pl. I, fig. 2 (ex Bulliard).

FUNGI IMPERFECTI (Adélomycètes)

Acicuariella foliicola. LXIX (1953), p. 301, fig. 16 P et Q.
- lasiosphaeriae. LXIX (1953), p. 301, fig. 16 M à O.
Acremoniula sarcinellae. LXIX (1953), p. 269, fig.1 V.
Acrospeira ? fusca. LXIX (1953), p. 293, fig. 12 H à L.
- ? xylogena. LXIX (1953), p. 293, fig. 12 C à G.
Acrostaphylus hypoxyli. LXIX (1953), p. 269, fig. 1 N.
Acrotheca capitata. LXIX (1953), p. 269, fig. 1 A à C.
Acrothecium ? aureum. LXIX (1953), p. 285, fig. 8 G.
- multisporum. LXIX (1953), p. 273, fig. 3 I à M.
- obovatum. LXIX (1953), p. 285, fig. 8 H.
- ? simplex. LXIX (1953), p. 285, fig. 8 L.
- tenebrosum. LXIX (1953), p. 285, fig. 8 J et K.
- zonatum. LXIX (1953), p. 285, fig. 8 I.
Aegerita torulosa. LXVII (1951), p. 175, fig. 1 O.
- sp. LXVII (1951), p. 189, fig. 4 J.
Allomyces monspeliensis. LXVIII (1952), p. 183, fig. E, F, G, H.
Alternaria brassicae. LXIII (1947), p. 60, fig. 1 ; p. 62, fig. 2 ; p. 66, fig. 5 a.
- stemphylioides. LXIII (1947), p. 65, fig. 4 ; p. 66, fig. 5 c.
- tenuis. LXIII (1947), p. 63, fig. 3 ; p. 66, fig. 5 b.
Antennopsis gallica. LXVII (1951), pl. I-IV ; p. 337, fig. 1 ; p. 338, fig. 2 ; p. 339, fig. 3 ; p. 342, fig. 4 ; p. 343, fig. 5 ; p. 345, fig. 6-7 ; p. 346, fig. 8.
Arthrinium caricicolum. LXIX (1953), p. 271, fig. 2 M, N et O.
- curvatum. LXIX (1953), p. 271, fig. 2 K et L.
- sporophlaeum. LXIX (1953), p. 271, fig. 2 G à J.
Ascochyta graminicola. LXII (1946), p. 73, fig. 1 (spores).
- velata. LXV (1949), p. 128, fig. 7 (pycnides).
Asteroma corni. XLII (1926), pl. X-XII (anat., développem.).
Asteronectrioidea heveicola. LXIV (1948), p. 177, fig. 8-9 ; p. 178, fig. 10.

Asterophora lignicola. LXVIII (1952), p. 188, fig. 2 H.
Atractina biseptata. LXIX (1953), p. 285, fig. 8 N et O.
Bainieria hyalina. LXVIII (1952), p. 188, fig. 2 G.
Bartheletia paradoxa. LXIX (1953), p. 289, fig. 10 M et N.
Basitorula ? cephalosporioides. LXIX (1953), p. 277, fig. 5 C.
- cingulata. LXIX (1953), p. 277, fig. 5 A et B.
Bispora antennata. LXIX (1953), p. 283, fig. 7 S à U.
- punctata. LXIX (1953), p. 283, fig. 7 V.
Blennoria buxi. LXIX (1953), p. 299, fig. 15 P à R.
Bloxamia truncata. LII (1936), p. 72.
Bolacotricha lignorum. LXIX (1953), p. 271, fig. 2 F.
Botryobolus parasiticus. LXVIII (1952), p. 183, fig. 1 I.
Brachydesmiella biseptata. LXIX (1953), p. 285, fig. 8 D.
Brachydesmium claviforme. LXIX (1953), p. 286, fig. 9 A.
- puccinioides. LXIX (1953), p. 285, fig. 8 B et C.
- brachyhelicoon xylogenum. LXVIII (1952), p. 211, fig. 7 U.
Brachysporium ? bicolor. LXIX (1953), p. 285, fig. 8 E.
- coryneoides. LXIX (1953), p. 285, fig. 8 F.
Camarosporium coronillae. LXV (1949), p. 99, fig. 1 A (conidies).
- incrustans. LXII (1946), p. 73, fig. 2 (conidies).
- polymorphum. LXII (1946), p. 73, fig. 3 (conidies).
Carlosia meliolae. LXIX (1953), p. 297, fig. 14 I.
Cephalosporium saprolegniae. LV (1939), p. 96, fig. 5-10.
Ceratophorum intermedium. LXIX (1953), p. 285, fig. 8 T.
Ceratosporium fasciculare. LXIX (1953), p. 295, fig. 13 A.
- strepticeras. LXIX (1953), p. 295, fig. 13 H.
Cercosperma polymorpha. LXV (1949), p. 124, fig. 3.
- subsessile. LXIX (1953), p. 289, fig. 10 A et B.
Cercospora voandzeiae. LXIX (1953), p. 289, fig. 10 I et J.
Cercosporella rhaetica. LXIV (1948), p. 122, fig. 1.
Cercosporula corticola. LXIX (1953), p. 289, fig. 10 G et H.
- crassiuscula. LXIX (1953), p. 289, fig. 10 D à F.
Chalara ampullula. LXIX (1953), p. 277, fig. 5 K.
- variospora. LXIX (1953), p. 277, fig. 5 L.
Chantransiopsis decumbens. LXVII (1951), p. 351, fig. 9 C.
- xantholini. LXVII (1951), p. 351, fig. 9 D.
Chloridiella leucopoda. LXIX (1953), m. 269, fig. 1 F et G.
Cirromyces caudiger. LXIX (1953), p. 277, fig. 5 H à J.
Cladobotryum elegans. LXIX (1953), p. 301, fig. 16 A.
Clasterosporium ? hormiscioides. LXIX (1953), p. 286, fig. 9 B.
- ?pedicellatum. LXIX (1953), p. 286, fig. 9 C.
- ? scirpicolum. LXIX (1953), p. 289, fig. 10 C.
Clonostachys cylindrospora. LXVIII (1952), p. 188, fig. 2 B et C.
- transversalis. (Voir à Monostachys).
Colletotrichum iridis. LXV (1949), p. 125, fig. 4.
Coniosporium arundinis. LXIX (1953), p. 271, fig. 2 E.
Coniothyrium chimonanthi. LXV (1949), p. 129, fig. 8 (hab.).
- concentricum. XLII (1926), p. 179, 180, 181 et 183.
Cordana ? quercina. LXIX (1953), p. 283, fig. 7 A.
- reticulata. LXIX (1953), p. 283, fig. 7 B et C.
Coryneum foliicolum. LXII (1946), p. 73, fig. 4 (conidies).
Cryptostroma corticale. LXVII (1951), p. 411, fig. 3.
Curculiospora sydowii. LXIX (1953), p. 273, fig. 3 R.
Cylindrocladium macrosporum var. hederae. LXVIII (1952), p. 202, fig. 5 A à E.
Cylindrosporium asphodeli. LXV (1949), p. 126 (acerv., conidies).
- heraclei. XLI (1925), pl. III à VI.
Cylindrotrichum longipes. LXIX (1953), p. 277, fig. 5 M.
Dactylaria sp. LXVIII (1952), p. 204, fig. 6 N, P et Q.

Dactylella sp. LXVIII (1952), p. 204, fig. 6 A à G, L et M.
Dactylina sp. LXVIII (1952), p. 204, fig. 6 K et O.
Dactylium dendroides. LXVIII (1952), p. 204, fig. 6 U.
- sp. LXVIII (1952), p. 204, fig. 6 R, S et X.
Dematium hispidulum. LXIX (1953), p. 275, fig. 4 H.
Dictyosporium elegans. LXIX (1953), p. 299, fig. 15 A à C.
Didymotrichella quercina. LXIX (1953), p. 301, fig. 16 B.
Didymotrichum chrysospermum. LXIX (1953), p. 301, fig. 16 E.
Diplocladiella scalaroides. LXIX (1953), p. 295, fig. 13 I à P.
Diplococcium ? heterosporum. LXIX (1953), p. 283, fig. 7 D.
Diplodia buxi. LXV (1949), p. 99, fig. 1 B (spores).
- profusa. LXII (1946), p. 73, fig. 7 (spores).
- rosarum. LXII (1946), p. 73, fig. 5-6 (spores).
Diplodina arenicola. LXII (1946), p. 73, fig. 8 (spores).
Diploospora coprophila. LXVIII (1952), p. 193, fig. 3 G.
Diplorhynchus triloba. LXVIII (1952), p. 211, fig. 7 V et X.
Dothiorella sisalanae. LIV (1938), p. 52, fig. 1-4.
Dyonisia capitata. LXVIII (1952), p. 211, fig. 7 K.
- coronata. LXVIII (1952), p. 211, fig. 7 L à O.
Ectostroma liriodendri. XLIV (1928), pl. VI.
Endophragmia mirabilis. LII (1936), p. 67 A (conidioph.).
Epicoccum vulgare. LXIV (1948), p. 122, fig. 2.
Eriomene simplex. LXIX (1953), p. 280, fig. 6 N à P.
Erionemella tortuosa. LXIX (1953), p. 285, fig. 8 P et Q.
Flahaultia hyalina. LXVII (1951), p. 189, fig. 4 D-E.
Fusarium decemcellulare. L (1934), p. 326, fig. 6 1.
- moniliforme. LXVII (1951), p. 119, fig. 1 F.
- ? phragmitis. LXIX (1953), p. 301, fig. 16 C et D.
Fusicladium amygdali. LXIX (1953), p. 283, fig. 7 H à K.
- aronici. XLIII (1927), pl. XV et XVI.
- dendriticum. LII (1936), p. 67 (conidioph.) ; LXIX (1953), p. 283, fig. 7 C.
- depressum. XLIII (1927), pl. XIII et XIV.
Fusidium longisporum. LXVIII (1952), p. 193, fig. 3 K et L.
Geotrichella alternata. LXIX (1953), p. 273, fig. 3 A et B.
Geotrichum cyphellae. LXVIII (1952), p. 193, fig. 3 A et B.
- purpurascens. LII (1936), p. 71.
Gliocephalis hyalina. LXVIII (1952), p. 197, fig. 4 F et G.
Gloeosporium aroniae. XLIV (1928), pl. XII et XIII (1).
- lagenarium. L (1934), p. 118 (germinat. des con.).
Goidanichia scopula. LXIX (1953), p. 280, fig. 6 S.
Gomphinaria amaena. LXIX (1953), p. 269, fig. 1 D et E.
- ? atra. LXIX (1953), p. 280, fig. 6 A et B.
Gonatobotrys ramosissima. LXVIII (1952), p. 188, fig. 2 D et E.
Gonatobotryum fuscum. LXIX (1953), p. 277, fig. 5 O.
Gonytrichum caesum. LXIX (1953), p. 271, fig. 2 D.
Graphium calciiforme. XLVI (1930), p. 243.
- eumorphum. LXVII (1951), p. 189, fig. 4 F et G.
Haplochalara enigmatica. LXIX (1953), p. 277, fig. 5 D.
Haplographium toruloides. LXIX (1953), p. 275, fig. 4 E.
Haplotrichella linkii. LXIX (1953), p. 280, fig. 6 R.
Harziella capitata. LXVIII (1952), p. 197, fig. 4 A à D.
Helicocephalum megalosporum. LXIX (1953), p. 301, fig. 16 U.
- sarcophilum. LXVIII (1952), p. 188, fig. 2 J et K.
Helicodendron lumbricoides. LXIX (1953), p. 293, fig. 12 Y.
Helicomyces ? elegans. LXIX (1953), p. 301, fig. 16 R et S.

(1) Ces deux planches portent par erreur Gloeosporium amelanchium comme légende.

Helicoon elegans. LXIX (1953), p. 291, fig. 11 E à G.
- hyalosporum. LXIX (1953), p. 291, fig. 11 A à D.
Helicosporella hyalospora. LXIX (1953), p. 293, fig. 12 N à Q.
- luteo-fusca. LXIX (1953), p. 293, fig. 12 M.
Helicosporina globulifera. LXIX (1953), p. 293, fig. 12 R à T.
Helicosporium mulleri. LXIX (1953), p. 293, fig. 12 U et V.
- vegetum. LXIX (1953), p. 293, fig. 12 X.
Heliscus versaillensis. LXVIII (1952), p. 211, fig. 7 I et J.
Helminthosporium apiculatum. LXIX (1953), p. 286, fig. 9 L et M.
- biforme. LXIX (1953), p. 286, fig. 9 E et F.
- gongotrichum. LXIX (1953), p. 286, fig. 9 K.
- ? puttemansii. LXIX (1953), p. 286, fig. 9 J.
Hendersonia arundinis. LXV (1949), p. 99, fig. 1 D.
- culmicola. LXII (1946), p. 73, fig. 10-11 (conidies).
- lathyri-latifolii. LXV (1949), p. 99, fig. 1 E (conidies).
- mollis. LXV (1949), p. 99, fig. 1 F (conidies).
- pulchella. LXII (1946), p. 73, fig. 12 ; LXV (1949), p. 99, fig. 1 G (conidies).
Heterosporium centaureae. LXII (1946), p. 73, fig. 13 (conidies).
Hirudinaria macrospora. LXIX (1953), p. 295, fig. 13 C à G.
Homostegia piggottii. XLIV (1928), pl. XI.
Jacobia conspicus. LXVII (1951), p. 189, fig. 4 A à C.
Macrophoma oleae. LXV (1949), p. 99, fig. 1 C (spores).
Macrosporium gemmivorum. LV (1939), p. 96, fig. 1-4.
Magdalaenaea monogramma. LXVIII (1952), p. 211, fig. 7 E et F.
Mariannaea elegans. LXVIII (1952), p. 188, fig. 2 A.
Marssonina graminicola. LXII (1946), p. 73, fig. 16 (spores).
Menispora caesia. LXIX (1953), p. 280, fig. 6 M.
Macrobasidium sorghi. LXIX (1953), p. 269, fig. 1 S.
Microdiplodia granulosa. LXII (1946), p. 73, fig. 14 (spores).
Microstroma juglandis. LXIV (1948), p. 122, fig. 3.
Mirandina brachyspora. LXVIII (1952), p. 215, fig. 8 F et G.
- corticola. LXVIII (1952), p. 215, fig. 8 D et E.
Moezia cylindroides. LXVIII (1952), p. 202, fig. 5 F à I.
Monacrosporium sp. LXVIII (1952), p. 204, fig. 6 H à J.
Monilia sitophila. XLVI (1930), p. 143, 145 et 146.
Monostachys transversalis. LXIX (1953), p. 277, fig. 5 E à G.
Muiaria armata. LXVII (1951) ... p. 351, fig. 9 A.
- repens. LXVII (1951), p. 351, fig. 9 B.
Myxodochium hyalinum. LXVII (1951), p. 189, fig. 4 H-I.
Myzocythium proliferum. LXVIII (1952), p. 183, fig. 1 D.
Napicladium arundinaceum. LXIX (1953), p. 285, fig. 8 R.
- tremulae. LXIX (1953), p. 285, fig. 8 S.
Oncopodiella tetraedrica. LXIX (1953), p. 295, fig. 13 Q et R.
Oospora chalaroides. LXVIII (1952), p. 193, fig. 3 H.
- lasiosphaeriae. LXVIII (1952), p. 193, fig. 3 I.
- stercorea. LXVIII (1952), p. 193, fig. 3 F.
- tholispora. LXVIII (1952), p. 193, fig. 3 E.
Ophiodendron laocooni. LXVIII (1952), p. 211, fig. 7 S et T.
Ophiopodium humiriae. LXIX (1953), p. 273, fig. 3 C et D.
Osteomorpha fragilis. LXVII (1951), p. 175, fig. 1 P.
Overeemia glomerellae. LXIX (1953), p. 273, fig. 3 N et O.
Ovularia farinosa. LXII (1946), p. 73, fig. 15 (spores).
- obliqua. LXIV (1948), p. 122, fig. 4 ; p. 134, fig. 4 bis.
- tuberculiniformis. LXVI (1950), p. 63.
Pachybasium hamatum. LXVIII (1952), p. 197, fig. 4 H.
Pachythyrium parasiticum. LXIX (1953), p. 289, fig. 10 O.
Papulaspora appendicularis. LXIV (1948), p. 214, fig. 3-4 ; p. 215, fig. 5.

Papulaspora immersa. LXIV (1948), p. 211, fig. 1 ; p. 212, fig. 2.
- pannosa. LXIV (1948), p. 218, fig. 7 ; p. 219, fig. 8 ; p. 220, fig. 9.
Passalora dactylina. LXIX (1953), p. 283, fig. 7 O et P.
- depressa. LXIX (1953), p. 283, fig. 7 L à N.
- epilobii. LXIX (1953), p. 283, fig. 7 Q et R.
Pedilospora parasitica. LXVIII (1952), p. 211, fig. 7 A.
- tricornis. LXVIII (1952), p. 211, fig. 7 B ; p. 215, fig. 8 B.
Periconia ? caespitosa. LXIX (1953), p. 275, fig. 4 F.
- ? helicotricha. LXIX (1953), p. 275, fig. 4 G.
Peyronelina glomerulata. LXVIII (1952), p. 215, fig. 8 H.
Phialophora albipes. LXIX (1953), p. 280, fig. 6 Q.
Phoma cyparissiae. LXII (1946), p. 79, fig. 17 (spores).
- euphorbiphila. LXII (1946), p. 79, fig. 18 (spores).
- herbarum. LXII (1946), p. 79, fig. 19 (spores).
- origani. LXII (1946), p. 79, fig. 20 (spores).
- siliquastri var. arabidis hirsutae. LXVIII (1952), p. 293, fig. 3 (hab.).
- subtruncata. LXII (1946), p. 79, fig. 21 (spores).
Phyllosticta daphniphylli. XLIV (1928), p. 211.
Physospora rubiginosa. LXVII (1951), p. 191, fig. 5 K.
Pilulina nigrospora. LXIX (1953), p. 269, fig. 1 U.
Pimenella castaneae. LXIX (1953), p. 280, fig. 6 C.
Piricularia caricis. LXIX (1953), p. 286, fig. 9 H et I.
Pleurocatena acicularis. LXVIII (1952), p. 193, fig. 3 J.
Pleuroplaconema punicae. L (1934), pl. VIII (photos).
Podosporium sp. L (1934), p. 322 et 323.
Polyscytalina grisea. LXIX (1953), p. 283, fig. 7 X.
Pseudobeltrania cedralae. LXIX (1953), p. 283, fig. 7 F et G.
Questieriella corni. LXIX (1953), p. 285, fig. 8 A.
- puttemansii. LXIX (1953), p. 273, fig. 3 E à H.
Raghnildiana manihotis. L (1934), p. 318, fig. 1.
Ramularia centranthi. LXIV (1948), p. 122, fig. 4.
- coccinea. XLIV (1928), pl. XVIII, fig. 1-7.
- coleosporei. LXIV (1948), p. 122, fig. 6.
- lactucae. LXIV (1948), p. 122, fig. 7.
- picridis. LXIV (1948), p. 129, fig. 8.
- plantaginea. LXII (1946), p. 79, fig. 22 (conidies).
- repentis. XLV (1929), pl. IV et V.
- veronicae-cymbalariae. XLIV (1928), pl. XVIII, fig. 8-10, et pl. XIX.
- ranunculi. LXIV (1948), p. 129, fig. 9.
- winteri. LXIV (1948), p. 129, fig. 10.
Rhacodiella castaneae. LII (1936), p. 64 et p. 67 (conidioph.).
Rhinotrichella globulifera. LXIX (1953), p. 269, fig. 1 Q.
- grisea. LXIX (1953), p. 269, fig. 1 O.
- pilulifera. LXIX (1953), p. 269, fig. 1 P.
Rhinotrichum repens. LXIX (1953), p. 269, fig. 1 R.
- stellatum. LXVIII (1952), p. 188, fig. 2 I.
Sarcinella questieri. LXIX (1953), p. 297, fig. 14 A à C.
Sclerotiomyces dissipabilis. LXIX (1953), p. 289, fig. 10 K et L.
Scolecotrichum ? roumegueri. LXIX (1953), p. 283, fig. 7 E.
Scopula hyalina. LXVIII (1953), p. 197, fig. 4 E.
Scopulariopsis fimicola. LII (1936), p. 65.
Selenosporella curvispora. LXIX (1953), p. 293, fig. 12 A et B.
Septocylindrium ? acerinum. LXIX (1953), p. 286, fig. 9 D.
- album. LXIX (1953), p. 301, fig. 16 L.
- ? major, LXIX (1953), p. 301, fig. 16 F et G.
- minor. LXIX (1953), p. 301, fig. 16 H à K.

Septoria allorgei. LXII (1946), p. 79, fig. 23 (spores).
- dauci. LV (1939), p. 119.
- sinarum. LXII (1946), p. 79, fig. 24 (spores).
Septosporium ? instipitatum. LXIX (1953), p. 299, fig. 15 D.
Spegazzinia ornata. LXIX (1953), p. 297, fig. 14 S.
Speira toruloides. LXIX (1953), p. 295, fig. 13 B.
Sphaerocybe concentrica. LXI (1945), pl. I et II.
Sphaeromyces clavisporus. LXIX (1953), p. 280, fig. 6 H et I.
Sphaeromycetella leucocephala. LXIX (1953), p. 280, fig. 6 F et G.
- macrospora. LXIX (1953), p. 280, fig. 6 D et E.
Spondylocladiella botryoides. LXIX (1953), p. 286, fig. 9 G.
Spondylocladium macrocarpum. LXIX (1953), p. 285, fig. 8 M.
Sporendocladia castaneae. LXIX (1953), p. 277, fig. 5 N.
Sporendonema roseum var. album. LXVIII (1952), p. 193, fig. 3 C et D.
Sporocephalum peniophorae. LXVIII (1952), p. 188, fig. 2 F.
Sporodesmium ? nitidum. LXIX (1953), p. 299, fig. 15 F et G.
- polymorphum. LXIX (1953), p. 299, fig. 15 E.
Stachybotrys dichroa. LXIX (1953), p. 280, fig. 6 T.
- robusta. LXIX (1953), p. 280, fig. 6 U et V.
Stachylidium bicolor. LXIX (1953), p. 280, fig. 6 L.
- ramosum. LXIX (1953), p. 280, fig. 6 J et K.
Stagonospora bromi. LXII (1946), p. 79, fig. 25 (spores).
- subseriata. LXII (1946), p. 79, fig. 26 (spores).
Steganosporium centaurae. LXII (1946), p. 38.
Stemphylium botryosum, var. botrytis. LXIII (1947), p. 69, fig. 6.
Stephanoma strigosum. LXVIII (1952), p. 211, fig. 7 G et H.
Stigmina liriodendri. XLIV (1928), pl. VII.
Tetrachia bakeri. LXIX (1953), p. 297, fig. 14 G et H.
- quadrigemminata var. denticulata. LXIX (1953), p. 297, fig. 14 F.
- quadrigemminata. LXIX (1953), p. 297, fig. 14 D et E.
Tetracium puttemansii. LXVIII (1952), p. 211, fig. 7 C.
Tetraploa aristata. LXIX (1953), p. 297, fig. 14 J et K.
Thielaviopsis basicola. LII (1936), p. 70.
Titaea ornithomorpha. LXVII (1951), p. 191, fig. 5 J (conidies).
Titaeella capnophila. LXVII (1951), p. 191, fig. 5 I.
Torula antennata. LXIX (1953), p. 275, fig. 4 C.
- graminis. LXIX (1953), p. 275, fig. 4 A.
- major. LXIX (1953), p. 275, fig. 4 D.
- ovoidea. LXIX (1953), p. 275, fig. 4 B.
Trichosporium allantosporum. LXIX (1953), p. 269, fig. 1 H.
- dryodonis. LXIX (1953), p. 269, fig. 1 K.
- macrosporum. LXIX (1953), p. 269, fig. 1 L.
- ochraceum. LXIX (1953), p. 269, fig. 1 M.
- roseum. LXIX (1953), p. 269, fig. 1 I.
- scabrum. LXIX (1953), p. 269, fig. 1 J.
Trinacrium sp. LXVIII (1952), p. 211, fig. 7 D.
Triposporium elegans. LXIX (1953), p. 297, fig. 14 L à Q.
- elegans f. dubium. LXIX (1953), p. 297, fig. 14 R.
Uncigera cordae. LXIX (1953), p. 273, fig. 3 P.
Vermicularia eryngii. XLII (1926), pl. I à III.
Verticicladium trifidum. LXIX (1953), p. 271, fig. 2 A à C.
Wakefieldia punctata. LXIX (1953), p. 299, fig. 15 N et O.
Zygosporium oscheoides. L (1934), p. 330.

LICHENS

Baeomyces roseus. LXII (1946), p. 51 et 54 (hab., anat.).
Cladonia coccifera. XLII (1926), p. 251 (podétion).
Illosporium carneum. XLI (1925), pl. VIII.
Lecidea lithophila. XLIII (1927), p. 209 (asques).
- turgida. XLIII (1927), p. 209 (asques).
Parmelia acetabulum. XLI (1925), p. 470 (anses).
Pustularia vesiculosa. XLI (1925), p. 470 (crochets ascogènes).
Xanthoria parietina. XLI (1925), pl. IX (anat.).

---oOo---

A T L A S

de la

SOCIETE MYCOLOGIQUE DE FRANCE

PLANCHES I à C

(1925 - 1954)

Depuis 1925, la Société Mycologique de France distribue des planches en couleurs représentant des champignons non figurés dans les ouvrages de vulgarisation les plus répandus et formant un Atlas pouvant leur servir de complément.

Cent planches ont été ainsi distribuées de 1925 à 1954. Bien que ces planches fassent partie intégrante du Bulletin trimestriel, elles peuvent être détachées pour être reliées en un volume séparé. Aussi le Conseil de la Société a-t-il estimé utile de publier deux tables : l'une alphabétique des champignons figurés dans les cent premières planches formant le tome I de l'Atlas, l'autre dans l'ordre même de leur parution dans les fascicules. Ces tables rendront en outre des services dans les recherches bibliographiques.

Les premières planches publiées ont été exécutées soit d'après des aquarelles possédées par la Société, comme celles de Peltereau (Bolets), soit d'après des documents prêtés par divers sociétaires (N. Patouillard, G. Malençon, etc.) ; les reproductions de ces figures ne portent que les indications mises sur les originaux (dénomination, localité, station, date de récolte, etc.), mais sans description ; on n'eut pu, en effet, qu'y joindre des diagnoses extraites d'ouvrages classiques, donc non originales.

Par contre, à partir de 1928 les aquarelles reproduites

ont été exécutées spécialement pour l'Atlas et sont le plus souvent accompagnées d'une description et d'observations faites par l'auteur de la planche d'après les spécimens mêmes qui sont figurés ; ce sont donc des documents originaux, qui ont été imprimés sur un feuillet annexé à la planche, sauf dans le cas où l'espèce a été décrite dans un fascicule du Bulletin trimestriel paru à une époque rapprochée de la distribution de la planche.

La table alphabétique comprend les indications suivantes :

I - Nom du Champignon tel qu'il figure sur la planche.
II - Numéro d'ordre de la planche.
III - Nom de l'auteur de la planche.
IV - Tome et fascicule du Bulletin où la planche a été insérée.

Le signe + précédant le nom du Champignon indique que la planche est accompagnée d'un feuillet avec description et observations.

La table dans l'ordre des parutions comprend :

I - Numéro d'ordre de la planche.
II - Nom du Champignon tel qu'il figure sur la planche.
III - Tome, année et fascicule du Bulletin où la planche a été insérée.

A. Maublanc.

Champignons	N° de la planche	Auteurs	Tomes et fascicules
Agaricus rubellus (Dill.) Sacc.	XXII	S. Decary	XLIII (1927),f. 2.
+Amanita eliae Quél.	XLVI	G. Malençon	XLVI (1930), f. 1.
- umbrinolutea Secret.	XXIX	R. Heim	XLV (1929), f. 1.
Anthurus aseroiformis McAlp.	LXVIII	Demange	LI (1935), f. 3-4.
Boletus dupainii Boud.	XLIV	Peltereau	XLVII (1931), f. 2.
- fragrans Vitt.	XLV	Peltereau	XLVII (1931), f. 2.
- impolitus Fr.	XLVI	Peltereau	XLVII (1931), f. 3-4.
+ - lupinus Fr. ss. Bres. ..	XC	H. Romagnesi	LXIV (1948), f. 3-4.
- purpureus Fr.	XII	Peltereau	XLII (1926), f. 1-2.
+ - queletii Schulz.	XI	Peltereau	XLII (1926), f. 1-2.
- -	LXVI	L. Imler	LI (1935), f. 2.
- -	LXVII	L. Imler	LI (1935), f. 2.
- regius Krombh.	XVII(1)	Peltereau	XLII (1926), f. 3-4.

(1) La planche XVII (Boletus regius type) porte par erreur le n° XVIII, en sorte que deux planches (Boletus regius type et la variété torosus) portent le même numéro.

Champignons	N° de la planche	Auteurs	Tomes et fascicules
Boletus regius f. torosus ss. Pelt.	XVIII	Peltereau	XLII (1926), f. 3-4.
- subtomentosus Fr. var. lanatus Rost.	XLII A	Peltereau	XLVII (1931), f. 1.
- subtomentosus Fr. var. Leguei Boud.	XLIII	Peltereau	XLVII (1931), f. 1.
- subtomentosus Fr. var. spadiceus Sch. .	XLII B	Peltereau	XLVII (1931), f. 1.
+ - tridentinus Bres.	LXXXIX	Margaine	LXIII (1947), f. 3-4.
+ - viscidus (Fr.) Quél.	XCI	Margaine	LXV (1949), f. 3-4.
Bovistella radicata Mont.	XIV	N. Patouillard	XLII (1926), f. 1-2.
Calvatia fragilis Vitt.	IX	N. Patouillard	XLI (1925), f. 3.
- utriformis Bull.	X	N. Patouillard	XLI (1925), f. 3.
Clavaria fistulosa Holm.	VIII	G. Malençon	XLI (1925), f. 3.
- pallida Schaeff.	III	G. Malençon	XLI (1925), f. 1.
+Clitocybe gallinacea Scop. ...	LXIV	R. Kühner	L (1934), f. 2.
+ - tabescens Scop.	LV	R. Kühner	XLIX (1933), f. 1.
+Collybia tylicolor Fr.	LXXX B	L. Imler	LIV (1938), f. 3-4.
Coprinus insignis Peck.	XXIII	R. Kühner	XLIV (1928), f. 1.
+Cortinarius depressus Fr. .	LXXXIX	L. Dentin	LIV (1938), f. 3-4.
+ - suaveolens Bat. et Joachim ..	LXXXIII	S. Decary et L. Joachim	LVI (1940), f. 3-4.
+Deconica atrorufa Fr. ex Sch. .	LXXIII	L. Imler	LII (1936), f. 4.
Flammula carbonaria Fr.	XXXI	G. Malençon	XLV (1929), f. 1.
+Galera (Conocybe) lateritia Fr.	LVI	R. Kühner	XLIX (1933), f. 1.
+Gyrodon lividus (Bull.) Opat.	XCIV	F. Margaine	LXVI (1950), f. 4.
Hygrophorus foetens Phill. ..	VI	R. Heim	XLI (1925), f. 2.
+ - lacmus Fr. ex Schum.	XL	R. Heim	XLVI (1930), f. 4.
- laetus (Pers.) Fr.	XXXVII	G. Malençon	XLV (1929), f. 4.
+Inocybe globocystis Velen. ..	LIV	L. Imler	XLVIII (1932), f. 3-4.
+ - napipes Lange .	LIII	L. Imler	XLVIII (1932), f. 3-4.

Champignons	N° de la planche	Auteurs	Tomes et fascicules
Lactarius decipiens Quél. var. lacunarum Romagn.	LXXXII	H. Romagnesi	LV (1939), f. 2.
- griseus Peck. .	XXVII B	R. Kühner	XLIV (1928), f. 3.
+ - mitissimus Fr.	LXXXIV	H. Romagnesi	LVII (1941), f. 1-4.
+ - representaneus Britz.	LXXXI	J. Favre	LV (1939), f. 1.
- spinulosus Quél.	XXVII A	R. Kühner	XLIV (1928), f. 3.
+ - subdulcis Fr. ss. Quél. ...	LXXXV	H. Romagnesi	LVII (1941), f. 1-4.
Lentinus gallicus Quél.	XXX	G. Malençon	XLV (1929), f. 1.
+ - variabilis Schulz.	XXV	R. Kühner	XLIV (1928), f. 2.
Lepiota badhami Berk. et Br. .	I	N. Patouillard	XLI (1925), f. 1.
+ -bucknalii Berk. et Br.	LXXII B	R. Kühner	LII (1936), f. 4.
+ - castanea Quél.	LXXIV B	R. Kühner	LIII (1937), f. 1.
+ - cretini Bat. .	LXXI B	P. Cretin	LII (1936), f. 2.
+ - echinata Roth.	LXXII A	R. Kühner	LII (1936), f. 4.
+ - fulvella	LXXIV A	R. Kühner	LIII (1937), f. 1.
+ - laevigata	LXXI A	R. Kühner	LII (1936), f. 2.
Leucopaxillus amarus Fr.	XXIV	R. Kühner	XLIV (1928), f. 1.
+Leucoporus brumalis (Pers.) Quél.	LXV	L. Imler	L (1934), f. 3-4.
+ - forquignoni Quél.	XXXIV	G. Malençon	XLV (1929), f. 2.
Limacella megalopoda (Bres.) R.Maire	XV	Ct Lignier	XLII (1926), f. 3-4.
- gliocyclum Fr.	XX	D. Gilbert	XLIII (1927), f. 1.
Lycoperdon cruciatum Rost. ...	XVI B	N. Patouillard	XLII (1926), f. 3-4.
- ungaricum Holtos	IV A	N. Patouillard	XLI (1925), f. 1.
- montanum Quél.	XVI A	N. Patouillard	XLII (1926), f. 3-4.
- pusillum Batsch	IV B	N. Patouillard	XLI (1925), f. 1.
- umbrinum Pers.	XIII	N. Patouillard	XLII (1926), f. 1-2.
+Lyophyllum leucophaetum Karst.	LXXXVII	L. Imler	LIX (1943), f. 1-4.
+Mycena flavipes Quél.	XCVI B	R. Heim	LXVI (1950), f. 4.
+ - osmundicola Lange	LXX	L. Imler	LII (1936), f. 2.
+ - seynii Quél. .	XCVI A	R. Heim	LXVI (1950), f. 4.
+ Naucoria (Phaeocollybia) christinae Fr.	XXXVIII	R. Heim	XLVI (1930), f. 3-4.
- lugubris	XXXIX	R. Heim	XLVI (1930), f. 3-4.

Champignons	N° de la planche	Auteurs	Tomes et fascicules
Omphalia chrysophylla Fr. ...	XXVIII	R. Kühner	XLIV (1938), f. 3-4.
+ - griseo-pallida Desm.	LXXX A	L. Imler	LIV (1938), f. 3-4.
+Panaeolus separatus Fr. ex Lin.	LI - LII	L. Imler	XLVIII (1932), f. 3-4.
+Pholiota aurea Fr.	LXXV	P. Heinemann	LIII (1937), f. 1-2.
+ - heteroclita Fr.	LXXVIII	L. Dentin	LIV (1938), f. 2.
Pleurotus petaloides (Bull.) ..	V	R. Heim	XLI (1925), f. 2.
Pluteus villosus (Bull.)	XIX	Mlle Decary	XLIII (1927), f. 1.
Psilocybe semilanceata Fr. ...	VII	G. Malençon	XLI (1925), f. 3.
Rhodophyllus aprilis Romagn. .	XCII	H. Romagnesi	LXV (1949), f. 3-4.
- saundersii Romagn.	XCVII	H. Romagnesi	LXVII (1951), f. 3-4.
+Russula adulterina	XCVIII	Girard et Heinemann	LXVII (1951), f. 4.
+ - atrorubens	XXXII	G. Malençon	XLV (1929), f. 3.
+ - badia Quél. ..	LVII	L. Joachim et V. Melzer	XLIX (1933), f. 2.
+ - chameleontina Fr.	XXXIII	G. Malençon	XLV (1929), f. 2.
+ - gracillima Schaeff.	LXI B	J. Schaeffer	L (1934), f. 1-2.
- integra Fr. ..	LVIII	L. Joachim	XLIX (1933), f. 2.
+ - laeta Möll. et Schaeff.	LXII B	J. Schaeffer	L (1934), f. 1-2.
+ - livida Pers. .	LXXVI	H. Romagnesi et Mme Le Gal	LIII (1937), f. 3-4.
+ - mairei Sing. .	LXXXVI	H. Romagnesi	LVII (1941), f. 1-4.
+ - meliolens Quél.	LXIX	H. Romagnesi	LI (1935), f. 3-4.
+ - parazurea Schaef.	LIX	J. Schaeffer	L (1934), f. 1.
+ - puellula Möll. et Sch.	XCIII	R. Girard et Heinemann	LXV (1949), f. 3-4.
+ - solaris F. Winge	LXXXVIII	H. Romagnesi	LIX (1943), f. 1-4.
+ - versicolor J. Schaef.	LX	J. Schaeffer	L (1934), f. 1.
+ - veternosa Fr. ss. Cooke	LXII A	J. Schaeffer	L (1934), f. 2.
+ - violacea Quél.	LXIII	L. Joachim	L (1934), f. 3-4.
+ - zonatula Ebb. et Sch.	LXI A	J. Schaeffer	L (1934), f. 1-2.
+ - zvarae Velen. .	LXXXVII	Mme Le Gal	LIII (1937), f. 3-4.
+Sarcodon abietum Heim	XCIX	R. Heim	LXVII (1951), f. 3-4.
Stropharia squamosa (Pers.) Fr.	XXVI	R. Kühner	XLIV (1928), f. 2.

Champignons	N° de la planche	Auteurs	Tomes et fascicules
Tricholoma decorum Fr.	II	G. Malençon	XLI (1925), f. 2.
+ - fucatum Fr. ..	XLI	L. Joachim	XLVI (1930), f. 3-4.
+Volvaria murinella Quél. (1) ...	XXI	E. Gilbert	XLIII (1927), f. 2.
+Wynnea atrofusca (Back) Heim ..	XXXV	R. Heim	XLV (1929), f. 3.
Xanthochrous cuticularis (Bull.) Pàt.	XLVII	L. Joachim	XLVII (1931), f. 3-4.
+Xerocomus tumidus Fr.	C	L. Imler	LXX (1954), f. 1.

MYXOMYCETES (Photographies)

Ceratiomyxa arbuscula	XLIX B	Mangenot	XLVIII (1932), f. 2.
Comatricha typhoides Rost. ..	XLVIII	Mangenot	XLVIII (1932), f. 2.
Hemitrichia clavata Rost. ...	XLVIII	Mangenot	XLVIII (1932), f. 2.
- serpula Rost.	L	Mangenot	XLVIII (1932), f. 2.
- vesparium Macb.	XLIX A	Mangenot	XLVIII (1932), f. 2.

(1) L'explication de la planche XXI a été jointe au fasc. 1, tome XLVI (1930).

Classement chronologique

1. Lepiota badhami	T. XLI	1925	fasc. 1
2. Tricholoma decorum	-	-	-
3. Clavaria pallida	-	-	-
4. Lycoperdon ungarium	-	-	-
5. Pleurotus petaloides	-	-	fasc. 2
6. Hygrophorus foetens	-	-	-
7. Psilocybe semilanceata	-	-	fasc. 3
8. Clavaria fistulosa	-	-	-
9. Calvatia fragilis	-	-	-
10. Calvatia utriformis	-	-	-
11. Boletus queletii	T. XLII	1926	fasc. 1-2.
12. Boletus purpureus	-	-	-
13. Lycoperdon umbrinum	-	-	-
14. Bovistella radicata	-	-	-
15. Limacella megalopoda	-	-	Fasc. 3-4
16. Lycoperdon montanum et cruciatum	-	-	-

17. Boletus regius	T. XLII	1926	fasc.	3-4
18. Boletus regius f.torosus.....	-	-	-	
19. Pluteus villosus	T. XLIII	1927	fasc.	1
20. Limacella gliocyclum	-	-	-	
21. Volvaria murinella	-	-	fasc.	2
22. Agaricus rubellus	-	-	-	
23. Coprinus insignis	T. XLIV	1928	fasc.	1
24. Leucopaxillus amarus	-	-	-	
25. Lentinus variabilis	-	-	fasc.	2
26. Stropharia squamosa	-	-	-	
27. Lactarius spinulosus et griseus	-	-	fasc.	3
28. Omphalia chrysophylla	-	-	fasc.	4
29. Amanita umbrinolutea	T. XLV	1929	fasc.	1
30. Lentinus gallicus	-	-	-	
31. Flammula carbonaria	-	-	-	
32. Russula atrorubens	-	-	fasc.	3
33. Russula chamaelontina	-	-	fasc.	2
34. Leucoporus forquignoni	-	-	-	
35. Wynnea atrofusca	-	-	fasc.	3
36. Amanita eliae	T. XLVI	1930	fasc.	1
37. Hygrophorus laetus	T. XLV	1929	fasc.	4
38. Naucoria christinae	T. XLVI	1930	fasc.	3-4
39. Naucoria lugubris	-	-	-	
40. Hygrophorus lacmus	-	-	-	
41. Tricholoma fucatum	-	-	-	
42. Boletus subtomentosus	T. XLVII	1931	fasc.	1
43. Boletus subtomentosus var. Leguei	-	-	-	
44. Boletus dupainii	-	-	fasc.	2
45. Boletus fragrans	-	-	-	
46. Boletus impolitus	-	-	fasc.	3-4
47. Xanthochrous cuticularis	-	-	-	
48. Hemitrichia clavata, etc.	T. XLVIII	1932	fasc.	2
49. Hemitrichia vesparium, etc. ...	-	-	-	
50. Hemitrichia serpula	-	-	-	
51. Panaeolus separatus	-	-	fasc.	3-4
52. Panaeolus separatus	-	-	-	
53. Inocybe napipes	-	-	-	
54. Inocybe globocystis	-	-	-	
55. Clitocybe tabescens	T. XLIX	1933	fasc.	1
56. Galera lateritia	-	-	-	
57. Russula badia	-	-	fasc.	2
58. Russula integra	-	-	-	
59. Russula parazurea	T. L	1934	fasc.	1
60. Russula versicolor	-	-	-	
61. Russula zonatula et gracillima.	-	-	fasc.	2
62. Russula veternosa et laeta	-	-	-	
63. Russula violacea	-	-	fasc.	3-4
64. Clitocybe gallinacea	-	-	-	
65. Leucoporus brumalis	-	-	-	
66. Boletus queletii	T. LI	1935	fasc.	2
67. Boletus queletii	-	-	-	
68. Anthurus aseriformis	-	-	fasc.	3-4
69. Russula melliolens	-	-	-	
70. Mycena osmundicola	T. LII	1936	fasc.	2
71. Lepiota laevigata et cretini ..	-	-	-	
72. Lepiota echinata et bucknalli .	-	-	fasc.	4
73. Deconica atrorufa	-	-	-	
74. Lepiota fulvella et castanea ..	T. LIII	1937	fasc.	1

75. Pholiota aurea	T. LIII	1937	fasc.	2
76. Russula livida	-	-	fasc.	3-4
77. Russula zvarae	-	-	-	
78. Pholiota heterochita	T. LIV	1938	fasc.	2
79. Cortinarius depressus	-	-	fasc.	3-4
80. Omphalia griseopallida et Collybia tylicolor	-	-	-	
81. Lactarius representaeus	T. LV	1939	fasc.	1
82. Lactarius decipiens	-	-	fasc.	2
83. Cortinarius suaveolens	T. LVI	1940	fasc.	3-4
84. Lactarius mitissimus	T. LVII	1941	fasc.	1-4
85. Lactarius subdulcis	-	-	-	
86. Russula mairei	-	-	-	
87. Lyophyllum leucophaetum	T. LIX	1943	fasc.	1-4
88. Russula solaris	-	-	-	
89. Ixocomus tridentinus	T. LXIII	1947	fasc.	3-4
90. Boletus lupinus	T. LXIV	1948	fasc.	3-4
91. Boletus viscidus	T. LXV	1949	fasc.	3-4
92. Rhodophyllus aprilis	-	-	-	
93. Russula puellula	-	-	-	
94. Gyrodon lividus	T. LXVI	1950	fasc.	4
95. Rhodophyllus sepium	T. LXVI	-	-	
96. Mycena seynii et flavipes	-	-	-	
97. Rhodophyllus saundersii	T. LXVII	1951	fasc.	4
98. Russula adulterina	-	-	-	
99. Sarcodon abietum	-	-	-	
100. Xerocomus tumidus	T. LXX	1954	fasc.	1

TABLE DES SYNONYMIES

ET DES

COMBINAISONS NOUVELLES

du Tome XLI (1925) au Tome LXX (1954)

---oOo---

MYXOMYCETES

ENDOSPOREES

I. Amaurosporales calcariées.

Badhamia capsulifera (Bull.) Berk. = Badhamia hyalina (Pers.), Berk. (M. Maury), 1931, 164.
Badhamia panicea (Rost.) = Arcyria cinerea (Fr.) (M. Maury), 1931, 164.
Chondrioderma floriforme (Bull.) Rost. = Diderma floriforme (Fr.) (M. Maury), 1931, 162.
Chondrioderma globosum (Rost.) = Diderma globosum (Fr.) (M. Maury), 1931, 162.
Chondrioderma hemisphaericum (Bull.) Torrend. = Didymium hemisphaericum (Bull.) Macbr. (M. Maury), 1931, 162.
Chondrioderma spumarioides (Rost.) = Carcerina spumarioides (Fr.) (M. Maury), 1931, 162.
Chondrioderma trevelyani (Rost.) = Diderma trevelyani (Fr.) (M. Maury), 1931, 162.
Diderma chondrioderma List. = Diderma arboreum List. et Petch (S. Buchet), 1940, 130.
Diderma luteo-album (Physarum List.) (S. Buchet), 1940, 127.
Didymium clavum (Rost.) = Didymium hemisphaericum (Bull.) (M. Maury), 1931, 162.
Didymium farinaceum (Schrad.) = Didymium melanospermum (Macbr.) (M. Maury), 1931, 162.
Fuligo septica (L.) Gomel = Fuligo ovata (Macbr.) (M. Maury), 1931, 164.
Physarum contextum (Pers.) = Diderma contextum Fr. (M. Maury), 1931, 163.
Physarum diderma Rost. = Physarum testaceum Sturgis. (F.X. Skupienski), 1926, 150.
Physarum notabile (Macbr.) = Physarum connatum Lister. (F.X. Skupienski), 1926, 154.
Physarum nutans Pers. = Tilmadoche alba Macbr. (M. Maury), 1931, 163.
Physarum nutans var. leucophaeum Fr. = Physarum albipes (Fr.) De Bary, 1931, 163.
Physarum sinuosum (Bull.) Weim. = Physarum bivalve Pers. - Angioridium sinuosum Bull. (M. Maury), 1931, 163.
Spumaria alba (Bull.) D.C. = Mucilago spongiosa Morgan (M. Maury), 1931, 161 ; (S. Buchet), 1939, 224.

II. Amaurosporales acalcariées.

Amaurochaete fuliginosa Macb. = Amaurochaete atra Rost. (M. Maury), 1931, 160.
Comatrichia typhina (Wig.) Pers. = Comatrichia stemonitis Macbr. et Comatrichia typhoides Bull. (M. Maury), 1931, 161.
Diachaea leucopoda Rost. = Diachaea elegans Fr. (S. Buchet), 1939, 224.
Lamproderma physaroides Rost. = Stemonitis physaroides A. et S. (M. Maury), 1931, 160.
Lamproderma columbinum Pers. = Physarum columbinum Pers. (M. Maury), 1931, 161.
Stemonitis fusca (Roth.) Rost. = Stemonitis dictyospora Rost. (M. Maury), 1931, 161.

III. Lamprosporales.

Arcyria nutans (Bull.) Gréville = Arcyria flava Pers. (S. Buchet), 1939, 225.
Arcyria punicea Pers. = Arcyria denudata Macbr. (M. Maury), 1931, 159 ; (S. Buchet), 1939, 225.
Cribaria aurantiaca = Cribaria vulgaris Schrad. (M. Maury), 1931, 158.
Dictydaethalium plumbeum Rost. = Lycogala lenticulare Dur. et Fr. (M. Maury), 1931, 158.
Dictydium cancellatum Macbr. = Dictydium umbilicatum Schrad. (M. Maury), 1931, 158.
Dictyostelium mucroides = Guttulina rosea Cienkowski (P.E. Pinoy), 1950, 37.
Hemitrichia vesparium (Batsch.) Macbr. = Hemitrichia rubiformis Pers. Rost. (M. Maury), 1931, 159 ; (S. Buchet), 1939, 224.
Lycogala epidendron (Fr.) Buxb. = Lycogala miniatum Pas. (M. Maury), 1931, 158 ; (S. Buchet), 1939, 224.
Perichaena corticalis Rost. = Perichaena populina Fr. (S. Buchet), 1940, 129.
Reticularia lycoperdon Bull. = Reticularia umbrina Fr. (M. Maury), 1931, 160.
Trichia botrytis Pers. = Trichia fragilis (Sow.) Rost. (M. Maury), 1931, 160.
Trichia fallax Pers. = Trichia decipiens Pers. (M. Maury), 1931, 160 ; (S. Buchet), 1940, 129.
Trichia favoginea Pers. = Trichia chrysosperma D.C. (M. Maury), 1931, 159.
Tubifera ferruginosa Macbr. = Tubulina fragiformis Pers. (M. Maury), 1931, 158 ; (S. Buchet), 1939, 224, et 1940, 128.

PHYCOMYCETES ou SIPHOMYCETES

Bremia lactucae Regel = Peronospora gangliformis (Berk.) De Bary (M. Maury), 1931, 169.
Cunninghamella echinulata Thaxt. = Cunninghamella africana Matr., Cunninghamella echinata Pispeck, Cunninghamella verticillata Paine., Muratella elegans Bain et Sart., Oedocephalum echi-

nulatum Thaxt. (Mme Nicot-Toulouse), 1950, 22.
Cunninghamella bainieri Naum. = Muratella elegans Bain et Sart. (Mme Nicot-Toulouse), 1950, 25.
Cunninghamella elegans Lendner = Cunninghamella verticillata Paine (Mme Nicot-Toulouse), 1950, 25, 26.
Cystopus bliti (Biv. Bern.) Lév. = Uredo bliti Biv. Bern. (Dr T. Rayss), 1933, 382.
Cystopus candidus (Gmel.) Lév. = Aecidium candidum Gmel. 1933, 382.
Cystopus tragopogonis (Pers.) Schroeter = Cystopus cubicus (Strauss) Lév. (M. Maury), 1931, 168.
Gonapodya Fischer = Monoblepharis Cornu.(K. Cejp.), 1946, 252.
Gonapodya prolifera (Cornu.) Fischer = Monoblepharis prolifera Cornu, Gonapodya siliquaeformis (Reinsch.) Thaxter, Saprolegnia siliquaeformis Reinsch. (K. Cejp), 1946, 252.
Peronospora alsinearum (Caspary) Sacc. = Peronospora scleranthi Rabenh. (M. Maury), 1931, 169.
Peronospora arborescens De Bary = Peronospora papaveris Tul. (M. Maury), 1931, 170.
Peronospora candida Fuck. = Peronospora anagallidis Schroeter (M. Maury), 1931, 170.
Peronospora effusa (Grév.) De Bary = Peronospora chenopodii (Schlecht.) Caspary (M. Maury), 1931, 171.
Peronospora lamii Braun. = Peronospora calaminthae Fuck. (M. Maury), 1931, 171.
Peronospora parasitica (Pers.) Tul. = Peronospora crispula Fuck. (M. Maury), 1931, 170.
Plasmopara angelicae Casp. = Peronospora umbelliferarum var. angelicae Casp. (Dr T. Rayss), 1933, 383.
Plasmopara densa Schroeter = Peronospora densa Rabenh. (M. Maury), 1931, 169.
Plasmopara nivea (Unger) De Bary = Peronospora umbelliferarum (Caspary) Karst. (M. Maury), 1931, 168.
Plasmopara nivea (Unger) Schroeter = Botrytis nivea Unger (Dr T. Rayss), 1933, 383.
Plasmopara viticola Berk. et Curt. = Botrytis viticola Berk. et Curt. (Dr T. Rayss), 1933, 384.
Sclerospora graminicola Sacc. = Peronospora setariae Pers. (M. Maury), 1931, 168.

ASCOMYCETES

LEVURES

Petasospora chambardi (Saccharomyces Ram. et Boid.) (J. Boidin et F. Abadie), 1954, 366.
Petasospora pastori (Zygosaccharomyces Guilliermond) (J. Boidin et F. Abadie), 1954, 365.
Petasospora pini (Zygosaccharomyces Holst.) (J. Boidin et F. Abadie), 1954, 366.
Petasospora rhodanensis (Saccharomyces Ram. et Boid.) (J. Boidin et F. Abadie), 1954, 365.

Petasospora strasburgensis (Saccharomyces Ram. et Boid.) (J. Boidin et F. Abadie), 1954, 366.

PYRENOMYCETES, SPHERIALES, ERYSIPHALES, EXOASCALES

Anixia (genre) Hoffmann = Mycogala (genre) Rostaf. (G. Arnaud), 1952, 214.
Bertia moriformis (Tode) de Not. = Sphaeria moriformis Tode, Sphaeria claviformis Sow., Sphaeria rubiformis Sow., Sphaeria rugosa Grev. (M. Luc), 1952, 154.
Catharinia constricta(Bres.) Berl. = Capronia constricta Berlese (P. Martens), 1936, 392.
Coleroa andromedae Rehm. = Trichosphaeria andromedae Rehm. (Dr T. Rayss), 1933, 397.
Coleroa chaetonium Kunze = Dothidea chaetonium Kunze (Dr T. Rayss), 1933, 398.
Coronophora angustata Fuck. = Calosphaeria verrucosa Tul. (P. Martens), 1936, 394.
Diatrypella quercina (Pers.) Nits. = Diatrype quercina Tul. (P. Martens), 1936, 394.
Dothidella trifolii Bayliss-Elliot = Phyllachora trifolii Fuck., Polythrincium trifolii Kunze (Dr T. Rayss), 1946, 19.
Erysiphe communis Wallr. = Alphitomorpha communis Wallr. (Dr T. Rayss), 1933, 395.
Erysiphe compositarum Fr. = Erysiphe cichoracearum D.C. (R. Maire), 1930, 232.
Erysiphe nitida Wallr. = Alphitomorpha nitida Wallr. (Dr T. Rayss), 1933, 394.
Exoascus alni incanae Magn. = Exoascus alnitorquus Sadebeck. (Dr T. Rayss), 1933, 396.
Gnomoniella tubiformis Tode = Sphaeria tubaeformis Tode (Dr T. Rayss), 1933, 398.
Gnomoniella tubiformis Tode Sacc. = Leptothyrium alneum Sacc., Gloeosporium cylindrospermum Sacc. (Dr T. Rayss), 1946, 22.
Hypocreopsis lichenoides Tode = Hypocreopsis riccioidea Bolton, Hypocreopsis parmelioides Montagne (R. Heim), 1952, 363.
Hypomyces aurantius (Pers.) Tul. = Diplocladium minus Bon. (R. Delécluse), 1937, 142.
Leptosphaeria littoralis Sacc. = Leptosphaeria ammophilae Rehm. (A.L. Guyot), 1946, 81.
Leptosphaeria niessleana Rabh. = Leptosphaeria bupleuri Syd., Leptosphaeria cephalariae-uralensis Naoumow, Leptosphaeria foeniculacea Fabre, Leptosphaeria lasiosphérioides Starbäck, Leptosphaeria lathyrina Sacc., Leptosphaeria longchampsi Sacc., Leptosphaeria montana Trav., Leptosphaeria orchidearum Karst., Leptosphaeria oreophila Sacc., Leptosphaeria oreophiloides Sacc. et Penz., Leptosphaeria oreophiloides var. scrofulariae Karst., Leptosphaeria penicillus Sacc., Leptosphaeria primulina Allesch., Leptosphaeria quadriseptata Trail., Leptosphaeria spectabilis Niessl. (A.L. Guyot, M. Massenot et J. Montegut), 1948, 114.
Lophodermium pinastri Schrad. = Hysterium pinastri Schrad. (Dr T. Rayss), 1933, 398.
Microsphaera grossulariae Wallr. = Alphitomorpha penicillata var. grossulariae Wallr. (Dr T. Rayss), 1933, 393.

Microsphaera abbreviata Peck. = Microsphaera alni var. quercina Neger. (Dr T. Rayss), 1933, 393.
Microsphaera hedvigii Lév. = Microsphaera alni D.C. (Dr T. Rayss), 1933, 393.
Mycosphaerella chelidonii Fautre et Lamb. = Leptosphaeria chelidonii Fautre (A.L. Guyot), 1946, 82.
Mycosphaerella punctiformis Pers. = Sphaerella punctiformis Pers. Sacc. (Dr T. Rayss), 1946, 20.
Pachythyrium parasiticum (H. Fabre) Fitzpatriek = Bertia parasitica H. Fabre, Trichothyrium epimyces Th., etc. (G. Arnaud), 1953, 302.
Phyllachora graminis (Pers.) Fuck. = Sphaeria graminis Pers. (Dr T. Rayss), 1933, 397.
Podosphaera myrtillina (Schub.) Kze et Schmidt. = Sphaeria myrtillina Schub. (Dr T. Rayss), 1933, 391.
Polystigma rubrum (Pers.) D.C. = Xyloma rubrum Pers. (Dr T. Rayss), 1933, 396.
Rhytisma acerinum (Pers.) Fr. = Xyloma acerinum Pers. (Dr T. Rayss), 1933, 399.
Rhytisma andromedae (Pers.) Fr. = Xyloma andromedae Pers. (Dr T. Rayss), 1933, 399.
Rhytisma salicinum (Pers.) Fr. = Xyloma salicinum Pers. (Dr T. Rayss), 1933, 399.
Sawadea tulasnei Fuck. = Uncinula tulasnei Fuck. (Dr T. Rayss), 1933, 392.
Sphaerotheca fusca Fr. = Erysiphe fusca Fr. (Dr T. Rayss), 1933, 392.
Sphaerotheca humuli D.C. = Erysiphe humuli D.C. (Dr T. Rayss), 1933, 391.
Sphaerotheca macularis Fr. = Sphaerotheca castagnei Lév., Sphaerotheca humuli (D.C.) Burr. (R. Maire), 1930, 232.
Sphaerotheca macularis Wallroth. = Alphitomorpha macularis Wallroth. (Dr T. Rayss), 1933, 391.
Sphaerotheca mors-uvae (Schwein.) Berk. et Curt. = Erysiphe mors-uvae Schwein. (Dr T. Rayss), 1933, 392.
Stigmatea depazeaeformis Auersw. Schröt. = Mycosphaerella depazeaeformis Rostrup (Dr T. Rayss), 1946, 21.
Systremma natans (Tode) Th. et Syd. = Sphaeria natans Tode, Sphaeria sambuci Pers., Dothidea sambuci Fr., Dothidea natans (Tode) Zahlbr. (M. Luc), 1952, 149.
Taphrina deformans Berk. = Exoascus deformans Fuck. (Dr T. Rayss), 1946, 10.
Trichocladia tortilis Wallr. = Alphitomorpha tortilis Wallr. (Dr T. Rayss), 1933, 395.
Uncinula salicis D.C. = Erysiphe salicis D.C. (Dr T. Rayss), 1933, 392.

DISCOMYCETES

Cookeina sulcipes (Berk.) Kuntze = Cookeina afzelii Kuntze, Cookeina hindsii Kuntze, Geopyxis elata Massee, Geopyxis striatospora Maub. et Roger, Peziza afzelii Fr., Peziza hindsii Berk., Peziza sulcipes Berk., Pilocratera engleriana P. Henn., Trichoscypha sulcipes Sacc. (A. Maublanc et L. Roger), 1938, 111.

Cookeina tricholoma Mont. = Peziza hystrix Berk., Peziza striispora Ell. et Ev., Pilocratera tricholoma P. Henn., Sarcoscypha striispora Sacc., Trichoscypha tricholoma Sacc. (A. Maublanc et L. Roger), 1938, 113.

Galactinia atroviolacea (Peziza Bres.) (Mme Le Gal), 1954, 193.

Helotium citrinum = Calycella citrina (P. Genty et J.L. Lemoine), 1947, 212.

Helotium sulphuratum (Schum. ex Fr.) Phill. = Peziza sulphurata Schum. ex Fr. (Mme M. Le Gal), 1954, 204.

Humaria umbrosa (Schrad.) Sacc. = Peziza umbrosa Schrad. et Fr. non Melachroia umbrosa (Schrad.) Boud. (Mme Le Gal), 1954, 188.

Lamprospora polytrichi (Fr. ex Schum.) = Peziza polytrichi Schum., Humaria polytrichi Quél., Barlaea polytrichi Rehm. Velenovsky (Mme M. Le Gal), 1940, 39.

Lasiostictis fimbriata (Schwein.) Bäumler. = Lasiostictis conigena Sacc. et Berl., Stictis fimbriata Schwein., Stictis conicola Hazsl. (R. Maire), 1930, 238.

Melastiza miniata Boudier = Humaria miniata Crn. (P. Genty et J.L. Lemoine), 1947, 212.

Mitrophora hybrida (Sow.) Boudier = Mitrophora rimosipes D.C. et Mitrophora semi-libera D.C. (P. Konrad), 1925, 69.

Morchella rotunda Boudier = Morchella esculenta L. (L. Imler), 1942, 108.

Morchella semi-libera D.C. = Morchella hybrida Sow., Morchella rimosipes D.C. (J. Lagarde et P. Konrad), 1927, 211.

Otidea onotica Pers. = Otidea concinna Pers., Otidea phlebophora Berk. (R. Heim et L. Remy), 1932, 68.

Pachyella atro-violacea (Bres.) Boud. = Psilopezia nummularia Berk. (Mme M. Le Gal), 1954, 198.

Pseudopeziza medicaginis Lib. = Phacidium medicaginis Lib. (Dr T. Rayss), 1933, 400.

Pseudopeziza trifolii (Biv. Brnh.) Fuckel = Ascobolus trifolii Biv. Brnh. (Dr T. Rayss), 1933, 399.

Pustularia velata (Quél.) Mme M. Le Gal = Peziza velata Quél., Geopyxis velata (Quél.) Sacc. et Syd., Pustularia catinus var. velata Quél. Boudier, 1954, 200.

Sclerotinia fructigena (Pers.) Schroet. = Monilia fructigena Pers. (Dr T. Rayss), 1933, 400.

Trochila ilicis (Chev.) Crouan = Rustezia ilicis Chev. (Dr T. Rayss), 1933, 399.

Urnula melastoma (Sow.) Boudier = Lachnea melastoma Gillet, Peziza atrorufa Grev., Peziza crenulata Fuck., Peziza melastoma Sow., Peziza rhizopus Alb. et Schwein., Plectania melastoma Fuck., Rhizopodella melastoma Cooke, Sarcoscypha melastoma Cooke, Scypharia melastoma Quél. (G. Nicolas), 1925, 474.

BASIDIOMYCETES

USTILAGINALES

Botryoconis (Genre) Syd. = Cryptobasidium Lendner (G. Malençon), 1953, 96.

Cintractia angulata Syd. = Cintractia eructans (J. Kze) Liro (M. Massenot, 1953, 404.
Coniodyctium (Genre) Har. et Pat. = Hyalodema P. Magnus (G. Malençon), 1953, 96.
Coniodyctium chevalieri Har. et Pat. = Hyalodema evansii Magnus (G. Malençon), 1953, 77.
Doassansia sagittariae (West.) Fisch. = Protomyces sagittariae Fuck. (M. Maury), 1931, 199.
Entyloma bicolor (Zopf. et Rabenh.) Sacc. = Entyloma fuscum Schroeter (M. Maury), 1931, 198.
Ginanniella primulicola (Magn.) Cif. = Tuburcinia primulicola (Magn.) Bref. (M. Massenot), 1953, 405.
Thecaphora hyalina Fingerh. = Uredo capsulorum Fr. (M. Maury), 1931, 199.
Thecaphora seminis-convolvuli Duby = Thecaphora hyalina Fingerh. (M. Massenot), 1953, 409.
Tilletia tritici (Bjerk.) Wint. = Tilletia caries Tul. (M. Maury), 1931, 198.
Tuburcinia pulsatillae Liro. = Urocystis anemones R. Heim (M. Massenot), 1953, 412.
Tuburcinia syncocca (Kirchn.) Jorst. = Tuburcinia hepaticae trilobae (D.C.) Liro. (M. Massenot), 1953, 413.
Urocystis agropyri (Preuss.) Schroeter = Uredo ulei Magnus (M. Maury), 1931, 199.
Urocystis anemones (Pers.) Wint. = Uredo pompholypodes L. et Uredo ranunculacearum D.C. (M. Maury), 1931, 198.
Urocystis ornithogali (Koern. et Fisch.) Sacc. = Uredo hypogoea Kern. et Fuckel (M. Maury), 1931, 198.
Ustilago caricis Pers. = Ustilago urceolorum (D.C.) Tul. (M. Maury), 1931, 196.
Ustilago flosculorum (D.C.) Fries = Uredo flosculorum D.C. (Dr T. Rayss), 1933, 413.
Ustilago holci-avenacei (Wallr.) Cif. = Ustilago decipiens (Wallr.) Liro (M. Massenot), 1953, 414.
Ustilago hordei (Pers.) Kell. et Sw. = Ustilago jenseni Rostrup (M. Maury), 1931, 197.
Ustilago hypogoea Tul. = Melanotaenium hypogeum (Tul.) Scheil. (M. Maury), 1931, 195.
Ustilago ischaemi Fuck. = Ustilago cylindrica Peck., Cintractia ischaemi Syd., Sphacelotheca ischaemi Clinton (L. Fenaroli), 1927, 280.
Ustilago longissima Sowerby = Uredo longissima Sowerby (Dr T. Rayss), 1933, 412.
Ustilago nuda Jens. = Ustilago hordei Brefeld (M. Maury), 1931, 197.
Ustilago panici miliacei (Pers.) Wint. = Ustilago destruens Schlecht. (M. Maury), 1931, 196.
Ustilago scorzoneriae Alb. et Schw. = Ustilago receptaculorum Fr. (p.p.) (M. Maury), 1931, 195.
Ustilago silenis inflatae D.C. = Uredo antherarum silenis inflatae D.C. (Dr T. Rayss), 1933, 412.
Ustilago tragopogi (Pers.) Schroeter = Ustilago receptaculorum Fr. (p.p.) (M. Maury), 1931, 195.
Ustilago violacea Pers. = Uredo violacea Pers. (Dr T. Rayss), 1933, 412.
Ustilago violacea (Pers.) Tul. = Ustilago antherarum (D.C.) Fr. (M. Maury), 1931, 195.

UREDINALES

MELAMPSORACEES, COLEOSPORIACEES, CRONARTIACEES

Coleosporium campanulae (Pers.) Lév. = Uredo campanulae Pers. (Dr T. Rayss), 1933, 419.
Coleosporium euphrasiae (Schum.) Winter. = Uredo euphrasiae (Dr. T. Rayss), 1933, 419.
Cronartium asclepiadum (Willd.) Fr. = Cronartium flaccidum A. et S. (M. Maury), 1931, 194.
Melampsorella symphiti (D.C.) Bubak. = Aecidium symphiti Thüm. et Aecidium lithospermi Thüm. (M. Maury), 1931, 192.
Melampsoridium betulinum (Tul.) Kleb. = Melampsora betulina Tul. (Dr T. Rayss), 1933, 420.
Pucciniastrum agrimoniae (D.C.) Transchel = Uredo agrimoniae eupatoriae D.C. (M. Maury), 1931, 190.
Pucciniastrum circaeae Thuem. = Melampsora circeaea Thuem. (Dr T. Rayss), 1933, 419.
Thecopsora areolata (Fr.) P. Magnus = Aecidium strobilinum Rees, Pucciniastrum areolatum Otth, Thecopsora padi Kleb. (Mlle T. Rayss), 1946, 199.

PUCCINIACEES

Phragmidium rubi (Pers.) Wint. Rabenh. = Puccinia mucronata Pers. var.rubi Pers. (Dr T. Rayss), 1933, 418.
Pileolaria terebinthi Cast. = Uromyces terebinthi Wint. (Mme M. Le Gal), 1946, 27.
Puccinia absinthii D.C. = Puccinia artemisiae Fuck. (M. Maury), 1931, 177.
Puccinia annularis (Str.) Schlecht. = Puccinia teucrii Fuck. (M. Maury), 1931, 180.
Puccinia arenariae (Schum.) Wint. = Puccinia dianthi D.C., Puccinia stellariae Duby, Puccinia lychnidearum Link (M. Maury), 1931, 175.
Puccinia baryana Thuem. = Puccinia pulsatillae Kalch. et Puccinia virginiana Unamuno (G. Dupias), 1951, 55.
Puccinia betonicae (Alb. et Schw.) D.C. = Puccinia anemonis var. betonicae Alb. et Schw. (Dr T. Rayss), 1933, 416.
Puccinia bromina Erikss. = Puccinia symphiti-bromorum Müll. (M. Maury), 1931, 185.
Puccinia calcitrapae D.C. = Puccinia centaureae Mart. (p.p.) (M. Maury), 1931, 178.
Puccinia caricis (Schum.) Rebent. = Puccinia caricina D.C. (M. Maury), 1931, 182.
Puccinia cyani (Schleich.) Pass. Rabenh. = Uredo cyani Schleich. (Dr T. Rayss), 1933, 417.
Puccinia cynodontis Desm. = Aecidium fediae olitoriae Bals. et de Not. (G. Dupias), 1951, 55.
Puccinia fusca (Pers.) Wint. = Puccinia anemones Pers. (M. Maury), 1931, 175.
Puccinia galii (Pers.) Schwein. Sacc. = Puccinia punctata Link (M. Maury), 1931, 177.

Puccinia grisea (Str.) Wint. = Puccinia globulariae D.C. (M. Maury), 1931, 180.
Puccinia jaceae Otth. = Puccinia centaureae Mart. (p.p.) (M. Maury), 1931, 178.
Puccinia lampsanae Schultz. = Puccinia flosculosorum Alb. et Schwein. (M. Maury), 1931, 179.
Puccinia lolii Niels. = Puccinia coronifera Kleb. (M. Maury), 1931, 184.
Puccinia lolii Niels. = Puccinia coronifera Kleb. (Dr T. Rayss), 1933, 418.
Puccinia magnusiana Koern. = Puccinia arundinacea D.C. (p.p.) (M. Maury), 1931, 183.
Puccinia menthae Pers. = Puccinia clinopodii (M. Maury), 1931, 180.
Puccinia mirabilissima Peck. = Uropyxis sanguinea Arth. (G. Dupias), 1951, 57.
Puccinia cahuensis Ell. et Ev. = Puccinia digitariae Pole Evans, Uredo digitariaecola Thuem. (Mayor et G. Viennot-Bourgin), 1951, 123.
Puccinia oblongata (Link.) Wint. = Puccinia luzulae Libert (M. Maury), 1931, 181.
Puccinia obtegens Link. = Puccinia suaveolens (Pers.) Rost. (M. Maury), 1931, 178.
Puccinia perennis Jacky = Puccinia chondrillae Corda, Puccinia lactarum Syd. (M. Maury), 1931, 179.
Puccinia phalaridis Plow. = Puccinia ariphalaridis Kleb. (M. Maury), 1931, 183.
Puccinia phragmitis (Schum.) Koern. = Puccinia arundinacea D.C. (p.p.) (M. Maury), 1931, 183.
Puccinia poae-sudeticae (West.) Jörst. = Uredo poae-sudeticae West. (G. Dupias), 1951, 58.
Puccinia polygoni Alb. et Schw. = Puccinia polygoni Pers. (p.p.) (M. Maury), 1931, 181.
Puccinia polygoni amphibii Pers. = Puccinia polygoni Pers. (p.p.) (M. Maury), 1931, 181.
Puccinia prenanthis purpureae (D.C.) Lind. = Aecidium prenanthis purpureae D.C. (Dr T. Rayss), 1933, 417.
Puccinia pruni spinosae Pers. = Puccinia prunorum Link. (M. Maury), 1931, 181.
Puccinia pulverulenta Grev. = Puccinia epilobii-tetragoni D.C. (G. Dupias), 1951, 58.
Puccinia sessilis Schneid. = Puccinia convallariae digraphidis Kleb., Puccinia paridi-digraphidis Kleb. (M. Maury), 1931, 183.
Puccinia taraxaci (Rebent.) Plow. = Puccinia phaseoli var. taraxaci Rebent. (Dr T. Rayss), 1933, 417.
Puccinia tragopogoni (Pers.) Corda = Puccinia tragopogonis Fuck. (M. Maury), 1931, 179.
Puccinia variabilis Grev. = Puccinia hieraceai Schum., Uredo flosculosorum Alb. et Schwein. (p.p.) (M. Maury), 1931, 179.
Uromyces alchemillae (Pers.) Lév. = Uredo alchemillae Pers. (Dr T. Rayss), 1933, 414.
Uromyces alliorum (D.C.) Karst. = Uromyces ambiguus Tul. (M. Maury) 1931, 188.
Uromyces appendiculatus (Pers.) Link. = Uromyces phaseoli (Pers.) Wint. (M. Maury), 1931, 187.
Uromyces excavatus (D.C.) Lév. = Uromyces flavicomae Liou-Tchen-Ngo (G. Dupias), 1951, 61.

Uromyces fabae (Pers.) de Bary = Uredo fabae Pers. (Dr T. Rayss), 1933, 414.
Uromyces genistae tinctoriae (Pers.) Fuck. = Puccinia laburni D.C. (M. Maury), 1931, 186.
Uromyces genistae tinctoriae (Pers.) Wint. = Uromyces appendiculata var. genistae tinctoriae Pers. (Dr T. Rayss), 1933, 414.
Uromyces magnusii Kleb. = Uromyces medicaginis orbicularis Mass. (G. Viennot-Bourgin), 1953, 341.
Uromyces ornithogali Lév. = Uromyces acutatus Fuck. (M. Maury), 1931, 188.
Uromyces orobi (Pers.) Lév. = Aecidium orobi Pers. (Dr T. Rayss), 1933, 414.
Uromyces pisi (Pers.) Winter. Rabenh. = Uredo appendiculata var. pisi Pers. (Dr T. Rayss), 1933, 414.
Uromyces polygoni (Pers.) Fuck. = Puccinia polygoni Pers. (Dr T. Rayss), 1933, 413.
Uromyces rumicis (Schum.) Wint. = Uromyces rumicum Lév. (M. Maury), 1931, 187.
Uromyces valerianae (Schum.) Fuck. = Uredo valerianae Schum. (Dr T. Rayss), 1933, 415.
Uromyces verruculosus Schroeter = Uromyces schroeteri De Toni (M. Maury), 1931, 186.

TREMELLACEES

Bourdotia caesio-cinerea (v. Höhn. et Litsch.) B. et G. = Sebacina Rogers, Corticium v. Höhn. et Litsch., Gloeocystidium B. et G., Bourdotia cinerella B. et G. (G. Malençon), 1954, 121.
Bourdotia deminuta B. et G. = Sebacina H.B., Corticium involucrum Burt. Rogers (G. Malençon), 1954, 122.
Bourdotia galzini (Bres.) B. et G. = Sebacina (Bres.), Sebacina pululahuana (Pat. et Lagerh.) Rogers (G. Malençon), 1954, 124.
Eichleriella spinulosa (B. et C.) Burt. = Stereum aculaetum Velen., Stereum rugosum Pers. var. aculeatum (Velen.) Pilat (A. Pilat), 1933, 332.
Eichleriella spinulosa B. et C. = Eichleriella kmetii Bres. (G. Malençon), 1952, 302.
Exidia thuretiana (Lév.) Fr. = Exidia albida (Huds. et Lind.) Bref. ss. Neuhoff 1934, non B. et G. 1928 (G. Malençon), 1954, 119.

TULASNELLACEES

Tulasnella violea (Quélet) = Prototremella Pat. (G. Malençon), 1952, 304.
Tulasnella violea var. incarnata (Johan Olsen) B. et G. = Tulasnella incarnata (Johan Olsen) Bref., Pachysterigma Johan Olsen (G. Malençon), 1954, 126.

APHYLLOPHORALES

CLAVARIACEES

Clavaria abietina Pers. = Clavaria cyanescens v. Post. (H. Bourdot), 1932, 208.
Clavaria falcata Pers. = Clavaria acuta Fr. ss. Corner (G. Malençon), 1952, 304.
Clavaria juncea Fr. = Typhula (Karsten), Clavaria delphus (Corner) (G. Malençon),1952, 304.
Pistillaria micans Pers. = Chazonaria (Donk.), Clavaria Pers., Scleromitra coccinea Corda, Stilbum laetum Pers. (G. Malençon), 1952, 308.
Pistillaria quisquiliaris Fr. = Clavaria Fr., Pistillaria puberula Berk. (G. Malençon), 1952, 308.
Pistillaria setipes Grev. = Typhula mucor Pat. (G. Malençon), 1952, 310.

POROHYDNEES

A. Corticiés

Aleurodiscus cerussatus Bres. = Corticium Bres., Kneiffia Bres. (G. Malençon), 1952, 310.
Aleurodiscus diffusus (Sacc.) Burt. = Peniophora diffissa Sacc., Stereum sajanense Murash., Aleurodiscus sajanensis (Mur.) Pilat (A. Pilat), 1933, 328.
Aleurodiscus polygonioides (Karsten) Pilat = Corticium polygonioides Karst. (G. Malençon), 1954, 132.
Aleurodiscus roseus (Pers.) von Höhn. et Litsch., Pilat, Rogers et Jackson = Corticium roseum (Pers.) B. et G., Corticium roseolum Massee non Peniophora Massee, Telephora Pers., Hypochnus Schröt. (G. Malençon), 1954, 133.
Asterostromella granulosa (Fr.) B. et G. = Grandinia granulosa Fr. non Pers. (A. Pilat), 1933, 51 et 329.
Coniophora fusispora Cooke et Ell. = Corticium fusisporum Cooke et Ell. (A. Pilat), 1933, 35.
Coniophora puteana (Fr. ex Schum.) Karst. = Telephora Schum., Corticium Fries, Telephora cerebella Pers. (G. Malençon), 1952, 325.
Coniophorella laeticolor Karst. = Coniophora crocea Karst., Coniophora laeticolor Karst., Corticium laeticolor (Karst.) Sacc., Peniophora crocea (Karst.) v. Höhnel et Litsch., Xerocarpus laeticolor Karst. (A. Pilat), 1933, 296.
Coniophorella olivacea (Fr.) Karst. = Telephora Pers., Corticium Fr., Coniophora Karst. (G. Malençon), 1952, 325.
Corticium bombycinum (Sommft.) Bres. var. irpicoides = Odontia salicina Vel. (H. Bourdot), 1932, 210.
Corticium coronilla v. Höhn. et Litsch. = Sistrotrema Donk,,Odontia brinkmanni Bres., Trachispora Rogers et Jackson (G. Malençon), 1952, 320.
Corticium flavescens (Bonord.) Wint. = Botryobasidium Rogers, Pellicularia Rogers, Corticium frustulosum Bres. (G. Malençon), 1952, 321.

Corticium laetum (Karst.) Bres. = Hyphoderma laetum Karst. (A. Pilat), 1932, 210.
Corticium ochroleucum Bres. = Corticium fuscoatrum Burt. (G. Malençon), 1952, 322.
Corticium subcoronatum (v. Höhn. et Litsch.) B. et G. = Botryobasidium Donk., Pellicularia Rogers (G. Malençon), 1954, 147.
Corticium subcostatum (Karst.) B. et G. = Stereum album Quél., Stereum subcostatum Karst. (A. Pilat), 1926, 112.
Corticium sulphureum Pers. = Thelephora Pers. (G. Malençon), 1952, 323.
Corticium vellereum Ell. et Crag. = Corticium bresadolae Bourd. (R. Delécluse), 1937, 140.
Cotylidia carpatica (Skepperia A. Pilat) (H.S.C. Huijsman), 1954, 57.
Cyphella anomala (Pers.) Pat. = Peziza Pers., Solenia Fries (G. Malençon), 1954, 150.
Cyphella erucaeformis (Batsch.) Fr., Quél., Sacc.,Weinm. = Cyphella albissima Pat. et Doass., Cyphella albocarnea Quél., Cyphella eumorpha Karst., Peziza erucaeformis Batsch. (A. Pilat), 1933, 47.
Cyphella muscigena (Pers.) Fr., B. et G. = Thelephora Pers., Telephora vulgaris var. candida Pers., Arrhenia Quél.,non Cyphella muscigena Bres. nec Thelephora N. Amer. Burt. (G. Malençon), 1954, 150.
Cyphella piriaeformis (D.C.) B. et G. = Peziza D.C., Solenia Fuck. (G. Malençon), 1954, 151.
Gloeocystidium alutaceum (Schrad.) B. et G. = Thelephora (Schrad.), Corticium citrinum Pers., Corticium radiosum Fr. (G. Malençon), 1952, 323.
Gloeocystidium pallidulum v. Höhn. et Litsch. = Gloeocystidium oleosum v. Höhn. et Litsch. (A. Pilat), 1926, 116.
Gyrophana pinastri B. et G. = Hydnum pinastri Fr., Hydnum sordidum Weinm., Merulius himantoides Bres., Merulius pinastri Burt. (A. Pilat), 1933, 34.
Merulius lepidus Romell. = Corticium lepidum (Romell.) B. et G. (A. Pilat), 1933, 293.
Merulius niveus Fr., Karst., Sacc. = Merulius petropolitanus Fr., Weinm., Sacc., Plicatura alni Peck., Plicatura nivea (Fr.) Karst., B. et G., Trogis alni Peck. (A. Pilat), 1933, 292.
Peniophora byssoidea (Pers.) v. Höhn. et Litsch. = Corticium Fr., Corticium lacunosum Berk. et Broome, Coniophora Quél., Coniophora Bres., Thelephora Pers. (G. Malençon), 1954, 138.
Peniophora gracillima Ell. et Everh. ss. Rogers et Jackson, v. Höhn. et Litsch. = Peniophora glebulosa ss. Bres. non Sacc. et Sydow. nec Thelephora calcea var. glebulosa Fr. Elench. (G. Malençon), 1954, 139.
Peniophora greschikii (Bres.) B. et G. = Corticium Bres. (G. Malençon), 1954, 142.
Peniophora incarnata Pers. = Corticium Fr., Gloeopeniophora v. Höhn. et Litsch. (G. Malençon), 1952, 315.
Peniophora levigata (Fr.) Massee = Corticium Fr., Kneiffia Bres., Peniophora areolata Brinkmann, Stereum areolatum Fr. (A. Pilat), 1926, 117.
Peniophora mollis Bres. = Corticium molle B. et G. (A. Pilat), 1926, 117.
Peniophora roumeguerii (Bres.) v.Höhn. et Litsch. = Corticium Bres., Kneiffia Bres., Peniophora mulleriana (Bres.) Sacc.,

Peniophora stratosa Burt., Peniophora macra Karst. (G. Malençon), 1952, 318.
Skepperia Berk. = Friesula Spegaz. (A. Pilat), 1927, 52.
Skepperia platensis (Spegaz.) Pat. = Friesula platensis (A. Pilat), 1927, 55.
Skepperiella spathularia = Craterellus spathularius Berk. et Curtis, Skepperia spathularia Pat. (A. Pilat), 1927, 56.
Stereum subpileatum Berk. et C. = Hymenochaete tjibodensis (P. Hennings), Lloydella insignis Bres., Lloydella subpileatum v. Höhn. et Litsch., Stereum insigne Bres., Stereum sepium Burt. (G. Malençon), 1954, 127.
Vararia pallescens (Schw.) = Corticium Massee, Thelephora Schw., Asterostromella dura B. et G., Dichostereum durum Pilat (G. Malençon), 1952, 310.

B. Hydnés

Climacodon septentrionalis (Fr.) Karst. = Dryodon cirrhatum Lepik., Hydnum cirrhatum Konr. et Maub., Hydnum cirrhatum β, γ Weinmann, Hydnum giganteum Sauter, Hydnum septentrionale Fr. (A. Pilat), 1933, 310.
Donkia pulcherrima (B. et C.) Pilat = Hydnum pulcherrimum Berk. et Burt., Dryodon pulcherrimum (B. et C.) Pilat (A. Pilat), 1936, 328.
Dryodon alpestre Pers. = Hydnum Fr., Hericium Pers., Hericium stalactitium Schrank (H. Bourdot), 1932, 221.
Dryodon cirrhatum (Pers.) Quél., B. et G. = Hydnum cirrhatum Fr., Pers., Gillet, etc. (A. Pilat), 1933, 313.
Dryodon pulcherrimum Berk. et Curtis = Hydnum pulcherrimum Berk. et Curtis, Sacc. Lloyd. (A. Pilat), 1933, 315.
Grandinia mutabilis Pers. = Grandinia granulosa var. mutabilis Pers. (H. Bourdot), 1932, 218.
Mycoleptodon murashkinskyi Burt. = Hydnum murashkinskyi Burt. (A. Pilat), 1933, 300.
Mycoleptodon reflexum Burt. = Hydnum reflexum Burt. (A. Pilat), 1933, 302.
Mycoleptodon taurinum Pers. = Hydnum (Odontia) taurinum Pers., Sistotrema pedemontanum Pers. (H. Bourdot), 1932, 221.
Odontia aspera (Fr.) B. et G. = Grandinia aspera Fr. (A. Pilat), 1933, 299.
Odontia queletii B. et G. = Odontia farinacea Quél. (A. Pilat), 1933, 40.
Sclerodon strigosus (Schwartz) Karst. = Gloiodon strigosus (Schw.) Karst., Hydnum parasiticum Pers., Hydnum stratosum Berk., Hydnum strigosum (Schwartz) Fr., etc. (A. Pilat), 1933, 307.

C. Phylactériés

Caldesiella Sacc. = Hydnum Fr. p.p., Odontia Quél. p.p. (A. Pilat), 1926, 107.
Caldesiella crinalis (Fr.) B. et G. = Caldesiella ferruginosa Sacc., Hydnum castaneum var. fuscum Pers., Hydnum crinale Fr., Hydnum ferrugineum Auct. plu., Odontia barba-jovis Pat., Odontia crinalis (Fr.) Bres. (A. Pilat), 1926, 107.
Tomentella castanea B. et G. = Hypochnus umbrinus Quél. non Fries (A. Pilat), 1926, 108.

Tomentella cervina (Burt.) B. et G. = Hypochnus cervinus Burt. (A. Pilat), 1933, 58.
Tomentella cinerascens (Karst.) v. Höhn. et Litsch. = Hypochnus cinerascens Karst., Hypochnus capnoides Bres., Tomentella asterigma R. Maire (A. Pilat), 1933, 74.
Tomentella ferruginea Pers. ex Schroeter = Corticium ferrugineum Fr., Hypochnus ferruginosus (Fr.) Pat., Hypochnus subferrugineus Burt., Thelephora ferruginea Pers. (A. Pilat), 1933, 70.
Tomentella fuliginea (Burt.) B. et G. = Hypochnus fuligineus Burt. (A. Pilat), 1933, 66.
Tomentella fumosa Fr. = Corticium fumosum Fr., Hypochnus fumosus (Fr.) Burt., Corticium sulphureum Pers. (A. Pilat), 1935, 409.
Tomentella fusca (Pers.) Schroeter = Hypochnus fuscellus Karst. (A. Pilat), 1937, 140.
Tomentella mucidula (Karst.) v. Höhn. et Litsch. = Corticium (Hypochnus) epimyces Bres., Hypochnus roseo-griseus Wakefield et Pearson, Hypochnus mucidulus Karst., Tomentella epimyces (Bres.) v. Höhn. et Litsch., Tomentella roseo-grisea (Wak. et Pears.) B. et G. (A. Pilat), 1933, 56.
Tomentella spongiosa (Schwein.) B. et G. = Hypochnus obscuratus Karst., Hypochnus spongiosus (Schwein.) Burt., Thelephora spongiosa Schwein. (A. Pilat), 1933, 67.
Tomentella subfusca (Karst.) v. Höhn. et Litsch. = Hypochnus subfuscus Karst. (A. Pilat), 1933, 62.
Tomentella umbrina (Fr.) Litschauer = Corticium umbrinum Fr., Hypochnopsis fuscata Karst., Hypochnus fuscatus Karst., Hypochnus sitnensis Bres., Hypochnus tristis Karst., Hypochnus umbrinus Fr. Burt., Thelephora arachnoidea Berk. et Broome nec Bres., Thelephora biennis Fr. 1874 non Fr. 1821, Thelephora umbrina Fr. nec Alb. et Schw., Tomentella tristis (Karst.) v. Höhn. et Litsch. (A. Pilat), 1933, 52.
Tomentellina bombycina (Karst.) B. et G. = Hypochnus canadensis Burt., Kneiffiella bombycina Karst., Tomentellina ferruginosa v. Höhn. et Litsch. (A. Pilat), 1933, 52.

D. Porés

Coriolus abietinus Quél. var. lenzitoidea = Lenzites ambigua Karst., Lenzites laricina Karst. (A. Pilat), 1935, 367.
Coriolus pergamenus (Fr.) Pat. = Coriolus simulans Blonski non Berk. (L. Joachim), 1938, 23.
Coriolus subradula Pilat = Coriolus pallescens Pilat (A. Pilat), 1935, 366.
Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. = Boletus applanatus Pers., Boletus fomentarius var. applanatus Pers., Boletus lipsiensis Batsch., Fomes applanatus Sacc., Ganoderma lipsiense Atkins., Phaeoporus applanatus Schröter, Placodes applanatus Quél., Placodes rubiginosus (Schrad.) Quél., Polyporus applanatus Walbr., Polyporus dryadeus Rostk., Polyporus merismoides Corda (G. Nicolas), 1926, 190.
Inonotus demidoffii (Lév.) Pilat = Polyporus demidoffii Léveillé, Fomes demidoffii (Lév.) Sacc., Fomes earlei (Murr.) Sacc., Fomes juniperinus (Schr.) Sacc. et Sydow, Fulvifomes juniperinus (Schr.) Murrill., Polyporus juniperinus Schrenk, Pyropolyporus earlei Murrill., Pyropolyporus juniperinus (Schr.) Murrill. (A. Pilat), 1937, 89.

Irpex pachyodon (Pers.) Quél. = Sistotrema pachyodon Fr. (R. Delécluse) 1937, 141.
Leptoporus albosordescens (Romell) Pilat = Polyporus fossilis Berk. (A. Pilat), 1933, 260.
Leptoporus amorphus var. resupinatus B. et G. = Poria armeniaca Berk. (A. Pilat), 1932, 167.
Leptoporus bourdotii Pilat = Leptoporus dichrous Fr. var. carpatica Bourdot (A. Pilat), 1932, 167.
Leptoporus braunii Rab. = Leptoporus rufo-flavus Berk. et Curt. (L. Joachim), 1944, 80.
Leptoporus galactinus (Berk.) Pilat = Polyporus galactinus (Berk.) Sacc., Polyporus iowensis (Lloyd) Wolf., Spongipellis galactinus (Berk.) Pat. (A. Pilat), 1937, 85.
Leptoporus mollis Fries non Pers. = Leptoporus albo-brunneum Romell, Leptoporus fragilis B. et G. (L. Joachim), 1944, 79.
Leptoporus zameriensis Pilat = Leptoporus lacteus (Fr.) Quél. var. resupinata Bourdot (A. Pilat), 1935, 356.
Leucoporus brumalis (Pers.) Quél. = Polyporus brumalis Pers. (P. Konrad), 1925, 67.
Phellinus ferrugineo-fuscus Karst. = Ochroporus ferrugineo-fuscus Karst., Poria ferrugineo-fusca Karst. (A. Pilat), 1935, 369.
Polyporus giganteus (Pers.) Fr. = Caloporus acanthoides Quél. (F. Bataille), 1933, 439.
Polyporus pes-caprae Pers. = Boletus laxiporus (L. Joachim), 1929, 300.
Poria megalopora (Pers.) Bres. = Poria spongiosa Quél. (L. Joachim), 1938, 23.
Poria rixosa Karst. = Polyporus croceus Karst., Polyporus contiguus rixosus Karst., Poria blytii Fr., Poria collabens Fr., Poria emollita Fr. (A. Pilat), 1935, 385.
Spongipellis litschaueri Lohwag. = Spongipellis schulzeri (Bres.) B. et G. (H. Bourdot), 1932, 224 ; (A. Pilat), 1933, 258.
Trametes irpicoides A. Bondarzew = Polyporus irpicoides A. Bond. (A. Pilat), 1936, 311.
Trametes squalens Karst. = Trametes anceps Peck. (L. Joachim), 1938, 24.
Ungulina fraxinea Bull. = Boletus fraxineus Bull., Fomes fraxinea Sacc., Pacodes incanus Quél., Polyporus fraxineus Fr., Trametes fraxinea Karst., Ungulina incana Pat., Ungulina fraxinea B. et G. (G. Nicolas), 1926, 192.
Ungulina lapponica Romell = Polyporus lapponicus Romell (A. Pilat), 1933, 268.

BOLETACEES

A. Porées

Boletus albidus Roques = Boletus macrocephalus Leuba (P. Konrad), 1929, 71.
Boletus albidus ssp. eupachypus Roq. = Boletus pachypus Quél. non Fr., Sacc., Gill., Ricken, etc., Boletus candicans Fr. (P. Konrad), 1929, 71.
Boletus appendiculatus Schaef. = Boletus aereus Bull. var. 2, Boletus irideus Rostk. (P. Konrad), 1925, 64.
Boletus auricomus Cheval. = Boletus radicans Pers. (L. Joachim), 1929, 300.

Boletus calopus Fr. = Boletus olivaceus Fr., Boletus pachypus sensu Fr., Sacc., Gill., Ricken, non Quél. (P. Konrad), 1929, 71.
Boletus crocipodius Lett. = Boletus tessellatus Gill. (L. Imler), 1938, 60.
Boletus discolor Quél. = Boletus queletii Schultz. (E.J. Gilbert), 1936, 250.
Boletus junquilleus (Quél.) Boudier = Dictyopus junquilleus Quél., Boletus luridus var. junquilleus L.Legué, Boletus pseudosulphureus F. Kallenbach (E.J. Gilbert et A. Leclair), 1942, 187.
Boletus leucophaeus R. Maire = Boletus scaber Kallenbach (L. Imler), 1933, 55.
Boletus (Trachypus) leucophaeus Gilbert non Pers. = Krombolzia leucophaea E.J. Gilbert (E.J. Gilbert et A. Leclair), 1942, 173.
Boletus pachypus Fr. var. candicans Fr. = Boletus albidus Roques (Dumée et A. Leclair), 1927, 205.
Boletus placidus Bonorden = Boletus albus Peck., Boletus fusipes Fr., Boletus oudemansii Harsten, Boletus pictilis Quél., Boletus plorans et Boletus plorans var. eleutheros Rolland (P. Konrad), 1927, 203.
Boletus placidus var. bellini Inzenga = Boletus boudieri Quél. (P. Konrad), 1927, 203.
Boletus piperatus Barla var. amarellus Quél. = Boletus pierrhuguesii Boudier, Boletus amarellus Quél. (E.J. Gilbert), 1928, 227.
Boletus pulverulentus Opatowski = Boletus radicans Fr. (P. Konrad), 1927, 198.
Boletus purpureus Fr. et Hok. = Boletus rhodoxanthus Kallenbach (Mme M. Le Gal), 1948, 206.
Boletus regius Kromb. = Boletus cerasinus Martin (P. Konrad), 1925, 66.
Boletus satanas Lenz. = Boletus tuberosus Quél. (P. Brébinaud), 1927, 138.
Boletus scaber Quél., Gill., etc. = Boletus pseudoscaber Kallenbach (L. Imler), 1938, 55.

B. Lamellées

Gomphidius rhodoxanthus (Schw.) Sacc. = Agaricus rhodoxanthus Schw., Clitocybe pelletieri Gill., Flammula paradoxa Kalchb., Flammula vinosa Cooke, Paxillus flavidus Berk., Paxillus rhodoxanthus Rick., Paxillus tammii Pat. non Fr., Phylloporus pelletieri Quél., Tricholoma pelletieri Lév. (P. Dumée), 1926, 173.
Paxillus tricholoma Schw. = Flammula tricholoma Fr., Inocybe tricholoma A. et Schw. (A. Brébinaud), 1926, 128.
Paxillus panuoides Fr. = Paxillus lamellirugus D.C. (M. Josserand), 1932, 114.

AGARICALES

CANTHARELLACEES

Cantharellus tubiformis Fr. ex Bull. = Cantharellus infundibuliformis Fries ex Scopoli et var. lutescens (P. Konrad), 1929, 74.
Cantharellus umbonatus Gm. = Cantharellus mucoides Wulf. (R. Kühner et R. Maire), 1934, 12.

HYGROPHORACEES

Hygrophorus agathosmus Fr. = Hygrophorus cerasinus Berk. (P. Konrad), 1936, 43.
Hygrophorus caprinus Scop. = Hygrophorus camarophyllus Fr., A. et S., non Secr., Hygrophorus marzuolus Fr. Bres. (L. Joachim), 1938, 20.
Hygrophorus discoideus (Pers.) Fries = Hygrophorus nitidus Quél. non Fr. (P. Konrad), 1929, 63.
Hygrophorus fornicatus Fr. = Hygrophorus clivalis Fr., Hygrophorus distans Berk., Hygrophorus gentilitius Britzelmayr, Hygrophorus lividoalbus Cooke, Hygrophorus streptopus Fries (P. Konrad), 1936, 47 à 51.
Hygrophorus langei Kühner = Hygrophorus constans Lange (R. Kühner et R. Maire), 1934, 15.
Hygrophorus leucophaeus Scopoli = Hygrophorus discoideus ss. Quél., Bat., etc., non Fries (P. Konrad), 1929, 63.
Hygrophorus nemoreus Lasch. Fr. = Agaricus miniatus Schaeffer, Agaricus opiparus Fries, Hygrophorus leporinus Fries (P. Konrad), 1936, 46.
Hygrophorus nitidus Fries = Hygrophorus discoideus Pers. (P. Konrad), 1929, 63.
Hygrophorus olivaceo-albus var. gracilis R. Maire = Agaricus glutinosus Bull., Hygrophorus tephroleucus (Fr.) Quél. (P. Konrad), 1936, 45.
Hygrophorus pratensis Fries ex Persoon = Agaricus ficoides Bull., Agaricus miniatus Sowerby (P. Konrad), 1936, 45.
Hygrophorus pustulatus Fries = Hygrophorus tephroleucus Fries ex Pers. (P. Konrad), 1936, 43.
Hygrophorus rickenii Maire = Hygrophorus constans Lange (R. Maire), 1930, 220.
Hygrophorus unguinosus Fries = Hygrophorus clarkii Berk. et Broome, Hygrophorus irrigatus Fries ex Persoon (P. Konrad), 1936, 52.

PLEUROTACEES

Crepidotus fragilis M. Joss. = Crepidotus applanatus Quél. non Persoon (M. Josserand), 1937, 218.

Crepidotus fragilis M. Joss. = Crepidotus autochtonus Lange (M. Josserand), 1943, 31.
Crepidotus palmatus Bres. = Psilocybe spadicea Rick. et Konr. et Maub. (L. Imler), 1933, 122.
Lachnella africanus Pat. (M. Locquin), 1952, 166.
Lachnella asperifolius Pat. (M. Locquin), 1952, 166.
Lachnella bicolor Pat. et Dem. (M. Locquin), 1952, 166.
Lachnella carnelioruber Sing. (M. Locquin), 1952, 166.
Lachnella congoanus Pat. (M. Locquin), 1952, 166.
Lachnella craterellus Dur. et Lév. (M. Locquin), 1952, 166.
Lachnella fasciculata Schw. (M. Locquin), 1952, 166.
Lachnella fragilis Pat. (M. Locquin), 1952, 166.
Lachnella galeatus Berk. et Curt. (M. Locquin), 1952, 166.
Lachnella liliputianus Mont. (M. Locquin), 1952, 166.
Lachnella niduliformis Murr. (M. Locquin), 1952, 166.
Lachnella pachytrichus Sing. (M. Locquin), 1952, 166.
Lentinus cyathiformis Schaeffer = Lentinus degener Kalchbrenner, Lentinus lingulatus Paul, Lentinus umbellatus Fries, Lentinus variabilis Schulzer (A. Pilat), 1933, 286.
Lentinus suavissimus Fr., Quél., Big. et Guil., Ricken = Agaricus cochlearis non Agaricus (Lentinus) cochleatus Pers., Lentinus anisatus P. Hennings, Lentinus mitissimus Fr., Big. et Guil., Panus cochlearis (Fr.) Micheli, Panus graveolens Schulzer (A. Pilat et R. Vezeli), 1933, 226.
Lentinus tigrinus Bull. = Armillaria rhagadiosa Barla (E.J. Gilbert), 1947, 55.
Panus conchatus Fr. = Panus flabelliformis Schaef., Panus torulosus Fr. (R. Kühner et R. Maire), 1934, 22.
Panus rudis Fr. = Panus hirtus Secr. (R. Kühner et R. Maire), 1934, 22 ; (R. Delécluse), 1937, 41.
Pleurotus applicatus Batsch. et plur. auct. non Quél. nec Rea = Pleurotus reniformis Quél. et Rea (M. Josserand), 1933, 364.
Pleurotus mutilus Fr., Cooke, non Costantin = Clitopilus cretatus Berk. et Br. (M. Josserand), 1943, 23.
Pleurotus pinsitus Fr. = Clitopilus pinsitus (Fr.) Joss. (M. Josserand), 1937, 212.
Pleurotus serotinus (Fr.) Berk., etc. = Agarici stipici var. serotinus, Pleurotus serotinoides Peck. (A. Pilat), 1933, 281.
Pleurotus silvanus Sacc. = Pleurotus applicatus Quél. et Rea (M. Josserand), 1933, 364.
Pyrrhoglossum hepatizon Berk. = Agaricus hepatizon Berk., Crepidotus hepatizon Berk., Sacc. (R.W.G. Dennis), 1953, 173.
Pyrrhoglossum pyrrhus Berk. et Curt. = Agaricus pyrrhus Berk. et Curt., Crepidotus pyrrhus Berk. et Curt. (R.W.G. Dennis), 1953, 173.

MARASMIACEES

Collybia acervata Fr. = Agaricus erythropus Persoon, Collybia erythropus Quél. (P. Konrad), 1927, 178.
Collybia conigena Pers. = Collybia myosurus Ricken (R. Kühner et R. Maire), 1934, 13.
Collybia fumosa Pers. (Quél.) non Fr. = Tricholoma immundum Berk. non Tricholoma capniocephalum Quél. (M. Brébinaud), 1926, 125.

Collybia grammocephala Bull. = Collybia platyphylla Fr. (A. Pilat), 1932, 287.
Collybia maculata Quél. = Agaricus fusipes albus Secr., Lentinus densifolius Heim et Rémy (R. Kühner), 1926, 228.
Collybia myosura Fries = Collybia conigena (Pers.) sensu Fries, Cooke, Gill., Sacc., Lange, etc. (non sensu Pat., Bres., Ricken, etc.), Collybia friesii (Bres.) non Collybia myosura Quél. (P. Konrad), 1931, 129.
Collybia myriadophylla Peck. = Collybia lilacea Quél. (M. Josserand), 1937, 178.
Collybia tenacella (Fr. ex Persoon) Quél. = Collybia clavus (Brig.) Quél., Collybia conigena (Pat.) Bres., Collybia esculenta Wulf. et var. stolonifer Jungh., Collybia myosura Quél., Collybia perpendicularis Bull., Collybia plumipes Kalchbr. (P. Konrad), 1931, 129 ; (R. Kühner et R. Maire), 1934, 13.
Marasmius candidus Bolt. = Marasmius delilei J.L. Lemoine (P. Genty et J.L. Lemoine), 1947, 210.
Marasmius cauticinalis With. = Marasmius fulvobulbillosus R. Fries (R. Kühner et R. Maire), 1934, 18.
Marasmius cohaerens Fr. = Marasmius ceratopus Pers. (R. Kühner et R. Maire), 1934, 18.
Marasmius epiphylloides Rea = Marasmius hederae Kühner (R. Kühner et R. Maire), 1934, 18.
Marasmius fuscopurpureus Fr. = Marasmius terginus Fr. (P. Konrad), 1931, 135.
Marasmius hariolorum (Fr.) Quél. = Marasmius confluens Pers. (P. Heinemann), 1942, 101.
Marasmius lupuletorum (Weinm.) Bres. = Marasmius erythropus Fr. (P. Konrad), 1927, 179.
Marasmius undatus Berk. = Marasmius vertirugis Cooke (R. Kühner et R. Maire), 1934, 18.
Mucidula mucida Pat. = Armillaria fracida Fr., Armillaria mucida Schra. (E.J. Gilbert), 1949, 40.
Mycena amicta Fr. = Agaricus amictus Fr. Quél., Agaricus iris Berk., Mycena iris Quél., Cooke, Lange, Mycena iris var. caerulea Rea (M. Josserand), 1933, 345.
Mycena aurantio-marginata (Fr.) Quél. = Mycena elegans (Fr.) Quél. (P. Konrad), 1931, 137 ; (R. Kühner et R. Maire), 1934, 19.
Mycena epiphloea Fr. sensu Kühner = Omphalia speirea R. Maire non Lange (R. Kühner et R. Maire), 1934, 19.
Mycena jacobi R. Maire = Mycena pseudo-galericulata Lange (R. Maire), 1930, 218.
Mycena meulenhoffiana Oort. = Mycena lasiosperma Bres. ss. Kühner (R. Kühner et R. Maire), 1934, 20.
Mycena speirea Bres. = Omphalia speirea Lange, Omphalia tenuistipes Lange (M. Josserand), 1937, 193.
Mycenella longipes (Fr. ex Bull.) Romagnesi = Collybia longipes Bull., Xerula longipes R. Maire (H. Romagnesi), 1940, 63.
Mycenella caussei (R. Maire) Romag. = Xerula caussei R. Maire (H. Romagnesi), 1940, 63.
Xerula longipes R. Maire = Collybia longipes Bull., Marasmius longipes (G. Métrod), 1952, 178.

TRICHOLOMACEES

A. Tricholomées

Armillaria atkinsoniana (Aspidella Coker) (M. Locquin), 1952, 167.
Armillaria reillei (Lepidella Beauseigneur) (M. Locquin), 1952, 167.
Armillaria caligata Viv. = Armillaria robusta Quél., Armillaria caussetta var. guttata Barla (E.J. Gilbert), 1949, 37.
Armillaria cinereoconia (Aspidella Atkinson) (M. Locquin), 1952, 167.
Armillaria codinae (Lepidella R. Maire) (M. Locquin), 1952, 167.
Armillaria constricta Fr. = Lepiota constricta Quél., Tricholoma constricta Ricken (P. Brébinaud), 1929, 304.
Armillaria echinocephala (Aspidella Vitt.) (M. Locquin), 1952, 167.
Armillaria nana (Singer) (M. Locquin), 1952, 167.
Armillaria robusta A. et S. = Armillaria caussetta Barla, Armillaria rufa Quél., Lucand, Bourdot (E.J. Gilbert), 1949, 37.
Armillaria strobiliformis (Aspidella Vitt.) (M. Locquin), 1952, 167.
Armillaria vittadinii (Lepidella Moretti) (M. Locquin), 1952, 167.
Cantharellula obbata Bousset = Clitocybe obbata Bres. non Ricken, Agaricus cyatopullus Secr., Agaricus obbatus Fries, Agaricus tardus cinereus Pers. (M. Bousset), 1939, 126.
Clitocybe alexandri Gill. = Agaricus elixus (Sow.) Cooke, Agaricus gilvus Fr., Clitocybe gilva Quél. non Fries nec Ricken, Paxillus extenuatus Ricken, Paxillus griseo-tomentosus Secrétan (P. Konrad), 1927, 189 ; 1936, 38.
Clitocybe applanata Secr. = Clitocybe diatreta G. Métrod (G. Métrod), 1951, 403.
Clitocybe cyanolens G. Métrod = Clitocybe ditopoda var. longispora Métrod, Clitocybe senilis Josserand (G. Métrod), 1951, 388.
Clitocybe diatreta (Fr.) Quél. = Clitocybe salmona G. Métrod, Konr. et Maub. (G. Métrod), 1951, 402.
Clitocybe fuligineipes Métrod = Clitocybe fritilliformis Ricken (G. Métrod), 1939, 107.
Clitocybe olida Quél. = Cantharellus olidus Quél. (P. Konrad), 1929, 60.
Clitocybe phyllophila Ricken = Clitocybe cerrussata Konr. et Maub., Lange, nec Ricken, nec Fr. (H. Romagnesi), 1944, 90.
Clitocybe senilis Fr. = Clitocybe olida Vel., Clitocybe parilis Pat., Boudier, Clitocybe parilis var. aleuriosma R. Maire, Clitocybe fontqueri R. Heim (M. Josserand), 1948, 15.
Clitocybe subalutacea Fr. = Clitocybe trogii Fries voisin de Clitocybe viridis (P. Brébinaud), 1931, 94.
Clitocybe trullaeformis (Fr.) Bres. = Clitocybe parilis Lange non Fries (M. Josserand), 1948, 14.
Clitocybe umbilicata Fr. ex Schaeffer = Omphalia umbilicata Schaef. (G. Métrod), 1951, 395.
Clitocybe umbonata Fr. = Cantharellus umbonatus Fries, Cantharellus muscoides (Wulf.) Schröter (P. Konrad), 1931, 146.
Clitocybe viridis Scop. = Clitocybe odora Bull. (P. Brébinaud), 1931, 95.

Lepista (Leucopaxillus) amara (Fr.) Maire non Pat. = Agaricus amarus Fr., Clitocybe amara Quél., Clitocybe gentianea Quél., Gyrophila amara Quél. (R. Maire), 1930, 216.

Lepista gilva Fr. = Lepista splendens Fr. ex Persoon (P. Konrad), 1936, 40.

Lepista splendens (Fr. ex Pers.) = Clitocybe gilva Ricken et plur. auct. (P. Konrad), 1927, 189.

Melanoleuca alboflavida (Peck.) Sacc. = Tricholoma cnista Quél. (A. Pilat), 1937, 82.

Melanoleuca cognata (Fr.) Konr. et Maub. = Tricholoma armatum Bull., Quél., Bres. (G. Métrod), 1948, 162.

Melanoleuca evenosa Sacc. = Tricholoma cnista Bres. ss. Ricken (P. Konrad), 1927, 184 ; (G. Métrod), 1948, 164.

Omphalia bisphaerigera Lan. = Fayodia striaepilea Kühner, Omphalia striaepilea ss. Ricken (R. Kühner et R. Maire), 1934, 19 ; (M. Josserand), 1937, 190.

Omphalia bresadolae R. Maire = Omphalia xanthophylla Bres. (R. Kühner et R. Maire), 1934, 20.

Omphalia maura Lange = Agaricus maurus Fries, Omphalia maura Quél. (M. Josserand), 1937, 199.

Omphalia pyxidata sensu Sydow. non Ricken = Omphalia hepatica Ricken (R. Kühner et R. Maire), 1934, 20.

Tricholoma atrocinereum ss. Fr., Kühner = Agaricus cuneifolius var. cinereo-rimosus (Cooke) et var. griseo-rimosus (Cooke), Tricholoma cuneifolium Konr. et Maub. (M. Josserand), 1943, 13.

Tricholoma atrosquamosum (Chev.) Sacc. = Tricholoma murinaceum Quél. non Fries, Tricholoma ramentaceum Ricken non Armillaria ramentacea (Bull.) Quél., Tricholoma nigro-marginatum Bres. (P. Konrad), 1929, 58.

Tricholoma atrosquamosum (Chev.) Sacc. ssp. squarrulosum Bres. = Tricholoma squarrulosum Bres. (P. Konrad), 1929, 59.

Tricholoma carneum Bull. = Tricholoma carneolum Fr. (R. Kühner et R. Maire), 1934, 23.

Tricholoma columbetta Fr. = Agaricus diffractus (L. Joachim), 1929, 301.

Tricholoma infumatum Bres. = Clitocybe ectypa Fr. var. infumata Bres., Tricholoma ectypa var. infumata (Bres.) Sart. et L. Maire (A. Pouchet), 1928, 109.

Tricholoma medium Paulet = Tricholoma cnista Quél. et L. Maire non Fr. et Bres., Tricholoma grammopodium var. album Bull., Tricholoma melaleucum var. album Bourd. (A. Brébinaud), 1926, 121.

Tricholoma murinaceum (Bull.) Quél. = Agaricus atrosquamosus (Chev.) Sacc. (L. Joachim), 1929, 301 ; (F. Bataille), 1933, 439.

Tricholoma nigromarginatum (Lasch.) Fr. et Bres. = Tricholoma terreum var. caesium et sciodes Gill., Tricholoma atrosquamosum (Cooke) Chev. (P. Brébinaud), 1931, 93.

Tricholoma pseudoacerbum D.C. = Tricholoma guernisaci Crouan, Gill. (P. Dumée), 1926, 173.

Tricholoma ramentaceum Bull. = Armillaria cingulata Fr. (E.J. Gilbert), 1949, 37.

Tricholoma saevum Gill. = Tricholoma amethystinum Quél., Tricholoma bicolor Pers., Tricholoma personatum Pers. (M. Sauger), 1928, 307.

Tricholoma semitale Ricken = Collybia semitalis Fries (M. Josserand), 1927, 142.

Tricholoma striatum Schaeffer = Tricholoma albobrunneum Pers. (A. Pilat), 1932, 284.
Tricholoma virgatum (Fr.) Gill. ssp. sciodes Secr. = Tricholoma murinaceum Fr. ex Bull., Gill. non Quél. (P. Konrad), 1929, 59.

B. Lyophyllées

Tephrophana palustris Peck. = Collybia leucomyosotis Cooke et Sm. (J. Favre), 1939, 204.

C. Orcellées

Rhodopaxillus personatus Fr. = Tricholoma saevum Gill., Tricholoma amethystinum Quél. (R. Kühner et R. Maire), 1934, 22.
Rhodotus palmatus (Bull., Fr.) R. Maire = Agaricus alveolaris Cragin., Entoloma cookei Richon, Pleurotus subpalmatus Lloyd, Pluteus alveolatus Sacc., Pluteus phlebophorus var. reticulatus Cooke (A. Pouchet), 1932, 77.
Ripartites tricholoma (Alb. et Schwein.) Karst. = Inocybe tricholoma, Flammula tricholoma A. et S., Paxillus tricholoma Quél., Paxillus lepista Fr. (P. Konrad), 1927, 154.

RHODOPHYLLACEES

Claudopus variabilis (Pers.) Gill. = Dockmiopus variabilis (Fr.) Pat. (R. Delécluse), 1937, 141.
Entoloma cubensis (Eccilia Murr.) (R.W.G. Dennis), 1953, 168.
Entoloma erophilum Fr. = Entoloma plebeium Kalchbr. (H. Romagnesi), 1947, 188.
Entoloma excentricum Bres. = Entoloma bigeardi Barbier (M. Barbier), 1929, 251.
Entoloma helodes Fries = Entoloma jubatus Konrad (H. Romagnesi), 1947, 105.
Entoloma howellii (Nolanea Peck.) (R.W.G. Dennis), 1953, 159.
Entoloma inocephalum (Rhodophyllus Romagnesi) (R.W.G. Dennis), 1953, 160.
Entoloma metale (Rhodophyllus Romagnesi) (R.W.G. Dennis), 1953, 160.
Entoloma murraii Berk. et Curt., Sacc. = Agaricus murraii Berk. et Curt. (R.W.G. Dennis), 1953, 159.
Entoloma papillatum (Nolanea Bres.) (R.W.G. Dennis), 1953, 162.
Entoloma pinnum (Rhodophyllus Romagnesi) (R.W.G. Dennis), 1953, 160.
Entoloma plebeius Romagnesi = Entoloma aprilis Britz. (H. Romagnesi), 1947, 105.
Entoloma stylophorum Berk. et Br., Sacc. = Agaricus stylophorus Berk. et Br., Rhodophyllus stylophorus Berk. et Br., Romagnesi (R.W.G. Dennis), 1953, 165.
Entoloma trinitensis Denn. = Nolanea fragilis Baker et Dale non Entoloma fragile Murril (R.W.G. Dennis), 1953, 165.
Entoloma underwoodii Denn. = Eccilia earlei Murr. non Entoloma earlei Murr. (R.W.G. Dennis), 1953, 166.

Leptonia euchlora (Lasch.) Fr. = Leptonia incana Fr., Leptonia chloropolis Fr. (P. Konrad), 1927, 170.
Limacella furnacea Letel. = Agaricus furnaceus Letel., Armillaria irreperta Bernard, Armillaria megalopoda Bres., Armillaria megalopus Bres., Armillaria scruposa Bernard, Collybia megalopus Ricken, Lepiota furnacea Gillet, Limacella megalopoda R. Maire (E.J. Gilbert), 1928, 165 ; 1949, 40 ; (R. Kühner), 1936, 199.
Limacella megalopoda Bres. = Limacella furnacea Letel. ss. Gilbert (R. Kühner et R. Maire), 1934, 17.
Nolanea proletaria Ricken = Nolanea juncea Lange (H. Romagnesi), 1947, 105.
Nolanea proletaria ss. Boudier = Nolanea pascua ss. Bres. (H. Romagnesi), 1947, 188.
Rhodophyllus aprilis Britz. Romagnesi f. majus = Rhodophyllus majalis ss. Lange nec Fries (H. Romagnesi), 1947, 200.
Rhodophyllus aprilis Britz. Romagnesi f. typicus = Rhodophyllus plebeius ss. Romagnesi (H. Romagnesi), 1947, 199.
Rhodophyllus ardosiacus Bull. = Rhodophyllus mougeotii Lange (H. Romagnesi), 1947, 114.
Rhodophyllus babingtonii (Blvx.) Quél. = Rhodophyllus fumodellus (Wint.) Lange (H. Romagnesi), 1937, 328.
Rhodophyllus clypeatus Fr. ex Bull. = Entoloma clypeatum Fr., Cooke, Lange (H. Romagnesi), 1947, 198.
Rhodophyllus helodes Fr. = Rhodophyllus jubatus Konrad nec Fr. (H. Romagnesi), 1947, 114.
Rhodophyllus helodes Fr. = Entoloma jubatum ss. Konrad (H. Romagnesi), 1947, 189.
Rhodophyllus niphoides Romagn. = Entoloma speculum Cooke nec Fries (H. Romagnesi), 1947, 198.
Rhodophyllus pyrenaicus (Quél.) = Rhodophyllus erophilus Fries (H. Romagnesi), 1947, 195.
Rhodophyllus sepium Noulet et Dassier = Entoloma prunuloides Konr. et Maub., Rhodophyllus acclinis Britz., Rhodophyllus clypeatus Quél., Rhodophyllus prunuloides Britz. (H. Romagnesi), 1947, 196.
Rhodophyllus subnigellus Romagn. = Nolanea nigrella Velen. non Eccilia nigrella Fr. ex Pers. (H. Romagnesi), 1937, 328.

NAUCORIACEES

A. Cortinariées

Alnicola alnetorum Maire = Alnicola submelinoides Maire non Kühner (H. Romagnesi), 1942, 121.
Alnicola bohemica Vel. = Naucoria macrospora ss. Lange (H. Romagnesi), 1942, 121.
Alnicola escharoides Fr. ss. R. Maire = Alnicola melinoides ss. Ricken (H. Romagnesi), 1942, 121.
Alnicola phaea Kühner et Maire = Alnicola badia Kühner, Tubaria umbrina Maire (H. Romagnesi), 1942, 121.
Cortinarius allutus (Phlegmacium) Secr. var. lutea R. Henry = Cortinarius allutus Secr. sensu Quél., Bat. nec Cooke, Rea, Lange, Cortinarius luteus bulbiger Secr. (R.Henry), 1939, 64.

Cortinarius allutus (Phlegmacium) Secr. var. rufescens R. Henry = Cortinarius allutus Cooke, Rea, Lange, Fries, Massee et Smith, nec Secr., Quél., Bat. (R. Henry), 1939, 66.
Cortinarius anomalus (Dermocybe) Fries = Agaricus araneosus Bull., Cortinarius anomalus proteus Secr., Cortinarius eumorphus Pers., Cortinarius persoonii Henry, Cortinarius proteus Sacc., Cortinarius simulans Peck. (R. Henry), 1937, 143.
Cortinarius armeniacus (Hydrocybe) Fr., Michael = Cortinarius armeniacus ss. Rea, Lange, Cortinarius medius (an tenuius) Secr., Cortinarius armeniacus var. media Schaef. (R. Henry), 1948, 47.
Cortinarius atrovirens (Phlegmacium) Kalch. = Cortinarius prasinus Bres. nec Fries (R. Henry), 1939, 93.
Cortinarius azureus (Dermocybe) Fries = Agaricus violaceus Kromb. (R. Henry), 1937, 151.
Cortinarius balteatocumatilis (Phlegmacium) Henry = Cortinarius balteatus Lange nec Fries, Cortinarius cumatilis sensu Maire (R. Henry), 1939, 186.
Cortinarius bicolor (Hydrocybe) Cooke = Agaricus impuber Sow., Agaricus quadricolor Fr., Cooke, Agaricus spurius Fr., Secr., Cortinarius cypriacus Fr., Kalch., Cortinarius imbutus Quél. nec Fries, Cortinarius refectus Britz., Cortinarius vilior Karst. (R. Henry), 1940, 85.
Cortinarius boudieri (Phlegmacium) Henry = Cortinarius multiformis Boudier (R. Henry), 1936, 153.
Cortinarius bulliardi (Inoloma) Pers., Fries = Cortinarius bulbosus Sow., Cortinarius colus Ricken nec Fries (R. Henry), 1937, 304.
Cortinarius callisteus (Dermocybe) Fries = Cortinarius arduus Britz., Cortinarius ictericus Scop., Cortinarius tophaceus Quél., Lange, Telamonia limonius Fries (R. Henry), 1937, 66.
Cortinarius calochrous (Phlegmacium) Pers. = Cortinarius decolorans Pers. (R. Henry), 1935, 75.
Cortinarius caninus (Dermocybe) Fr., Ricken = Agaricus anomalus var. caninus Fr., Agaricus anomalus caninus Secr., Agaricus lamprocephalus Bull., Agaricus lucidus Pers., Agaricus subnotatus Bull. nec Pers. (R. Henry), 1937, 155.
Cortinarius cephalixus (Phlegmacium) Secr. = Cortinarius cliduchus Ricken, Cortinarius olidus Lange, Cortinarius papulosus Fr., Cooke, Bres., Cortinarius triumphans (Bat). Joachim (R. Henry), 1936, 279.
Cortinarius cinnamofulvus (Dermocybe) Henry = Cortinarius cinnamomeus Cooke nec Fries (R. Henry), 1939, 292.
Cortinarius cinnamomeobadius (Dermocybe) Henry = Agaricus cinnamomeus Persoon (R. Henry), 1939, 299.
Cortinarius cinnamomeolutescens (Dermocybe) Henry = Cortinarius cinnamomeus sensu Ricken, Kauff., Rea, Bres., Lange (nec Fries, Quél., Bat.), Cortinarius cinnamomeus var. elata Killerm., Cortinarius cinnamomeus var. lutescens Gill., Cortinarius croceus Secr. nec Fr. (R. Henry), 1939, 289.
Cortinarius citrinus (Phlegmacium) (Lange)Henry = Cortinarius elegantior Fr. f. citrinus Lange, Cortinarius sulphureus Kauffm. var. citrinus Lange (R. Henry), 1951, 309.
Cortinarius collinitus (Myxacium) Sow. = Agaricus mucosus Bull., Agaricus mucifluus Fr. et Kauffm., Agaricus senescens Batsch. (R. Henry), 1935, 205 = Cortinarius trivialis Lange (R. Henry), 1938, 228.
Cortinarius collinitus var. squamosipes (Myxacium) Henry = Corti-

narius mucifluus Cooke, Cortinarius collinitus var. parvus Fr. (R. Henry), 1950, 162.
Cortinarius collinitus var. subolivascens (Myxacium) Henry = Cortinarius var. luteolus Gill. (R. Henry), 1950, 161.
Cortinarius concinnus (Dermocybe) Karst. = Cortinarius orellanus Quél., non Fr., Cortinarius queletii Bat., Cortinarius uliginosus var. obtusa Lange in D.A. (R. Henry), 1936, 89, et 1939, 302.
Cortinarius cotoneus (Inoloma) Fr., Quél. = Agaricus conopus (Pers.) Secr., Cortinarius sublanatus Boud., Vel., Konr. et Maub. (R. Henry), 1937, 56.
Cortinarius croceifolius (Dermocybe) Peck. = Cortinarius cinnamomeus var. conformis Fr., Cortinarius croceus ss. Michael nec Fr., Cortinarius semisanguineus var. flaminea Kauffm. (R. Henry), 1939, 297.
Cortinarius croceocoeruleus (Phlegmacium) Pers. = Cortinarius viola Lange (R. Henry), 1950, 151.
Cortinarius croceus (Dermocybe) Schaeff. = Agaricus squamulosus Batsch., Cortinarius croceus Fr. nec Michael, Bres., (R. Henry), 1939, 294.
Cortinarius delibutus (Myxacium) Fr. = Cortinarius arvinaceus Cooke, Britz. nec Fr., Cortinarius berlesianus Sacc. et Cub., Cortinarius fulvo-luteus Britz. an Vel. var. elegans Massee, Cortinarius illibatus Fr., Cortinarius sphaerosporus Peck., Kauffm., Cortinarius subglutinosus Karst., Cortinarius subflexuosus Britz. an Vel., Cortinarius tricolor Peck. nec Mont. (R. Henry), 1938, 239.
Cortinarius dibaphus (Phlegmacium) Bat., Fr., etc. = Agaricus luteopedes Secr., Cortinarius luteopes Sacc. (R. Henry), 1935, 50, et 1936, 163.
Cortinarius elatior (Myxacium) Pers., Fr. = Cortinarius elatus Pers. (R. Henry), 1938, 236.
Cortinarius epipoleus (Myxacium) Fr. = Cortinarius liquidus Fr. (R. Henry), 1950, 149.
Cortinarius erythrinus (Hydrocybe) Fr. = Agaricus castaneus erythrinus Secr., Cortinarius decipiens Quél. (R. Henry), 1937, 310.
Cortinarius flavescens (Phlegmacium) Cooke = Cortinarius elegantior Lange, Cortinarius multiformis var. flavescens Cooke, Cortinarius sulphureus Lange in D.A., nec Kauffman (R. Henry), 1939, 180.
Cortinarius fulmineus (Phlegmacium) Fr. = Agaricus sericeus Schaeff. (R. Henry), 1939, 172.
Cortinarius glaucopus (Phlegmacium) Schaeff. = Cortinarius defossus Batsch., Cortinarius recensitus Britz. (R. Henry), 1938, 107.
Cortinarius hillieri (Telamonia) Henry = Cortinarius inurbanus Britz., Cortinarius recensitus Britz. (R. Henry), 1938, 107.
Cortinarius hinnuleus (Telamonia) Sow. = Agaricus helveolus Pers., Agaricus helveolus grandicolor Secret. (R. Henry), 1936, 92.
Cortinarius holophaeus (Hydrotelamonioides) Lange = Cortinarius licinipes var. robustior Cooke (R. Henry), 1948, 36.
Cortinarius illibatus (Myxacium) Fr. = Cortinarius fulvoluteus Britz. (R. Henry), 1946, 205, et 1950, 150.
Cortinarius incisus (Telamonia) Pers. = Agaricus gentilis var. incisus Fr. (R. Henry), 1941, 29.
Cortinarius infractus (Phlegmacium) Pers. = Agaricus fulvo-fuli-

gineus Pers., Agaricus obscuro-cyaneus (Secr.) Ricken, Cortinarius anfractus Fr. non Berk. (R. Henry), 1935, 237.

Cortinarius kauffmanianus (Psiloderma) Henry = Cortinarius argentatus Fr. var. kauffmanianus (R. Henry), 1946, 213.

Cortinarius largus (Phlegmacium) Fr. = Lepiota centrifugus Secr. (R. Henry), 1935, 223.

Cortinarius lebretonii (Dermocybe) Quél. = Cortinarius anomalus Ricken, Vel., Cortinarius lepidopus Cooke, Cortinarius spilomeus Quél., Bat., nec Fr., Bres. (R. Henry), 1937, 148.

Cortinarius metrodii (Myxacium) Henry = Cortinarius delibutus sensu Cooke-Stevenson, Cortinarius illibatus sensu Métrod (R. Henry), 1950, 163.

Cortinarius miniatopus (Hydrocybe) Lange = Cortinarius anthracinus Quél. nec Fr., Cortinarius colus Fr., Konrad, Bat., Cortinarius fasciatus Ricken, Vel., nec Fr. (R. Henry), 1940, 96.

Cortinarius mucifluoides (Myxacium) Henry = Cortinarius elatior Auct. p.p. Gillet, Cortinarius emunctus Quél. nec Fr., Cortinarius livido-ochraceus Berk., Cortinarius mucifluus Quél., Cortinarius pseudosalor Lange, Cortinarius stillatitius Ricken et Quél. non Fries (R. Henry), 1950, 156.

Cortinarius mucosus (Myxacium) (Bull.) Fr. = Cortinarius alutipes Lasch., Fr., Cortinarius arvinaceus Fr. (P. Konrad), 1927, 165 ; et de plus = Agaricus aurantiomucosus Secr., Cortinarius cellinitus Kromb. (R. Henry), 1950, 163.

Cortinarius mucosus (Myxacium) var. coeruliipes Smith. = Cortinarius collinitus ss. Lange, Cortinarius collinitus var. coeruliipes Smith (R. Henry), 1950, 164.

Cortinarius multiformis (Phlegmacium) Fr. = Cortinarius apiosmus Secr., Cortinarius balius Secr., Cortinarius elegantior Secr., Cortinarius turbinatus Secr. et Sow. (R. Henry), 1935, 93.

Cortinarius myrtillinus (Dermocybe) Fr. nec Quél. = Cortinarius myrtillinus Bolt., Cortinarius saturninus Fr., Vel. nec Fr. var. kauffm., Cortinarius subsaturninus Henry (R. Henry), 1946, 210.

Cortinarius nanceiensis (Phlegmacium) R. Maire = Phlegmacium percome Ricken-Vel. non Fr. (R. Henry), 1935, 219.

Cortinarius obtusus (Hydrocybe) Fr. = Cortinarius obtusus Konrad nec Velen., Cortinarius scandens Velen. nec Fr., Cortinarius sideroides Secr. (R. Henry), 1940, 109.

Cortinarius orellanus (Inoloma) Fr. = Agaricus callisteus Lasch., Cortinarius rutilans Quél. (R. Henry), 1936, 85.

Cortinarius orichalceus (Phlegmacium) Fr. ex Batsch. = Cortinarius odorifer Britz. (R. Henry), 1936, 170.

Cortinarius percomis (Phlegmacium) Fr. nec Ricken, Velen. = Cortinarius russus Ricken non Fr., Hebeloma mussivum Fr. (R. Henry), 1935, 216.

Cortinarius persoonii (Dermocybe) Henry = Agaricus proteus Fr., Agaricus anomalus eumorphus Secr., Agaricus eumorphus (Pers.) Albertini, Schwein. (R. Henry), 1932, 334.

Cortinarius phoeniceus (Dermocybe) Bull. = Cortinarius miltinus Quél. (R. Henry), 1935, 333.

Cortinarius pholideus (Inoloma) Fr. = Agaricus lepidomyces A. et S., Agaricus sublanatus Sow., Cortinarius arcuatus Fr. ex Pers., Cortinarius sublanatus Cooke, Gill. (R. Henry), 1937, 52.

Cortinarius polymorphus (Phlegmacium) Henry = Cortinarius multiformis ss. Quél.,Henry (R. Henry), 1951, 319.

Cortinarius praestans (Phlegmacium) Cordier = Cortinarius anfractus Berk. non Fr., Cortinarius berkeleyi Cooke, Cortinarius largus Quél., Cortinarius palmatosporus Martin, Cortinarius torvus Kalch., Quél., Lucand, Cost. et Duf., Rolland, non Fr., non R. Maire, Cortinarius torvus bar. berkeleyi Boudier, Cortinarius variecolor Fr., Alb. et Schwein., Secr. Britz., Ricken, etc., non Persoon (P. Konrad), 1927, 167, et de plus Cortinarius variecolor var. herculeanus Fr. (R. Henry), 1935, 232.

Cortinarius prasinus (Phlegmacium) Schaeffer = Agaricus scaurus Fr., Agaricus turbinatus β inquinatus Pers., Secr. (R. Henry), 1939, 88.

Cortinarius privignoides (Hydrotelamonioides) Henry = Cortinarius privignus ss. Ricken nec Fr. (R. Henry), 1948, 40.

Cortinarius privignorum (Hydrotelamonioides) Henry = Cortinarius privignus sensu Britzelmayr (R. Henry), 1948, 42.

Cortinarius pseudo-bolaris (Inoloma) Maire = Cortinarius bulliardi Ricken non Pers., Cortinarius limonius Quél. non Fr. (R. Henry), 1935, 330.

Cortinarius pseudocrassus Josserand = Hebeloma crassum Fr., Ricken, Inoloma crassum Fr., Ricken, Meliderma crassum Vel. (M. Josserand), 1948, 18.

Cortinarius pseudoduracinus (Hydrocybe) Henry = Cortinarius duracinus Cooke, Massee (R. Henry), 1938, 41.

Cortinarius pseudoscutulatus (Telamonia) Henry = Cortinarius scutulatus ss. Konrad, Ricken (R. Henry), 1938, 103.

Cortinarius purpurascens (Phlegmacium) Fr. = Agaricus badius Secr., Agaricus umbrinus Pers. (R. Henry), 1935, 66.

Cortinarius purpurascens f. eumarginata (Phlegmacium) Henry = Agaricus badius Secr., Agaricus umbrinus Pers., Cortinarius purpurascens Fr. nec Ricken, Cortinarius subpurpurascens Ricken nec Fries (R. Henry), 1939, 85.

Cortinarius purpurascens f. largusoides (Phlegmacium) Henry = Cortinarius purpurascens Ricken nec Fr., Cortinarius subpurpurascens Fr. et Auct. pro parte (R. Henry), 1939, 87.

Cortinarius rigidus (Telamonia) Scop. = Agaricus flexipes brunneus Sec., Cortinarius nigrellus Peck., nec Cortinarius rigidus Bres., nec Ricken (R. Henry), 1938, 91.

Cortinarius rufo-olivaceus (Phlegmacium) Pers. = Cortinarius decoratus Bat. (R. Henry), 1951, 314.

Cortinarius safranopes (Telamonia) Henry = Telamonia iliopodia Ricken, nec Bull., Fr. (R. Henry), 1938, 95.

Cortinarius saginus (Phlegmacium) Fr. nec Ricken, Vel. = Agaricus luteo-ovatopes Secr. (R. Henry), 1939, 193.

Cortinarius scaurus (Phlegmacium) Fr. = Agaricus fulvofuligineus Pers., Cortinarius olivascens sensu Quél. (R. Henry), 1943, 52.

Cortinarius sciophyllus (Hydrocybe) Fr. nec Britz. = Cortinarius castaneus var. major Fr. (R. Henry), 1938, 35.

Cortinarius scutulatus (Telamonia) Fr. = Cortinarius impennis Quél., nec Fr., Gill., Cortinarius torvus Auct. p.p. (R. Henry), 1938, 98.

Cortinarius semi-sanguineus (Dermocybe) Brig. = Agaricus betulinus Scop. (R. Henry), 1935, 337.

Cortinarius sodagnitus (Phlegmacium) Henry = Cortinarius caerulescens Quél., non Fr. ex Schaeff., Cortinarius dibaphus Quél. non Fr. (R. Henry), 1935, 44.

Cortinarius squamosipes (Myxacium) Henry = Cortinarius parvus Fr. (R. Henry), 1938, 231.

Cortinarius striatulus (Hydrocybe) Henry = Cortinarius scandens Kauffm. nec Fr. (R. Henry), 1940, 112.
Cortinarius subanthracinus (Dermocybe) Henry = Cortinarius apparens Britz. forma minor (R. Henry), 1944, 73.
Cortinarius subbalaustinus (Hydrocybe) Henry = Cortinarius balaustinus Lange, Cooke, nec Fr. (R. Henry), 1940, 100.
Cortinarius subsaturninus (Hydrocybe) Henry = Cortinarius saturninus Fr., Velen., Kauffm. (R. Henry), 1938, 32.
Cortinarius subturbinatus (Phlegmacium) Henry = Cortinarius turbinatus var. ferrugineus Gill., Romag., nec Scop., Fries (R. Henry), 1939, 167.
Cortinarius triformis (Hydrotelamonioides) Fr., Ricken, Lange = Cortinarius triformis var. schaefferi Fr., Cortinarius subferrugineus ss. Bres., nec Fries (R. Henry), 1948, 45.
Cortinarius turbinatus (Phlegmacium) Fr. ex Bull. = Agaricus subrepandus Pers. (R. Henry), 1935, 88.
Cortinarius turmalis (Phlegmacium) Fr. = Agaricus inopus Secr. (R. Henry), 1936, 285.
Cortinarius uliginobtusus (Hydrocybe) Henry = Agaricus obtusus paludosus Secr. (R. Henry), 1940, 107.
Cortinarius umidicola (Telamonia) Kauffman = Cortinarius impennis Gillet nec Fr. (R. Henry), 1937, 75.
Cortinarius variecolor (Phlegmacium) Pers. = Cortinarius praestans Cordier (R. Henry), 1935, 226.
Cortinarius velenovskyi (Hydrocybe) Henry = Cortinarius obtusus Velen., nec Fries, Konrad, Lange (R. Henry), 1940, 115.
Cortinarius venetus (Inoloma) Fr. = Agaricus squamulosus Secr. (R. Henry) 1937, 307.
Cortinarius veregregius (Telamonia) Henry = Cortinarius croceofulvus D.C., Fr., Gill., etc., Cortinarius paragaudis Fr., Gill., nec Ricken (R. Henry), 1938, 104.
Cortinarius vibratilis (Myxacium) Fr. = Cortinarius amarus Peck., Cortinarius barbatus Secr. (R. Henry), 1935, 210.
Cortinarius violaceus (Inoloma) (Linn.) Fr. = Agaricus araneosus Bull., Agaricus hercynus (Pers.) A. et S., Agaricus ionus Kromb. p.p., nec Bolt., Schaeff., Kromb. (R. Henry), 1935, 317.
Cortinarius vulpinus (Leproderma) Velen. = Cortinarius plumiger Quél., nec Fries (R. Henry), 1946, 207.
Fulvidula flava Bres. = Fulvidula dactylidicola Lange (H. Romagnesi), 1942, 128.
Galera martiana Berk. et Curt. = Agaricus martianus Berk. et Curt. (R.W.G. Dennis), 1953, 192.
Galera ravida Fr. = Galera vestita Quél. (M. Herregods), 1951, 149.
Galera tenera Quél. = Conocybe tenera Kühner (G. Parrot), 1948, 247.
Galerella plicatella (Peck.) Singer = Agaricus plicatellus Peck., Conocybe plicatella (Peck.) Kühner, Galera plicatella (Peck.) Earle, Galerula plicatella (Peck.) Murr. (R.W.G. Dennis), 1953, 190.
Galerina nana Petri = Inocybe whitei Velen. nec al. (H. Romagnesi), 1942, 128.
Galerula echinospora Murr. = Conocybe echinospora Murr., Galera echinospora Murr. (R.W.G. Dennis), 1953, 191.
Galerula velenovskyi Kühn. = Inocybe whitei Vel. (R. Kühner), 1934, 74.
Gymnopilus hypholomoides Murr. = Gymnopilus jalapensis Murr. (R.W.G. Dennis), 1953, 172.

Inocybe acuta Boud. = Inocybe radiata Kauffm., Peck., Inocybe umboninota Heim, Peck. (R. Kühner et J. Boursier), 1932, 130.
Inocybe bresadolae Massee = Inocybe repanda Bres. (R. Kühner et J. Boursier), 1932, 158.
Inocybe casimiri Vel. = Inocybe lanuginosa Konr. et Maub., Inocybe leptophylla Kauffm., Inocybe leptophylla var. cystomarginata G.F. Atkinson (J. Boursier et R. Kühner), 1928, 177.
Inocybe decipientoides Vel., Heim = Inocybe ochraceoscabra Atkinson (R. Kühner et J. Boursier), 1932, 141.
Inocybe decipientoides f. lyonnaise = Inocybe carpta Ricken (R. Kühner et J. Boursier), 1932, 144.
Inocybe eutheles (Berk. et Br.) Sacc. = Inocybe eutheloides Peck., Inocybe pallidipes Ell. et Ever., Inocybe rimosa ss. Pat., Inocybe tomentosa et tomentella ss. Quél. et Bat. (P. Konrad), 1929, 41 et 46.
Inocybe geophila var. lateritia Lange = Inocybe pudica Kühner (Mlle J. Bruylants), 1952, 370.
Inocybe grammata Quél., Lange, non Heim = Inocybe albodisca Peck., Kauffm., Inocybe hiulca Bres. (R. Kühner), 1933, 101.
Inocybe longicystis G.F. Atkinson, non Vel. = Inocybe lanuginosa Velen. (J. Boursier et R. Kühner), 1928, 179.
Inocybe mixtilis Britz. = Agaricus mixtilis Britz., Inocybe earleana Kauffm., Inocybe praetervisa Ricken, Inocybe scabella Heim, Inocybe trachispora Bres. et Kauffm. (R. Kühner), 1933, 88.
Inocybe oblectabilis Britz. = Agaricus oblectabilis Britz., Inocybe hiulca Bres., Inocybe hiulca var. major Bres. (R. Kühner), 1933, 109.
Inocybe ovatocystis B. et K. = Inocybe globocystis Velen., Inocybe lanuginosa Pat., Inocybe plumosa Konr. et Maub. (J. Boursier et R. Kühner), 1928, 181.
Inocybe patouillardi Bres. = Inocybe repanda Bull., Secr. et Quél., Inocybe lateraria Ricken (P. Konrad), 1925, 49.
Inocybe petiginosa (Fr.) Quél. = Inocybe rufo-alba Pat. et Doass., Inocybe scabella Schroeter (R. Kühner et J. Boursier), 1932, 155.
Inocybe praetervisa Quél. ss. Lange = Agaricus pseudomixtilis Britz., Inocybe praetervisa Bres., Kauffm., Konr. et Maub. (R. Kühner), 1933, 93.
Inocybe rimosa ss. Quél., Massee = Inocybe queleti nov. nom. (P. Konrad), 1929, 40 et 46.
Inocybe subfulva Peck. = Inocybe echinocarpa Ellis et Everhardt (R. Kühner et J. Boursier), 1932, 154.
Naucoria distantifolia (Galerula Murr.) (R.W.G. Dennis), 1953, 183.
Naucoria hepaticola Murr. = Galerina hypnorum Batsch. ex Fr., Galerina mniophila Lasch., Naucoria pectinata Berk. et Curt. (R.W.G. Dennis), 1953, 186.
Naucoria montana Murr. = Agaricus helvoliceps Berk. et Curt., Galerina helvoliceps Berk. et Curt., Singer (R.W.G. Dennis), 1953, 187.
Naucoria submelinoides (Kühner) Maire = Alnicola submelinoides Kühner (R. Maire), 1930, 223.
Naucoria tepitensis Murr. = Naucoria subolivacea Murr. (R.W.G. Dennis), 1953, 181.
Tubaria minutalis Romagn. = Tubaria minima Lange (H. Romagnesi), 1942, 127.
Tubaria pygmaea Fr. ex Bull., non Quél. = Naucoria carpophila sensu Ricken (H. Romagnesi), 1942, 127.

B. Géophilées

Flammula abstrusa Fr. sensu Lange = Naucoria abstrusa Lange (H. Romagnesi), 1942, 142.

Flammula aureobrunnea Berk. et Curt., Sacc. = Agaricus aureobrunneus Berk. et Curt., Flammula earlei Murr., Flammula subpenetrans Murr., Gymnopilus aureobrunneus Berk. et Curt., Murr., Gymnopilus earlei Murr., Gymnopilus subpenetrans Murr. (R.W.G. Dennis), 1953, 171.

Flammula chrysopella Berk. et Curt., Sacc. = Agaricus chrysopellus Berk. et Curt., Agaricus chrysotrichus Berk. et Curt., Gymnopilus chrysopellus (Berk. et Curt.) Murr., Flammula et Gymnopilus chrysotrichus (Berk. et Curt.) Sacc., Murr., Flammula et Gymnopilus depressus Murr., Flammula et Gymnopilus hispidulus Murr., Flammula et Gymnopilus tenuis Murr., Flammula et Gymnopilus nashii Murr., Flammula et Gymnopilus parvulus Murr.,Flammula et Gymnopilus areolatus Murr. (R.W.G. Dennis), 1953, 169.

Hypholoma erinaceum Pers. = Hypholoma elongatum ss. Ricken (R. Kühner), 1936, 30.

Hypholoma scobinaceum Fr. = Hypholoma lepidotum Bres., Hypholoma melantinum Fr. (P. Konrad), 1929, 36.

Hypholoma udum auct. mult. = Hypholoma polytrichi sensu Konrad (R. Kühner), 1936, 30.

Pholiota discolor Peck., Sacc. = Agaricus discolor Peck. (R.W.G. Dennis), 1953, 173.

Pholiota preacox Quél. = Pholiota dura Quél. (M. Barbier), 1929, 250.

Stropharia depilata Pers. = Stropharia percevalii de Killermann (M. Moser), 1949, 178.

Stropharia epimyces (Peck.) Atk. = Stropharia coprinophila Atkin. (E.J. Gilbert), 1930, 75.

Stropharia semiglobata (Fr. ex Batsch.)Quél. = Stropharia stercoraria (Fr. ex Bull.) Quél. (P. Konrad), 1927, 150.

C. Bolbitiées

Agrocybe broadwayi (Hebeloma Murr.) (R.W.G. Dennis), 1953, 179.

Agrocybe sacchari Murr. = Hebeloma cubense Murr., Naucoria sacchari Murr. (R.W.G. Dennis), 1953, 180.

Agrocybe tuberigena Quél. = Agrocybe arvalis sensu Josserand, Naucoria sclerotigera Vel., Naucoria temulenta sensu Ricken non Fr. (H. Romagnesi), 1942, 127.

Agrocybe vervacti (Fr.) sensu Lange = Agrocybe pediades Fr. (H. Romagnesi), 1942, 127.

Bolbitius broadwayi (Pholiota Murr.) (R.W.G. Dennis), 1953, 193.

Bolbitius mexicanus Murr. = Mycena mexicana Murr. (R.W.G. Dennis), 1953, 193.

Conocybe crispa (Longyear) Singer = Agaricus flocculentus Fr., Galera crispa (Longyear) Singer, Galera grisea Earle, Galera lactea f. semiglobata Lange, Galera simulans Earle, Galerula crispa (Longyear) Murr. (R.W.G. Dennis), 1953, 188.

Conocybe lactea Lange = Galera lateritia (Fr.) Ricken, Kühner (G. Métrod), 1940, 48.

Conocybe microspora (Galera Vel.) (R.W.G. Dennis), 1953, 189.

Panaeolus guttulatus Bres. = Psilocybe aleuriata Heim et Remy (R. Kühner), 1926, 230.

Panaeolus solidipes Peck. = Panaeolus semi-ovatus f. exannulatus

Pearson, Panaeolus teutonicus Bride et Métr. (L. Imler), 1951, 443.

COPRINACEES

Coprinus auricomus (Pat.) = Coprinus crenatus Rick. (Kühner et Josserand), 1934, 53.
Coprinus boudieri Quél. = Coprinus angulatus Peck. (Josserand), 1938, 131.
Coprinus dilectus Fr. = Coprinus oblectus Quél. non Bolton. (P. Heinemann et M. Josserand), 1941, 46.
Coprinus erythrocephalus (Lév.) Fr. = Coprinus dilectus Lange, non Fr. (P. Heinemann et M. Josserand), 1941, 39.
Coprinus heterosetulosus Locq. = Coprinus ephemerus Josserand, Coprinus ephemerus var. saturatus Lange (M. Locquin), 1947, 76.
Coprinus lagopus Fr. et auct. plur., non Buller. = Coprinus radiatus Fr. (R. Kühner et M. Josserand), 1944, 29.
Coprinus plicatilis (Curt.) Fr. et Rick. = Coprinus hemerobius Rick. (R. Kühner et M. Josserand), 1934, 55.
Coprinus pseudo-radiatus Kühner et Josserand = Coprinus radiatus ss. Rea (R. Kühner et M. Josserand), 1944, 26.
Coprinus radiatus Fr., Quél., Massee = Coprinus curtus Kalch., Coprinus lagopus Buller. (R. Kühner et M. Josserand), 1944, 23.
Drosophila bipellis Quél. = Psathyra bifrons Quél., non Berk., Psathyra bipellis Quél., Psathyra corrugis Rick., non Fr. (G. Malençon et H. Romagnesi), 1953, 122.
Psathyra barlae Bres., A.H. Smith, Pearson = Agaricus helobius Kalchbr., Psathyra bipellis Quél., ss. Smith, Psathyra corrugis ss. Ricken (G. Malençon et H. Romagnesi), 1953, 112 et 118.

LEPIOTACEES

Cystoderma amianthinum (Scop. ex Fr.) Fayod, Smith et Singer = Agaricus amianthinus Scop., Agaricus granulosus subsp. amianthinus Fries, Armillaria amianthina Kauffman (M. Locquin), 1951, 70.
Cystoderma amianthinum var. album Maire, Smith et Singer = Lepiota amianthina var. alba Maire in Rea (M. Locquin), 1951, 71.
Cystoderma amianthinum var. longisporum Kühner = Lepiota amianthina var. longispora Kühner (M. Locquin), 1951, 72.
Cystoderma carcharias Persoon ex Fayod, Smith et Singer = Agaricus carcharias Pers. ex Secrét., Agaricus granulosus Fr., Agaricus granulosus var. carcharias Fr., Agaricus granulosus ssp. incarnata albida Fr., Lepiota granulosa var. carcharias Gillet, Armillaria carcharias Kauffman, Lepiota carcharias Karsten, Barla, Boudier et Bresadola (M. Locquin), 1951, 75.
Cystoderma cinnabarinum (Alb. et Schw.) Fayod, Singer et Smith = Agaricus cinnabarinus Fr., Agaricus granulosus cinnabari-

nus (Alb. et Schw.) ex Secr., Armillaria cinnabarina Kauffman, Lepiota cinnabarina Karst. (M. Locquin), 1951, 73.
Cystoderma granulosum (Batsch. ex Fr.) Fayod, Smith et Singer = Agaricus granulosus Batsch. ex Fr., Armillaria granulosa Kauffman, Lepiota granulosa Barla et Lange (M. Locquin), 1951, 77.
Cystoderma haematites (B. et Br.) Kühner et Maire = Agaricus haematites (Berk. et Broome), Collybia lilacea Quél. f. robusta Konrad et Maublanc, Lepiota haematites Ricken et Lange (M. Locquin), 1951, 79.
Lépiotes (Synonymie générale des) (M. Locquin), 1952, 267.
Lepiota acutesquamosa f. typica Weinm. = Lepiota hystrix Moller et Lange (R. Kühner), 1936, 209.
Lepiota acutesquamosa f. furcata nov. nom. = Lepiota acutesquamosa Lange (R. Kühner), 1936, 210.
Lepiota brunneo-incarnata Chod. et Mart. = Lepiota barleana (R. Kühner et R. Maire), 1934, 17.
Lepiota grangei (Eyre) Lange = Lepiota ochraceo-cyanea Kühner (M. Locquin), 1944, 41 et 52.
Lepiota helveola Barla = Lepiota brunneo-incarnata Chod. et Mart. (M. Josserand), 1931, 71.
Lepiota holoserica (Fr.) Cooke = Lepiota pudica Bull. f. cinereo-lilacina (M. Barbier), 1927, 216.
Lepiota menieri Sacc. = Lepiota littoralis Menier (R. Kühner et R. Maire), 1934, 17.
Lepiota naucina Fr. = Lepiota pudica Bull. (P. Brébinaud), 1930, 78.
Lepiota subalba Kühner = Lepiota albosericea Lange (R. Kühner), 1936, 233.
Lepiota subgracilis Kühner = Lepiota gracilis ss. Lange (R. Kühner), 1936, 231.
Psalliota (Agaricus) vaporarius Vitt. = Psalliota (Agaricus) villaticus Brondeau ss. Cooke, non Bres. (P. Heinemann), 1952, 383.
Pseudobaeospora cygnea Locq. = Lepiota Lange (M. Locquin), 1952, 169.
Pseudobaeospora serena Locq. = Lepiota Fr. (M. Locquin), 1952, 169.
Pseudobaeospora sericifera Locq. = Lepiota sericea Cool. (M. Locquin), 1952, 169.

VOLVARIACEES

Agaricus pluteus Batsch. ex Fr. = Agaricus cervinus Schaeff. ex Fr. (R.W.G. Dennis), 1953, 149.
Pluteus aethalus Berk. et Curt., Sacc. = Agaricus aethalus Berk. et Curt., Agaricus tephrostrictus Berk. et Curt., Pluteus tephrostrictus Berk. et Curt., Sacc. (R.W.G. Dennis), 1953, 152.
Pluteus cervinus Schaeff. var. atromarginatus Konrad = Pluteus umbrosus Bres. non Ricken (P. Konrad), 1927, 148.
Pluteus cubensis Murr. = Nolanea cubensis Murr., Pluteus fibrillosus Murr. (R.W.G. Dennis), 1953, 155.
Pluteus laetifrons Berk. et Curt., Sacc. = Agaricus laetifrons Berk. et Curt., Sacc. (R.W.G. Dennis), 1953, 152.
Pluteus umbrosus Pers. ex Rick. ss. Lange, Rea, Konr. et Maub.,

Romag., non Quél., nec Bres. = Pluteus roberti Boud. non Fr. nec Gillet (M. Locquin), 1943, 36.

Volvaria bakeri (Murr.) Sacc. et Trott. = Volvariopsis bakeri Murr.(R.W.G. Dennis), 1953, 147.

Volvaria bombycina Pers. = Agaricus bombycinus Pers. ex Fr., Agaricus thwaitesii Hook apud Berk., Volvaria ilicicola Speg., Volvaria thwaitesii Hook, Sacc., Volvariella bombycina Pers. ex Fr., Singer, Volvariopsis bombycina Pers. ex Fr., Murrill (R.W.G. Dennis), 1953, 146.

Volvaria esculenta Massee = Agaricus coffeae Viviani, Boletus moschocaryanus Rumphius, Boletus sanguineus Rumphius, Volvaria bakeri (Murr.) Sacc. et Trott., Volvaria bresadolae Trotter, Volvaria esculenta Bres., Volvaria volvacea Heim (R. Heim), 1947, 121.

Volvaria pseudovolvacea Berk. et Br. = Agaricus pseudovolvaceus Berk. et Br. (R.W.G. Dennis), 1953, 148.

AMANITACEES

Amanita amici Gillet = Amanita aemilii Riel., Amanita eliae Quél., Amanita muscaria var. umbrina Gill., Amanita pantherina var. extria (E.J. Gilbert), 1930, 162.

Amanita baccata (Fr.) Bres. = Agaricus baccatus Fr., Amanita barlae Barla et Bres., Amanita coccola Barla, Amanita coccola var. barlae Quél., Amanita ovoidea var. cocolla Quél., Amanita recutita Barla, Amanita volvata Peck. (E.J. Gilbert), 1925, 287,et 1929, 129.

Amanita lepiotoides Barla = Amanita barlae Quél. (E.J. Gilbert), 1926, 273, et 1929, 129.

Amanita ovoidea Bull. = Amanita corticelli Krieger, Volvaria corticelli Krieger (E.J. Gilbert), 1929, 137.

Amanita solitaria Fr. = Amanita pellita Gill. (E.J. Gilbert), 1925, 289.

Amanita solitaria Fr. = Amanita baccata Fr., Bres., Amanita strobiliformis Quél. (E.J. Gilbert), 1926, 280.

Amanitopsis crocea Quél. = Amanita vaginata var. crocea Quél., Amanita fulva f. aurantiofulva Gilbert (E.J. Gilbert), 1928, 161.

Amanitopsis umbrinolutea Secrét. = Amanita vaginata var. spadiceozonata, Amanitopsis battarae Boud. (E.J. Gilbert), 1928, 164.

Lepidella echinocephala Vitta. = Agaricus echinocephalus Fr. et Vittad., Agaricus solitarius Bull., Amanita echinocephala Quél., Amanita echinocephala var. bicollariata Boudier, Amanita flaudinia Plée, Amanita strobiliformis Quél., Amanita strobiliformis var. aculeata Quél., Hyphophyllum tricuspidatum Paulet, Lepiota echinocephala Gillet (E.J. Gilbert), 1925, 304.

Lepidella vittadinii Moretti = Agaricus vittadinii Moretti, Amanita umbella Quél., Amanita vittadinii Vittad., Lepiota vittadinii Krombholz (E.J. Gilbert), 1925, 296.

RUSSULACEES

Lactarius aspideus Fr. = Lactarius flavidus Boud., Lactarius hometi Gill., Lactarius roseo-violascens Lasch., Lactarius uvidus Quél. (P. Konrad), 1935, 166.

Lactarius azonites Bull. (1792) = Lactarius fuliginosus Fr. (1838), Lactarius lignyotus Fr. (1857), Lactarius picinus Fr. (1836), Lactarius squalidus Kromb. (1831) (P. Dumée et A. Leclair), 1925, 80.

Lactarius bruensis Roll. = Lactarius aurantiacus Bres., Lactarius tithymalinus Quél. non Fr. (L. Joachim), 1938, 21.

Lactarius cyathula Fr. = Lactarius cupularis Bull. (P. Konrad), 1935, 174.

Lactarius lignyotus Fr. = Lactarius geminus Karst. (P. Konrad et J. Favre), 1935, 144.

Lactarius mitissimus Fr. = Lactarius aurantiacus Bres. (P. Konrad), 1935, 171.

Lactarius piperatus Scop. = Lactarius pergamenus Swartz. (P. Dumée et A. Leclair), 1925, 79.

Lactarius plumbeus Fr. ex Bull. = Lactarius necator Pers. non Bull., Lactarius sordidus Peck., Lactarius turpis Weinmann (P. Konrad et J. Favre), 1935, 131.

Lactarius repraesentaneus Britz. = Lactarius aspideus ss. Romell, Lactarius scrobiculatus var. violascens Fr., Lactarius speciosa Burlingham, Lactarius terminosus var. violascens Karst. (P. Konrad), 1935, 162.

Lactarius rufus Fr. ex Scop. = Hypophyllus torminosus Paulet, Lactarius capsicum Cooke non Schulzer (P. Konrad et J. Favre), 1935, 150.

Lactarius subumbonatus Lindgren = Agaricus innocus Kicks., Lactarius cimicarius Gillet (P. Konrad), 1935, 181.

Lactarius tabidus Fr. = Agaricus deliciosi-folius Secr., Lactarius isabellinus Burl. (P. Konrad et J. Favre), 1935, 153.

Lactarius theiogalus Fr. = Lactarius decipiens Quél., Lactarius hepaticus Plowright, Lactarius rubescens Bres. (P. Konrad), 1935, 176.

Lactarius terminosus Fr. ex Schaef. = Lactarius necator Bull. non Persoon (P. Konrad et J. Favre), 1935, 128.

Lactarius trivialis Fr. = Lactarius curtus Britz., Lactarius deflexus Lindb., Lactarius fascinans Fr., Lactarius obliquus Fr. in Cooke (P. Konrad et J. Favre), 1935, 142.

Lactarius uvidus var. violascens (Otto) Sacc., Rick. = Lactarius luridus Pers., Lactarius maculatus Peck., Lactarius uvidus Bres. (P. Konrad et J. Favre), 1935, 135.

Lactarius volemus Fr. = Lactarius dycmogalus Bull., Lactarius hygrophoroides Berk. et Curt., Lactarius ichoratus Fr. ex Batsch., Lactarius lactifluus Schaeff., Lactarius oedematopus Scop., Lactarius testaceus Alb. et Schw. (P. Konrad), 1935, 168.

Lactarius zonarioides Kühner et Romag. = Lactarius zonarius ss. Konr. et Maub. (R. Kühner et H. Romagnesi), 1953, 365.

Russula abietina Peck. = Russula turci Bres., Peck., Sing., Schaef., Russula lateritia Quél. ss. Melzer et Zvara, J. Schaeffer (R. Singer), 1938, 157.

Russula adusta Fr. ex Pers. = Russula albonigra (Krombh.) Fr. (P. Konrad et M. Josserand), 1934, 263.

Russula aeruginea Lindb. = Russula furcata auct. mult., Russula graminicolor Quél. et auct. mult., Russula smaragdina Quél.

(P. Konrad et M. Josserand), 1934, 268 ; (H. Romagnesi), 1945, 34.

Russula albo-citrina Barbier = Russula disparilis Burl., Russula farinipes Singer, Russula solaris Schaef. (P. Brébinaud), 1931, 98.

Russula allescheri Singer = Russula veternosa Fr., Desmazières, Russula nauseosa var. atropurpurea Bres. (L. Blum), 1953, 73, et 1954, 400.

Russula laternata (Melz.) Blum = Russula romellii var. alternata (L. Blum), 1954, 398.

Russula alutacea Fr. ex Pers. = Russula xerampelina var. alutacea Quél. (P. Konrad et M. Josserand), 1934, 268.

Russula alutacea var. olivacea (Fr.) Lange - Russula olivascens Peltereau non Fr. (P. Konrad et M. Josserand), 1934, 268.

Russula alutacea ssp. romellii (Maire) Singer = Russula alutacea ssp. eualutacea Singer (R. Singer), 1938, 153.

Russula amoena Quél. = Russula punctata Gillet non Kromb. (M. et Mme F. Moreau), 1930, 128 ; (M. Josserand), 1933, 353.

Russula amoena Quél. = Russula du portii Phill., Russula olivascens Fr. pro parte (J. Zvara), 1931, 266.

Russula amoena Quél. = Russula citrina Quél., Russula violeipes Quél., Russula punctata ss. Gillet (P. Konrad et M. Josserand), 1934, 264.

Russula atropurpurea Krombh. = Russula rubra Cooke non Fr., Russula atrorubens Quél., Russula clusii Bataille (P. Konrad et M. Josserand), 1934, 266.

Russula aurora Krhz. = Russula rosea Quél., Russula uncialis Peck. (V. Melzer et J. Zvara), 1928, 141.

Russula badia Quél. = Russula nitida Fr. ex Pers. (P. Konrad et M. Josserand), 1934, 266.

Russula borealis Kauffm. = Russula melzeri Zv. (R. Singer), 1939, 253.

Russula brunneoviolacea Crawshay = Russula pseudoviolacea Joachim (P. Konrad et M. Josserand), 1934, 269.

Russula caerulea Cooke = Russula amethystina Bres. non Quél. (P. Konrad et M. Josserand), 1934, 268.

Russula chameleontina Fr. = Russula amethystina Quél., Russula caerulea Krombh., Russula turci Bres. pro parte (J. Zvara), 1931, 153.

Russula chameleontina Fr. = Russula armeniaca Cooke (P. Konrad et M. Josserand), 1934, 269.

Russula cinnabarina Berk. = Russula emetica ssp. fragilis Pers., Singer (R. Singer), 1939, 260.

Russula citrinochlora Sing. = Russula citrina Bres. non Gill., Quél., Russula chlora Sing. non Melzer-Zvara (R. Singer), 1938, 137.

Russula consobrina Fr. = Russula livescens Quél. (Batsch.) (V. Melzer et J. Zvara), 1928, 145.

Russula consobrina Fr. = Russula livescens (Batsch.) Quél., var. sororia Fr. et var. intermedia Cooke (P. Konrad et M. Josserand), 1934, 265.

Russula consobrina var. sororia Fr. = Russula pectinata Bull. (V. Melzer et J. Zvara), 1928, 145.

Russula consobrina var. rufescens Niol. et Schaef. = Russula decolorans Fr. var. constans (Britz.) Singer (non Konrad, Favre, Josserand et Maublanc = Russula ochroleuca Fr.) (P. Niolle), 1944, 105.

Russula constans Karst. non Britz., Crawshay = Russula flava Romell (P. Konrad et M. Josserand), 1934, 265.

Russula cyanoxantha Fr. = Russula furcata auct. mult. (P. Konrad et M. Josserand), 1934, 264.
Russula depallens Fr. = Russula luteoviolacea Krombh. (V. Melzer et J. Zvara) 1928, 145.
Russula fellea Fr. = Russula ochracea Schum. et auct. mult. (P. Konrad et M. Josserand), 1934, 265.
Russula flava Romell = Russula claroflava Grove non Cooke, Massee, Rea, Singer, Russula constans Karst. non Britz. (P. Konrad et M. Josserand), 1934, 267.
Russula foetens var. minor Sing. = Russula foetens var. subfoetens Schaef., Russula subfoetens Smith (R. Singer), 1938, 135.
Russula fragilis Fr. ex Pers. = Russula nivea Pers. (P. Konrad et M. Josserand), 1934, 266.
Russula grisea Gill. = Russula palumbina Quél. (H. Romagnesi), 1945, 34.
Russula heterophylla Fr. = Russula livida Schroeter ex Pers. (P. Konrad et M. Josserand), 1934, 264.
Russula intensior Romagn. = Russula versicolor Schaeff. pro parte (J. Blum), 1951, 171.
Russula intensior f. laeticolor Romagn. = Russula versicolor Schaeff. pro parte (J. Blum), 1951, 171.
Russula kauffmaniana Sing. = Russula vinosa f. kauffmaniana Sing., Russula obscura Kauff. non Romagnesi (R. Singer), 1939, 258.
Russula laurocerasi Melz. = Russula subfoetens ss. Gill. (P. Konrad et M. Josserand), 1934, 265.
Russula lepida Fr. = Russula alba Quél., Russula aurora Krombh., Russula linnaei Fr. (P. Konrad et M. Josserand), 1934, 264.
Russula lutea Fr. = Russula vitellina Fr. ex Pers. (P. Konrad et M. Josserand), 1934, 269.
Russula luteotacta Rea = Russula sardonia Bres. non Fr. (P. Konrad et M. Josserand), 1934, 266.
Russula maculata Quél. = Russula constans Britz. ss. Romagnesi (P. Niolle), 1944, 105.
Russula mairei Singer = Russula lepida var. amara Maire (P. Konrad et M. Josserand), 1934, 264.
Russula mesospora Singer = Russula pulcherrima Lund. et Schaeff., Russula tenuiceps Kauffm. (R. Singer), 1938, 161.
Russula minutula Vel. = Russula uncialis Melz.-Zvara (H. Romagnesi), 1943, 70.
Russula murrillii Burl. = Russula punctata Krombh. (R. Singer), 1939, 252.
Russula mustelina Fr. = Russula fusca Quél. (M. Josserand), 1930, 195.
Russula mustelina Fr. = Russula elephantina Fr. (J. Favre), 1939, 229.
Russula ochroleuca Fr. ex Pers. = Russula citrina Gill. non Quél., Russula claroflava Cooke, Massee, Rea, Singer non Grove, Melzer et Zvara, Bataille, Russula constans Britz. non Karst., Crawshay, Russula fingibilis Britz., Russula granulosa Cooke, Russula raoulti Quél. (P. Konrad et M. Josserand), 1934, 265.
Russula operta Kauffm. non Burl. = Russula puellaris Fr. var. minutabilis Britz., Singer (R. Singer), 1939, 272.
Russula palumbina Quél. = Russula cutifracta Cooke, Russula grisea Gill., Bres., Maire (P. Konrad et M. Josserand), 1934, 268.
Russula pectinata Fr. ex Bull. = Russula insignis Quél. ss. Bataille (P. Konrad et M. Josserand), 1934, 265.

Russula pseudointegra Arn. et Goris = Russula veternosa Lindb. (P. Konrad et M. Josserand), 1934, 267.
Russula punctata Krombh. = Russula depallens Secr., Russula vesca Ricken (V. Melzer et J. Zvara), 1928, 141.
Russula punctata Krombh. = Russula vinosa Linbh. (V. Melzer), 1934, 223.
Russula queleti Fr. = Russula sardonia Ricken (P. Konrad et M. Josserand), 1934, 266.
Russula romellii Maire = Russula integra Quél. non Fr. (M. et Mme F. Moreau), 1929, 98, et 1930, 138.
Russula roseipes ssp. dictyospora Sing. = Russula clavipes Kauffm. (R. Singer), 1939, 272.
Russula rubra Krombh. = Russula rubicunda Quél. (P. Konrad et M. Josserand), 1934, 267.
Russula rubra Fr. sensu Bres. = Russula media Kauffm. (S. Singer), 1939, 254.
Russula sardonia Fr. = Russula chrysodacrion Singer, Russula drimeia Cooke, Vel., Russula expallens Gill., Russula rubrocaerulescens Schwalb., Russula sanguinea Michael (V. Melzer et J. Zvara), 1928, 190 ; (F. Bataille), 1933, 439 ; (P. Konrad et M. Josserand), 1934, 266.
Russula schiffneri Singer = Russula veternosa Schaeff. (J. Blum), 1953, 62.
Russula seperina Dupain = Russula rubescens Beardslec., Russula punctata Krombh. var. seperina (P. Konrad et M. Josserand), 1934, 267.
Russula sphagnophila Kauffm. = Russula betulina Melzer, Russula paludosa Voile, Russula roseipes Secr. (A. Leclair), 1932, 305.
Russula sphagnophila Kauffm. = Russula betulina Melzer, Russula venosa Vel. (H. Romagnesi), 1942, 165.
Russula sphagnophila var. americana Sing. = Russula sphagnophila Kauffm. (R. Singer), 1938, 149.
Russula sphagnophila var. europaea Sing. = Russula betulina Melzer non Burl., Russula paludosa Voile non Britz., Russula roseipes var.Cooke, Russula sphagnophila Singer, Russula venosa J. Schäffer non Velen. (R. Singer), 1938, 150.
Russula subfoetens W.G. Smith = Russula farinipes Romell, Russula simillima Peck. (V. Melzer et J. Zvara), 1928, 145 ; (V. Melzer), 1932, 200 ; (P. Konrad et M. Josserand), 1934, 265.
Russula subpunctata Kauffm. = Russula rubicunda Quél. ss. Bataille (R. Singer), 1939, 264.
Russula subveternosa Kauffm., Sing. = Russula lundelii Singer (R. Singer), 1939, 275.
Russula turci Bres. = Russula amethystina Quél. (V. Melzer et J. Zvara), 1928, 144 ; (P. Konrad et M. Josserand), 1934, 269.
Russula velenovskii Melzer et Zvara var. rhodella ss. Romagnesi, Niolle, non Russula rhodella Gilbert = Russula lutea Hudson (P. Niolle), 1944, 104.
Russula venosa Velen. = Russula betulina Melzer, Russula paludosa Voile, Russula sphagnophila Singer (P. Konrad et M. Josserand), 1934, 269.
Russula versicolor Schaeff. = Russula serotina Melzer et Zvara (P. Konrad et M. Josserand), 1934, 269.
Russula veternosa Fr. = Russula persicina Krombh. (P. Konrad et M. Josserand), 1934, 266.
Russula veternosa Bres. = Russula bresadoliana Singer (J. Blum), 1953, 74.
Russula vinosa Quél. = Russula decolorans var. obscura Romell,

Russula obscura Romell, Russula punctata Krombh. var. obscura Romell non sensu Gill. (P. Konrad et M. Josserand), 1934, 267.

Russula vinosa Lindb. = Russula solitaria Kauffm. (R. Singer), 1939, 257.

Russula vinosopurpurea J. Schäf. = Russula constans Britz. ss. Romagnesi, Russula pseudoemetica (Secrét.) Sing. var. vinosopurpurea (J. Sch.) Sing. (P. Niolle), 1944, 105.

Russula violacea Quél. = Agaricus fragilis violascens Secrét., Russula cavipes Melz. et Zva., Russula olivaceo-violascens Gill. (P. Konrad et M. Josserand), 1934, 266.

Russula virescens Fr. ex Schaeff. = Russula aeruginosa Krombh. (P. Konrad et M. Josserand), 1934, 264.

Russula xerampelina Schaeff. = Russula atrorosea Schwalb., Russula atrosanguinea Vel., Russula barlae Quél., Russula erythropus Fr., Russula fragilis var. mitis Krhz., Russula fusca Quél., Russula olivascens Fr., Russula du portii Massee, Russula pulcherrima Secrét., Russula quercetorum, pruinosa et clavipes Velen., Russula rhytipus et tinctoria Secr., Russula vesca Massee, Russula mustelina Krhz., Russula ochracea A. et S., Russula ravida Fr., Russula xantophaea Boudier (V. Melzer et J. Zvara), 1927, 275.

Russula xerampelina Schäff., Fr. = Russula squalida P.K. (R. Singer), 1939, 255.

Russula xerampelina Fr. ex Schaeffer et var. erythropoda (Peltereau ex Fr.) R. Maire = Russula graveolens Romell f. rubra Britz., Sing., Russula linnaei Ricken, Michael non Fr., Russula purpurea Lange, Russula sanguinea var. linnaei Quél., Russula xerampelina var. linnaei Melz. et Zvara (P. Konrad et M. Josserand), 1934, 268.

GASTEROMYCETES

Anthurus aseroiformis Mc Alpine = Anthurus muellerianus Kalchbr. f. aseroiformis E. Fischer, Anthurus macowar Marloth (R. Maire), 1930, 227.

Anthurus aseroiformis Maire = Aseroe lysuroides E. Fischer, Lysurus aseroiformis Corda (R. Maire), 1930, 229.

Bovistella radicata (Mont.) Pat. = Bovistella ohiensis Ellis et Morgan, Lycoperdon radicatum Montagne (A. Pilat), 1937, 102.

Gastrosporium Mattir. = Leucorrhizon Velen. (A. Pilat), 1934, 38.

Gastrosporium simplex Mattir. = Gastrosporium beccarianum Lloyd, Leucorrhizon nidificum Velen. (A. Pilat), 1934, 39.

Leucogaster nudus (Hazl.) Hollos = Hydnangium nudum Hazslinsky, Hydnangium virescens Quél., Bat., Leucogaster luteomaculatus Zel. et Dod., Leucogaster liosporus (Hesse) Sacc., Octaviana gautieria pityophila Becker, Octaviana silesiaca Becker (A. Pilat), 1937, 263.

Lycoperdon hirtum Martius et Quélet = Lycoperdon umbrinum Pat. et Pers. (P. Brébinaud), 1931, 103.

Lycoperdon marginatum Vitt. = Lycoperdon candidum (Pers.) Bres., Lycoperdon cruciatum Rostk., Lycoperdon papillatum Schaeff., Lycoperdon separans Peck. (P. Brébinaud), 1931, 103.

ADELOMYCETES ou HYPHOMYCETES

ou

FUNGI IMPERFECTI

HYPHALES ou MOLINIALES

A. Mucédinées

Centrospora (Genre) Neegard = Anoatospora Neuhall (G. Arnaud), 1952, 206.
Costantinella cristata Matr. = Pachybasium tilletii Desm., Verticillium pyramidale Bon (G. Arnaud), 1952, 190.
Cylindrocladium macrosporum Sherbakoff var. hederae = Candelospora citri Faw. et Kl., Tetracytum lauri Vanderwalla (G. Arnaud), 1952, 205.
Fusicladium aronici Sacc. = Scolechotrichum aronici Schroeter (G. Kuhnholtz-Lordat), 1948, 121.
Fusicladium orbiculatum (Desm.) Thuem. = Fusicladium dendriticum Wallr., Fuck var. sorbinum Sacc. (G. Kuhnholtz-Lordat), 1948, 122.
Ovularia haplospora Spegazz. = Ramularia haplospora Spegazz. (Dr T. Rayss), 1933, 406.
Palmomyces deliensis Maire = Andreana deliensis Palm. et Jochems (R. Maire), 1927, 42.
Ramularia calcea Desm. = Fusisporium calceum Desm. (Dr T. Rayss), 1933, 407.
Ramularia geranii Westend. = Fusidium geranii Westend. (Dr T. Rayss), 1933, 406.
Ramularia lampsanae Desm. = Oidium fusisporioides Fr. var. lampsanae Desm. (Dr T. Rayss), 1933, 409.
Ramularia punctiformis Schlecht. = Fusidium punctiforme Schlecht. (Dr T. Rayss), 1933, 407.
Ramularia punctiformis (Schlecht.) v. Hoehn. = Ramularia montana Spegazz. (G. Kuhnholtz-Lordat), 1948, 129.

B. Dématiées

Acremoniula sarcinellae (Acremoniella Pat. et Har.) (G. Arnaud), 1953, 268.
Alternaria solani Sorauer. = Macrosporium solani E. et M. (G. Kuhnholtz-Lordat), 1948, 119.
Arthrinium curvatum Corda = Camptoum curvatum Corda (G. Arnaud), 1953, 274.
Aureobasidium pullulans (de Bary) Arnaud = Aureobasidium vitis Viala et Boyer, Dematium pullulans de Bary, Pullularia pullulans Berk. (G. Arnaud), 1953, 268.
Basitorula cephalosporioides (Torula v. Beyma) (G. Arnaud), 1953, 276.
Bispora antennata (Monilia Pers.) (G. Arnaud), 1953, 282.
Bispora punctata (Torula Corda) (G. Arnaud), 1953, 282.

Brachydesmium claviforme (Clasterosporium Preuss.) (G. Arnaud), 1953, 287.
Candelabrum spinulosum Bev. = Dionysia coronata Arn. (G. Arnaud), 1953, 303.
Carlosia meliolae (Spegazzinia Zimm.) (G. Arnaud), 1953, 294.
Ceratophorum intermedium (Coryneum Sacc.) (G. Arnaud), 1953, 287.
Chalara variospora (Endoconidiophora Dav.) (G. Arnaud), 1953, 278.
Chloridiella leucopoda (Acrotheca Bon.) (G. Arnaud), 1953, 270.
Cladosporium Link. = Hormodendron Bon. (G. Arnaud), 1953, 276.
Cladosporium herbarum (Pers.) Link. = Dematium herbarum Pers. (G. Arnaud), 1953, 410.
Clasterosporium carpophilum (Lév.) Aderh. = Coryneum bejerinckii Oudem. (Dr T. Rayss), 1946, 203.
Coniosporium duplicatum Maire = Coniosporium punctiforme Sacc. (R. Maire), 1930, 244.
Cylindrotrichum Bon. = Cylindrium Preuss. (G. Arnaud), 1953, 278.
Cylindrotrichum inflatum Bon. = Menispora cylindrosperma Corda, 1953, 279.
Goidanichia scopula (Scopularia Goid.) (G. Arnaud), 1953, 281.
Gomphinaria amaena Preuss. = Acrotheca amaena (Preuss.) Sacc. (G. Arnaud), 1953, 270.
Gomphinaria atra Preuss. = Acrotheca atra (Preuss.) Sacc. (G. Arnaud), 1953, 279.
Graphiothecium parasiticum (Desm.) Sacc. = Stysanus parasiticus Desm. (Dr T. Rayss), 1933, 411.
Helicodendron lombricoides Sacc. = Helicomyces lombricoides Sacc. (G. Arnaud), 1953, 292.
Helicoon elegans (Sporidesmium Corda) (G. Arnaud), 1953, 294.
Isariopsis alborosella (Desm.) Sacc. = Stysanus albo-rosellus Desm. (Dr T. Rayss), 1933, 410.
Macrosporium cookei Sacc. = Macrosporium solani Cooke (Dr T. Rayss), 1933, 410.
Nigrospora Zimm. = Acremoniella Sacc., Basisporium Molliard, Monopodium Del. (G. Arnaud), 1953, 268.
Questierella ramundii (Sarcinella Sacc.) (G. Arnaud), 1953, 287.
Rhinotrichella grisea (Rhinotrichum Sacc.) (G. Arnaud), 1953, 272.
Sarcinella questieri (Desm.) Arn. = Coniothecium questieri Desm., Sarcinella variospora (G. Arnaud), 1953, 294.
Scolecotrichum roumegueri Cav. = Napicladium laxum Bubak (G. Arnaud), 1953, 282.
Spondylocladium macrocarpum Grév. = Helminthosporium macrocarpum Grév. (G. Arnaud), 1953, 288.

MELANCONIALES

Colletotrichum gloeiosporioides Penz. = Vermicularia gloeiosporioides Penz. (Dr T. Rayss), 1933, 404.
Marssonina truncatulata Sacc. = Gloeosporium truncatulatum Sacc. (Dr T. Rayss), 1933, 405.
Septogloeum ulmi Wallr. = Phleospora ulmi Wallr. (Dr T. Rayss), 1933, 405.

SPHAERIOIDALES ou SPHAEROPSIDALES

Aposphaeria violacea Bertel = Phoma pigmentivora Massee (Mme Nicot-Toulouse), 1952, 352.

Ascochytulina Petrak = Ascochytella Petrak, Pseudodiplodia Karst. (Ch. Zambettakis), 1954, 345.

Asteroma juncaginearum Rabenh. = Ectostroma triglochinis Oudem. (Dr T. Rayss), 1933, 403.

Botryodiplodia Sacc. = Botryodiplis Clem., Botryosphaeris Clem., Botryosphaerostroma Petr., Nothopatella Sacc., Pseudopatella Speg., Traversoa Sacc. (Ch. Zambettakis), 1954, 221, 309.

Botryodiplodia amelanchieris Ell. et Fairm. = Diplodia pedilanthi Syd. (Ch. Zambettakis), 1954, 312.

Botryodiplodia caespitosa (B. et Br.) Grove = Botryodiplodia acacigena Penz. et Sacc., Botryodiplodia hederae Jaap., Diplodia caespitosa B. et Br., Diplodia crataegi Fuck., et Diplodia rubicola Sacc. (Ch. Zambettakis), 1954, 315.

Botryodiplodia compacta (C. et Ger.) Sacc. = Botryodiplodia carpinea Sacc. et Briard., Botryodiplodia musangae P. Henn., Diplodia compacta C. et Ger., Diplodia roumegueri Sacc. var. santonensis Brun. (Ch. Zambettakis), 1954, 317.

Botryodiplodia compacta (C. et Gr.) Sacc. f. hranicensis Petr. = Botryodiplodia hranicensis Petr. (Ch. Zambettakis), 1954, 317.

Botryodiplodia compressa (Cke) et Sacc. = Botryodiplodia dilleniae P. Henn., et B. pistaciae Cristinzio, Diplodia compressa Cke, D. liquidembaris Berk., D. populina Briard. (Ch. Zambettakis), 1954, 312.

Botryodiplodia congesta (Lév.) Sacc. = Botryodiplodia aesculina Passer., B. ailanthi (Cke) Sacc., B. akebiae Boudier, B. arengocarpa (Sacc.) Petr., B. chamaedorae P. Henn., B. evonymella (Trav. et Migl.) Petr., B. forsythiae (Jaap.) Cam., B. pyrenophora (Berk.) Sacc., B. pyrenophora f. sterilis et minor Wint., B. quercicola Pat., B. scabrosa (West.) Sacc., B. yaquensis Petr. et Cif., Diplodia ailanthi Cooke, D. akebiae Boudier, D. arengocarpa Sacc., D. congesta Lév., D. consimilis Dur. et Mont., D. scabrosa West. (Ch. Zambettakis), 1954, 314.

Botryodiplodia heterospora (Diplodia Syd.) (Ch. Zambettakis), 1954, 319.

Botryodiplodia heterospora (Syd.) f. toxicodendri Dearness. = Botryodiplodia compressa (Cke) Sacc. f. toxicodendri Dearness. (Ch. Zambettakis), 1954, 320.

Botryodiplodia juglandicola (Schw.) Sacc. = Botryodiplodia acerina Ell. et Ev., B. anceps Sacc. et Syd., B. aromatica Speg., B. malorum (Berk.) Petr. et Syd., B. memorabilis (Mars.) Petr., B. pallida Ell. et Ev., Diplodia acerina (Rehm.) Cke, D. indica Died., D. juglandicola (Schw.) Carr., D. malorum Fuck., D. piri Ell. et Mont. (Ch. Zambettakis), 1954, 310.

Botryodiplodia meliae (Ell. et Ev.) Sacc. = Botryodiplodia avellanaria Sacc., B. diospyri P. Henn., B. eucleae P. Henn., B. hypodermia (Sacc.) Petr., B. saccardiniana Bäuml., Diplodia hypodermia (Sacc.) Wr., D. langloisii Sacc. et Syd., D. meliae Ell. et Ev. et Fr. (Ch. Zambettakis), 1954, 310.

Botryodiplodia mixta (Schw.) Zamb. = Diplodia mixta Schw., D. frangulae f. heterospora Fautr. (Ch. Zambettakis), 1954, 318.

Botryodiplodia ravenelii Sacc. = Botryodiplodia malorum f. mespili Grove, B. pandani Lév., B. sorghi P. Henn., B. valdivians Speg. (Ch. Zambettakis), 1954, 315.
Botryodiplodia ravenelii Sacc. f. spathodeae Petr. = Botryodiplodia thespeciae Petr. et Cif. (Ch. Zambettakis), 1954, 316.
Botryodiplodia ribis (Fuck.) Petr. = Botryodiplodia ailanthi f. simplex Grove, B. araucariae (Delacroix) Petr. et Syd., B. austriaca Petr., B. lithreae Speg., Diplodia paliuri Becc., D. vincaecola Brun. (Ch. Zambettakis), 1954, 316.
Botryodiplodia ribis (Fuck.) Petr. f. majuscula Sacc. = Botryodiplodia majuscula Sacc. (Ch. Zambettakis), 1954, 316.
Botryodiplodia sphaerioides (Fr.) Sacc., Zamb. = Botryodiplodia calamina Sacc., B. celastri (Cke) Sacc., B. clusiae Petr., B. confluens (B. et Br.) Sacc., B. frangulae (Fuck.) Sacc., B. fraxini (Fr.) Sacc., B. fraxini f. orni (Fr.) Sacc., B. fraxini f. populi (Fr.) Sacc., B. fraxini f. synringae (Fr.) Sacc., B. fraxini f. typici (Fr.) Sacc., B. fraxini holotrichae Sav. et Sandu., B. rhois Sacc. et Petr., B. sophorae japonicae Sav. et Sandu., Diplodia carpophila Thüm., D. celastri Cke, D. confluens B. et Br., D. frangulae Fuck., D. fraxini Fr., D. loranthi Bres., D. sophorae Speg. et Sacc., D. sycina Mont., D. sycina var. carpophila Thüm., D. sycina var. syconophila Sacc., D. syconophila Sacc. (Ch. Zambettakis), 1954, 313.
Botryodiplodia valsoides (Peck.) Sacc., Zamb. (Diplodia Peck.) (Ch. Zambettakis), 1954, 311.
Botryodiplodia variispora (Died.) Zamb. (Diplodia Died.) (Ch. Zambettakis), 1954, 319.
Chaetodiplodia Karsten = Chaetoconis Clem., Chaetodiplis Clem. (Ch. Zambettakis), 1954, 221.
Chaetodiplodia anceps Passer. = Chaetodiplodia seaforthiae P. Henn., Died., Chaetodiplodia tiliacea P. Henn., Chaetodiplodia velata Rota-Rossi, Diplodia seaforthiae P. Henn. (Ch. Zambettakis), 1954, 275.
Chaetodiplodia anceps f. hirtella Sacc. = Chaetodiplodia hirtella Sacc., Diplodia hirtella Sacc. (Ch. Zambettakis), 1954, 275.
Chaetodiplodia arachnoidea (Ces.) Sacc. (Diplodia Ces.) (Ch. Zambettakis), 1954, 274.
Chaetodiplodia caesalpiniae Died. (Diplodia P. Henn.) (Ch. Zambettakis), 1954, 275.
Chaetodiplodia chaetomioides Sacc. (Diplodia Ces.) (Ch. Zambettakis), 1954, 274.
Darluca filum Bivon. = Sphaeria filum Biv. (Dr T. Rayss), 1933, 403.
Diplodia Fr. = Phloeospora Schulz., Sporocadus Cord. (Ch. Zambettakis), 1954, 221, 258.
Diplodia ailanthina Speg. = Diplodia amphisphaerioides Pass., D. harioti Mroblewski., D. marsdeniae Thüm., D. scorzonerae Pass., D. spiraeae Thüm., D. stachydis Politis, Diplodiella donacina Sacc. et D. Sacc. (Ch. Zambettakis), 1954, 267.
Diplodia ailanthina Speg. f. anglicae Grove = Diplodia saccardiniana Speg. f. anglicae Grove (Ch. Zambettakis), 1954, 267.
Diplodia biparasitica v. Höhn., Sacc. var. crataegi Allesch. = Hendersonia fructigena (Ch. Zambettakis), 1954, 343.
Diplodia cincta Fuck. = Diplodia akebiae Fairm., D. ephedricola Frag., D. genistae-tinctoriae Frag., D. grossulariae Sacc. et Schulz., D. hungariae Bubak., D. jatrophae P. Henn., D. litseae P. Henn., D. oenocarpi P. Henn., D. salvadorina Ah-

mad., D. siliquastri West. var. leguminum Hollos, Diplodiella ulmea Passer. (Ch. Zambettakis), 1954, 269.

Diplodia conigena Desm. = Diplodia pinastri Grove, D. pinastri var. cedri, D. pinicola B., D. pithyophila Fuck., D. pytyophila Fuck., Macrodiplodia conigena Desm. (Ch. Zambettakis), 1954, 271.

Diplodia cytisi Auersw. = Diplodia andicola Speg., D. androsaemi Sacc., D. bresadolae Tassi., D. convolvulii Dearn., D. dispersa B. et C., D. dracaena P. Henn., D. juniperi West. D. juniperi West. var. sabinae, D. nigricans Sacc., D. nucis Brun., D. petiolaris Peck., D. rheae Cke, D. styracis f. tassi, D. teucrii Frag., D. umbellulariae Ell. et Ev. (Ch. Zambettakis), 1954, 264.

Diplodia diversa Speg. = Diplodia albo-zonata Dur. et Mont., D. crataegi West. f. pyracanthae Grove, D. cyparissa Cke et Harkn., D. phyllodii Cke et Harkn., D. tulipiferae Died., D. virginiana Cke et Rav., Diplodiella diversa (Speg.) Sacc. (Ch. Zambettakis), 1954, 268.

Diplodia inconspicua Cke = Diplodia abiegna Maub., D. agni-casti Passer., D. anethi Fr., D. camelliae P. Henn., D. carpini Thüm., D. cisticola Brun., D. citri P. Henn., D. clematidea Sacc., D. clematidis Cke et Kalc., D. consociata B. et C., D. consors B. et Br., D. conspersa (Schw.) Cke, D. deodarae Thüm., D. galbulorum Brun., D. genistarum Cke, D. ivicola Ell. et Ev., D. meliae Sacc. et Roum., D. papillosa Bacc., D. plumbaginis Politis, D. sassafras Tracy et Earle, D. microsporella Sacc. f. leonicerae Fautr., D. microsporella Sacc. var. meliae Sacc. et Roum., Microdiplodia abiegna (Maub.) Sacc. et D. Sacc., M. camelliae (Henn.) Sacc. et D. Sacc., M. cisticola (Brun.) Allesch., M. cocoes-capitata Caball., M. consors (B. et Br.) Allesch., M. deodarae (Thüm.) Allesch., M. galbulorum (Brun.) Allesch., M. genistarum (Cke) Allesch., M. inconspicua (Cke) Allesch., M. ivicola (Ell. et Ev.) Sacc. et D. Sacc., M. microspora Sacc. var. meliae, M. phormii S. da Cam. (Ch. Zambettakis), 1954, 261.

Diplodia inconspicua Cke f. compressa Ell. et Barth. = Diplodia consueloi Gz. Frag., Microdiplodia lophiostomoides Dearn. et House., M. oenotherae Hollos (Ch. Zambettakis), 1954, 262.

Diplodia inconspicua Cke f. leguminis-cytisi Lév. = Diplodia leguminis-cytisi Lév., D. padi Brun., D. juniperi West. f. deodorae Thüm., Microdiplodia leguminis-cytisi (Lév.) Allesch., M. padi (Brun.) Allesch. (Ch. Zambettakis), 1954, 262.

Diplodia inconspicua Cke f. sclerotiorum Viala et Sacc. = Diplodia sclerotiorum Viala et Sacc. (Ch. Zambettakis), 1954, 262.

Diplodia longispora Cke et Ell. = Diplodia phellodendri H. Zimm. (Ch. Zambettakis), 1954, 270.

Diplodia maculata Cke et Harkn. = Diplodia elaeospora Sacc. (Ch. Zambettakis), 1954, 266.

Diplodia mamillana Fr. = Diplodia corchori (Desm.) Kickx., D. corni Bres., Fries et West., D. jasmini West. f. sparsa Grove, D. kerriae Berk., D. lichenopsis Cke et Massee, D. macrospora var. caulicola Mariani, D. nerii Speg., D. rhizogena Ell. et Barth., Diplodiella faginea Bäumler (Ch. Zambettakis), 1954, 267.

Diplodia microsporella Sacc. = Diplodia maculicola Winter, D. microspora Sacc., D. pusilla Sacc. et Briard., D. viciae Schembel., Diplodiella fructicosa A. Zimm., Microdiplodia bambusina Sacc., M. henningsii Staritz., M. microsporella (Sacc.)

Allesch., Tassi, M. miyakei Sacc., M. pusilla (Sacc. et Briard) Allesch., M. quercicola Petr., M. smilacina Sacc., M. xanthoceratis Hollos (Ch. Zambettakis), 1954, 260.

Diplodia microsporella Sacc. f. hypoxyloides Ell. et Ev. = Diplodia hypoxyloides Ell. et Ev. (Ch. Zambettakis), 1954, 261.

Diplodia microsporella Sacc. f. pruni Died. : Microdiplodia pruni Died. (Ch. Zambettakis), 1954, 260.

Diplodia obiones (Grove) Zamb. = Diplodia cococarpa Sacc. var. malaccensis Tassi, Microdiplodia obiones Grove (Ch. Zambettakis), 1954, 263.

Diplodia pterocarpi Cke = Diplodia anonicola P. Henn., D. fumago Berk., D. helichrysii Pass., D. infuscans Ell. et Ev., Diplodiella lantanae Briard, Microdiplodia anonicola (Henn.) Sacc. et D. Sacc., M. helichrysii (Pass.) Allesch., Frag., M. heterothalami Syd., M. microsporella var. foliorum Cabal. (Ch. Zambettakis), 1954, 259.

Diplodia punctata (Lév.) Zamb. = Diplodia adenocarpi Frag., D. atramentaria C. et Ell., D. atriplicis Cast., D. bignoniae Tassi, D. buddleiae Pat., D. bumeliae Tassi, D. buxella Sacc., D. buxi Fr. var. minor Grove, D. calamicola P. Henn., D. ceanothi Ell. et Barth., D. ceratoniae Politis, D. citharexyli P. Henn., D. emeri Sacc. f. junceae Frag., D. frangulae Fuck. f. alpina Sacc., D. incrustans Sacc., D. poterii Politis, D. siliquastri Pass., D. tamaricis Rabenh., D. tarentina Pass., D. yuccae Berk., Microdiplodia noaeae Bubak, M. siliquastri (Pass.) Sacc. et D. Sacc. (Ch. Zambettakis), 1954, 263.

Diplodia punctipetiola Cke = Diplodia carpogena Passer, D. fuchsiae Cke et Harkn., D. lupini Cke et Harkn. (Ch. Zambettakis), 1954, 270.

Diplodia rosmarini Celotti = Diplodia aloysiae Tassi, D. cunninghamae Mont., D. fairmani Ell. et Ev., D. nitens Sacc., Bomm. et Rouss., D. rosmarini Passer. (Ch. Zambettakis), 1954, 265.

Diplodia sparsa Fuck. = Diplodia cladastridis Syd., D. cucurbitacea Ell. et Langl., D. gales Bomm., Rouss. et Sacc., D. halleriae F. Tassi, D. loranthi H. Zimm., D. magnoliae West., D. mespili Hollos, D. petiolarum Sacc., D. ptelae Hollos, D. sambuci Fautr., D. spartii var. catalaunica Frag., D. ulcenjensis Bubak, D. viticola f. foliicola Lobik, D. yuccae West. (Ch. Zambettakis), 1954, 268.

Diplodia sparsa Fuck. f. macropyrena Tassi = Diplodia macropyrena F. Tassi (Ch. Zambettakis), 1954, 269.

Diplodia spurca (Wallr.) Sacc. = Diplodia apiosporioides Tassi, D. atra Tassi, D. bombacina Ahmad, D. diospyri (Schw.) Sacc. et Trav., D. eructans (Wallr.) Sacc., D. inquinans Mont., D. rhodophila Pass., R. rhodophila Pass. var. canensis, D. rhodophila var. canina Brun., D. seriata de Not. et Lév. (Ch. Zambettakis), 1954, 264.

Diplodia tecomae Passer. = Diplodia anonae Sacc., D. extensa Cke et Harkn., D. foliicola Sacc., D. fulvella Cke, D. glandicola Cke et Ell., D. henriquesiana Trav. et Spessa, D. juniperi West. f. foliicola Sacc., D. rhoina Cke et Harkn., D. spireina f. major Brun., Diplodiella tecomae (Cke) Sacc. (Ch. Zambettakis), 1954, 270.

Diplodia tenuis Cke et Harkn. = Diplodia beticola Prill. et Delacr., D. celtidigena Ell. et Barth., D. inquinans Ell. et Barth., Microdiplodia thalicri Sacc. (Ch. Zambettakis), 1954, 262.

Diplodia trichini P. Henn. (Microdiplodia P. Henn.) Sacc. et D. Sacc. (Ch. Zambettakis), 1954, 259.
Diplodia trichini f. navarrica P. Henn., Urries. = Microdiplodia navarrica J. Urries. (Ch. Zambettakis), 1954, 260.
Diplodia vaccini Berl. et Roum. = Diplodia polygoni Ruhland, D. uvulariae Davis (Ch. Zambettakis), 1954, 265.
Diplodia vaccini Berl. et Roum. f. muhlenbeckiae F. Tassi = Diplodia muhlenbeckiae Tassi (Ch. Zambettakis), 1954, 266.
Diplodiella apiospora Zamb. (Diplodia Cke) (Ch. Zambettakis), 1954, 241.
Diplodiella crustacea Karst. = Diplodiella crustacea Karst. f. castanea, D. crustacea Karst. f. salicina, D. goethana Trav. (Ch. Zambettakis), 1954, 240.
Diplodiella decorticata (C. et Ell.) Sacc. = Diplodia decorticata C. et Ell., D. fici Delacr., D. ficicola Delacr., Diplodiella fibriceda Sacc. (Ch. Zambettakis), 1954, 241.
Diplodiella lata (C. et Harkn.) Zamb. = Diplodia lata C. et Harkn., Diplodiella tonkinensis Delacr. (Ch. Zambettakis), 1954, 242.
Diplodiella lignicola Sacc. (Diplodia Peck.) (Ch. Zambettakis), 1954, 242.
Diplodiella oospora Sacc. = Diplodia oospora Berk., Microdiplodia microsporella (Sacc.) Allesch. f. sarothamni Frag., Microdiplodia ovoidea Bansa (Ch. Zambettakis), 1954, 241.
Granulodiplodia abnormis (Lasiodiplodia Trav. et Spessa.) (Ch. Zambettakis), 1954, 333.
Granulodiplodia adelinensis (Diplodia Stev. et Cel.) (Ch. Zambettakis), 1954, 333.
Granulodiplodia granulosa (Microdiplodia Guyot) (Ch. Zambettakis), 1954, 332.
Granulodiplodia granulosella Zamb. = Diplodia granulosa Lév. (Ch. Zambettakis), 1954, 332.
Granulodiplodia megalospora (Diplodia B. et Cke) (Ch. Zambettakis), 1954, 332.
Granulodiplodia pinea (Desm.) Zamb. = Diplodia conigena (Desm.) var. italica, D. pinea (Desm.) Kickx., D. pinea var. corticola Peck., D. pinea f. strabulicola Sacc., D. sapinea Fuck. f. ramulicola Sacc., Sphaeropsis pinea Desm. (Ch. Zambettakis), 1954, 331.
Granulodiplodia sapinea (Fr.) Zamb. = Diplodia sapinea (Fr.) Fuck., D. sapinea (Fr.)Fuck. f. abietis, D. sapinea (Fr.) Fuck. f. pinsapo Brun. (Ch. Zambettakis), 1954, 331.
Granulodiplodia stangeriae (Diplodia H. Zimm.) (Ch. Zambettakis), 1954, 333.
Haplosporella excipuloides (Botryodiplodia ?) (Ch. Zambettakis), 1954, 340.
Heimiodiplodia paraphysata (Diplodia Ell. et Ev.)(Ch. Zambettakis), 1954, 225.
Heimiodiplodia zeylanica (Diplodia F. Tassi) (Ch. Zambettakis), 1954, 225.
Lasiodiplodia theobromae (Pat.) Griff. et Maubl. = Botryodiplodia batatae P. Henn., B. carpophila Petr., B. cerebrina Sacc., B. creba (Sacc.) Petr., B. diplocarpa Ell. et Ev., B. elasticae Petch., B. manihotis Syd., B. manihoticola Petr., B. phaseolina (Sacc.) Petr. et Syd., B. saccharina Died., B. theobromae Pat., Chaetodiplodia arachidis Maubl., C. coffeae Zimm., C. grisea Petch., C. sobraliae P. Henn., C. vanillae Zimm., Diplodia arachidis Petch., D. cacaoicola P. Henn., D. cinnamomi Da Camara., D. cococarpa Sacc., D. cocophila

Cke, D. coffeae P. Henn., D. coffeicola Zimm., D. coffaeiphila Zimm., D. crebra Sacc., D. hesperidica Speg., D. mangostanae P. Henn., D. manihoti Sacc., D. musae Died., D. paradisiana (Mont.) Wr., D. phaseolina Sacc., D. radula B. et Br., D. rapax Massee, D. solanicola Sacc., D. tubericola Ell. et Ev., Taubenh., D. zebrina Petch., Lasiodiplodia nigra Appel et Laubert., Nematodiplodia laelio-cattleyae Sib. (Ch. Zambettakis), 1954, 236.

Lasiodiplodiella ricini (Lasiodiplodia Sacc.) (Ch. Zambettakis), 1954, 230.

Lasiodiplodiella thomasiana (Lasiodiplodia Sacc.) (Ch. Zambettakis), 1954, 230.

Lasiodiplodiella triflorae (Lasiodiplodia Higgins) (Ch. Zambettakis), 1954, 229.

Macrodiplodia Sacc. = Macrodiplis Clem., Steganopycnis Syd. (Ch. Zambettakis), 1954, 221, 237.

Macrodiplodia curreyi Sacc. et Roum. = Diplodia curreyi Sacc. et Roum., D. ligustricola Girzitska (Ch. Zambettakis), 1954, 238.

Macrodiplodia oncospermatis Sacc. (Steganopycnis Syd.) (Ch. Zambettakis), 1954, 238.

Macrodiplodia ulmi Sacc. = Lacrodiplodia libertiana Petr. (Ch. Zambettakis), 1954, 238.

Metadiplodia acerina (Lév.) Zamb. = Diplodia acerina Lév., D. aceris Fuck., D. asclepiadea C. et Ell., D. asclepiadea subsp. periplocae Berl. et Bres., D. astrocaryi P. Henn., D. atrocaerulea Ell. et Ev., D. australiae Speg., D. carpini Sacc., D. catalpae Speg. et Cke, D. circhifera Mont., D. clandestina Dur. et Mont. var. foliorum Sacc., D. constricta Dearn., D. cookei Sacc. et Syd., D. coryli Fuck., D. cytosporioides Roum., D. diversispora Kab. et Bub., D. dryadea Sacc., D. ellipsopoda Mont., D. foliorum Sacc., D. fructus-pandani P. Henn., D. fructus-pandani var. foliorum Sacc., D. helicis De Not., D. hibiscina C. et Ell. var. sabdariffae Sacc., D. humuli Fuck., D. incarvilleae Thüm., D. indigofera Brun., D. interrogativa Thüm. et Pass., D. jaminicola Sacc., D. juglandina Otth,, D. juglandis Fr., D. koelreuteriae Sacc. var. minor Brun., D. laureolae Fautr., D. liriodendri Peck., D. marsdeniae C. et Mass., D. minutissima Otth, D. moricola C. et Ell., D. opuli Passer., D. opuntiae Sacc., D. performans Desm., D. periplocae Berl. et Bres., D. pistaciae Berl. et Bres., D. pitospori Cke et Harkn., D. pollacina Allesch., D. profusa De Not., D. rhodocarpa Cke, D. rosaecarpa Cke, D. rhododendri West., D. rosarum Fr. var. santonensis Brun., D. spiraeina Sacc., D. subtecta Fr., D. tamaricina Sacc., D. tamaricis Sacc., D. taxi De Not., Fr., D. tini Sacc., Macrodiplodia cinerea Cke et Ell. (Ch. Zambettakis), 1954, 281, 282.

Metadiplodia acerina (Lév.) f. phloeospora Sacc. et Trav. = Diplodia phloeospora Sacc. et Trav., Schulz. (Ch. Zambettakis), 1954, 282.

Metadiplodia agrostidis (Diplodia Sacc.) (Ch. Zambettakis), 1954, 297.

Metadiplodia agrostidis (Sacc.) Zamb. f. ricini Sacc. et Roum. = Diplodia ricini Sacc. et Roum. (Ch. Zambettakis), 1954, 297.

Metadiplodia alni (Fuck.) Zamb. = Diplodia alni Fuck., D. hyssopi Sacc. et Fautr., D. laurina Sacc., D. ligustri West., D. lonicerae Cast., Fuck., D. melaena var. lauri Roum., D. ve-

ronicae Fautr. (Ch. Zambettakis), 1954, 293.
Metadiplodia alni (Fuck.) f. millegrana Cke et Harkn. = Diplodia millegrana Cke et Harkn., Diplodiella millegrana Sacc. (Ch. Zambettakis), 1954, 293.
Metadiplodia aucubae (West.) Zamb. = Diplodia aucubae Sacc., West., D. aucubae West. var. foliorum Fautr., D. aucubae West. var. ramorum Fautr., D. aucubicola Sacc., D. colletiae Speg., D. thyoidea C. et Ell. (Ch. Zambettakis), 1954, 294.
Metadiplodia aurantii (Catt.) Zamb. = Diplodia aurantii Catt., D. citri Sacc. (Ch. Zambettakis), 1954, 281.
Metadiplodia buxi (Fr.) Zamb. = Diplodia argentina Speg., D. buxi Fr., D. buxicola Sacc., D. carpinea Thüm., D. cavanillesiana Frag., D. cavanillesiana Frag. f. spiraeae Frag., D. ceanothi Cl. Moreau, D. circinans Cke, D. cydoniae Sacc., D. deodarae Brun., D. inquinans (West.) Sacc., D. inquinans West. var. ramulicola, D. julibrissin Speg., D. kaki Sacc., D. laureolae Fautr. f. mezerei Ferraris., D. mori West., D. multicarpa Peck., D. oleae Pegl., D. palmicola Thüm., D. palmicola var. sabaleos Sacc., D. papayae Thüm., D. phillyrae Jaap., D. poligonicola Hollos, D. polymorpha Mont., D. pruni E. et B., Fuck., D. pruni Fuck. f. mahaleb., D. pruni Fuck. f. myrobolana Brun., D. pseudoplatani Brun., D. pseudoplatani f. aceris negundis, D. rhizophila Syd., D. ribis Sacc., D. rusci (Sacc. et Therry) var. microspora Pollaci, D. saponariae Tul., D. siliquastri West., D. spegazziniana Roum. et Sacc., D. staphyleae Sacc. et Penz., D. symphoricarpi Sacc., D. typhina Sacc., D. weigeliae Sacc. (Ch. Zambettakis), 1954, 286.
Metadiplodia buxi (Fr.) Zamb. f. euterpes Syd. = Diplodia euterpes Syd. (Ch. Zambettakis), 1954, 287.
Metadiplodia canthiifolia (Cke et Mass.) Zamb. = Diplodia beckii Bäuml., D. canthiifolia Cke et Mass., Microdiplodia beckii (Bäuml.) Allesch., M. callitrina Sacc., M. nigrificans Sacc., M. oleaginea Sacc., M. vitigena Bubak (Ch. Zambettakis), 1954, 300.
Metadiplodia coryphae (Cke) Zamb. = Botryodiplodia tamarindica (Sacc.) Petr., Diplodia catechu Syd. et Butl., D. cocoina Syd., D. coryphae Cke, D. phyllophila Lév., D. phyllostictae Cke, D. polygonicola Peck., D. simmonsii Rostr., D. tamarindica Sacc. (Ch. Zambettakis), 1954, 300.
Metadiplodia curta (Sacc.) Zamb. = Botryodiplodia curta Sacc., Metadiplodia millecapsa Cke (Ch. Zambettakis), 1954, 299.
Metadiplodia diatrype (Lév.) Zamb. = Diplodia artocarpi Sacc., D. diatrype Lév., D. foucaudi Brun., D. hibiscina C. et Ell., D. macrostoma Lév., D. menispermi Ell. et Barth., D. oleandri Speg., D. photiniae Brun., D. photiniaecola Brun., D. rhamni Petr., D. sarmentorum Fr., D. sterculiae Wint., D. synedrellae Sacc. (Ch. Zambettakis), 1954, 294.
Metadiplodia emeri (Sacc.) Zamb. = Diplodia asparagi Brun., D. coronillae Berk.et Bres., D. dracaenicola Died., D. emeri Sacc., D. hortensis Sacc., D. platanicola Sacc., D. smilacina f. smilacis asperae Sacc. (Ch. Zambettakis), 1954, 288.
Metadiplodia georginae (Corda) Zamb. = Diplodia abrotani Fuck., D. baccharidis Hollos, D. caulicola Fuck., D. chionanthi C. et Ell., D. eustaga F. Tassi, D. georginae (Corda) Lév., D. phoenicola Speg., D. sicula Scalia (Ch. Zambettakis), 1954, 285.
Metadiplodia ilicicola (Desm.) Zamb. = D. amelanchieris Sacc., D. amorphae (Wallr.) Sacc., D. broussonetiae Sacc., D. caraganae Schnabl., D. fissa Dur. et Mont., D. heteromorpha West.,

D. ilicicola Desm., D. rudis Desm. et Kickx., D. salicina Lév. (Ch. Zambettakis), 1954, 288.

Metadiplodia ilicicola (Desm.) Zamb. f. lilacis West. = Botryodiplodia anthophila (Sacc.) Petr., Diplodia anthophila Sacc., D. circinans B. et Br. var. diffusa Farlow et Seymour, D. gleditschiae Pass., D. gleditschiae Pass. var. leguminum, D. ischaemi Pass., D. licalis West., D. lilacis West., D. lilacina Cast., D. mitylospora S. Cam., D. oblonga Har. et Br., D. padi Brun., D. syringae Auersw. (Ch. Zambettakis), 1954, 289.

Metadiplodia ilicis (Fr.) Zamb. = Botryodiplodia sorbi (Sacc.) Syd., Diplodia acicola Sacc. var. araucariae Penz., D. aquifolia West., D. araucariae Penz., D. caricina D.Sacc., D. celtidis Roum., D. cereitriangularis Speg., D. dulcamarae Fuck., D. epicocos Cke, D. epicocos Cke var. minuscula Sacc., D. herbarum (Corda) Lév. f. rumicis Fautr., D. ilicis Fr., D. koelreuteriae Sacc., D. laurina Roum., D. mahoniae Sacc., D. mygindae Winter., D. phyllarthri Tassi, D. populina Fuck., D. ribis Sacc. f. alpina, D. ribis Sacc. f. sanguinei Br., D. roumegueri Sacc., D. scheidweileri (West.) Sacc., D. sorbi Sacc. (Ch. Zambettakis), 1954, 291.

Metadiplodia ilicis (Fr.) f. barringtoniae Tassi (Diplodia Tassi) (Ch. Zambettakis), 1954, 291.

Metadiplodia kansensis (Ell. et Ev.) Zamb. = Diplodia cocculi Sacc., D. coicis Sacc., D. kansensis Ell. et Ev., D. landolphiae P. Henn., D. recifensis Batista, D. sipolisiae P. Henn. (Ch. Zambettakis), 1954, 297.

Metadiplodia lantanae (Fuck.) Zamb. = Diplodia amygdali Cke et Harkn., D. celottiana Sacc., D. crassulae Cke et Harkn., D. farnesiana Sacc., D. hippophaearum Bres., D. lantanae Fuck., D. quercina West., D. rhois Sacc., D. spartii Cast., D. unedonis P. Brun.(Ch. Zambettakis), 1954, 284.

Metadiplodia lecanidion (Botryodiplodia Petr. et Syd.) (Ch. Zambettakis), 1954, 302.

Metadiplodia libera (Schulz. et Sacc.) Zamb. = Diplodia bulbicola P. Henn., D. ceratoniae F. Tassi, D. cydoniae Sacc. var. libera Schulz. et Sacc., D. libera Schulz. et Sacc., D. pithecolobii Died., D. togashiana Syd., D. withaniae Ahmad (Ch. Zambettakis), 1954, 296.

Metadiplodia libera (Schulz. et Sacc.) Zamb. f. benzoina Sacc. = Diplodia benzoina Sacc. (Ch. Zambettakis), 1954, 296.

Metadiplodia libera (Schulz. et Sacc.) Zamb. f. veronensis Sacc. = Diplodia juglandis Fr. var. veronensis (Massal) Sacc., D. veronensis Sacc. (Ch. Zambettakis), 1954, 296.

Metadiplodia lophiostomoides (Diplodia Ell. et Barth.) (Ch. Zambettakis), 1954, 302.

Metadiplodia macrosperma (Desm.) Zamb. = Botryodiplodia caricae (Sacc.) Petr., Diplodia andamensis Cke, D. artocarpina Sacc., D. begoniae B.P., D. caricae Sacc., D. ditior Sacc. et Roum., var. petiolarum Brun., D. edgworthiae Sacc., D. elaeophila Sacc., D. jasmini West., D. jasmini West. f. ligustri, D. juglandis var. fructicola Brun., D. ochromae Pat., D. rhamni alaterni Grognot (Ch. Zambettakis), 1954, 295.

Metadiplodia melaena (Lév.) Zamb. = Botryodiplodia ricinicola Sacc., Petr., Diplodia acaciae Penz. et Sacc., D. aceris var. negundinis Thüm., D. aparines Passer., D. atra Mont., D. atra Sacc. var. pseudoplatani, D. atrata (Desm.) Sacc. var. pseudoplatani, D. boldoae Speg., D. cerasorum Fuck., D. circinans B. et Br., D. coerulescens Pass., D. desmodii-

cola Frag., D. faginea Fr., D. forsythiae Hollos, D. hederae (Fr.) Desm., Fuck., D. hurae Tassi, D. lyciella Sacc., D. lycii Fuck., D. lycii var. lyciella Sacc., D. magnoliicola Brun., D. mamma Fuck., D. marumiae Sacc. et Paol., D. melaena Lév., D. megalospora B. et C., D. molleriana Thüm., D. negundinis Thüm., D. onobrychidis Hollos, D. patellaria (Wallr.) Mont., D. philadelphi Celotti, D. pseudodiplodia Fuck., D. rhamni Jaap., D. ricinicola Sacc., D. rubi Fr. var. rubi-idaei Brun., D. salicella Sacc., D. samararum Sacc., D. subseriata Tassi, D. syriaca Sacc., D. tecomae Bass., D. tecomae var. affinis Sacc., Diplodiella dubia Delacr. (Ch. Zambettakis), 1954, 283.

Metadiplodia mutila (Mont.) Zamb. = Botryodiplodia mali Brun., B. pomi (Mont.) et (Fr.) Ciferri, Diplodia aesculi Lév., D. berberidina Sacc., D. berberidis Sacc., D. crataegi West., D. cynanchina Petr., D. inocarpi Sacc., D. mespilina L. Gaja, D. putila (Mont.) Fr., D. rosae West., D. rosarum Fr., Macrodiplodia mali West. (Ch. Zambettakis), 1954, 284.

Metadiplodia mutila (Mont.) Zamb. f. maclurae Speg. = Diplodia maclurae Speg., D. panacis (Fr.) Cke (Ch. Zambettakis), 1954, 285.

Metadiplodia nuttaliae (Diplodia Dearn.) (Ch. Zambettakis), 1954, 299.

Metadiplodia nuttaliae (Dearn.) f. elaeagnella Tassi = D. elaeagnella Tassi (Ch. Zambettakis), 1954, 299.

Metadiplodia passifloricola (Diplodia P. Henn.) (Ch. Zambettakis), 1954, 295.

Metadiplodia phoradendri (Cke) Zamb. = Diplodia calecutiana Tassi, D. phoradendri Cke, D. trevoae Speg. (Ch. Zambettakis), 1954, 298.

Metadiplodia phoradendri (Cke) Zamb. f. pseudosphaeropsis Maire = Diplodiella pseudosphaeropsis Maire (Ch. Zambettakis), 1954, 298.

Metadiplodia phoradendri (Cke) Zamb. var.major Brun. = Diplodia cerasorum Fuck. var. major Brun. (Ch. Zambettakis), 1954, 298.

Metadiplodia piriformis (Preuss.) Zamb. = Diplodia cassinopsidis Kalch. et Cke, D. ligustri West. f. ovalifolii Brun., D. monsterae Verwoerd et Dippenaar, D. myxosporioides Sacc., D. oxylobii P. Henn., D. pellica Cesati, D. photiniae Speg., D. piriformis (Fr.) Sacc., D. smilacina Berk., D. stenocarpi Tassi, D. subglobata (Fr.) Sacc., D. uvariae Frag. (Ch. Zambettakis), 1954, 290.

Metadiplodia mustulosa (Lév.) Zamb. = Diplodia acerina Cke et Mass., Diplodia aconiti Brun., D. aesculi Lév. var. capsularum Brun., D. althaeae Speg., D. atrata Lév., D. bacchi Pass. et Thüm., D. bambusae Ell. et Langl., D. berberidis Rota-Rossi, D. betulae West., D. bignoniae Tassi, D. butleri Syd., D. caryogena Ell. et Ev., D. castaneae Sacc. et var. corticola, var. liquicolis, var. radicicola Sacc., D. chimonanthi Sacc., D. cistina Cke, D. colutae Schnabl., D. comari P. Henn., D. corylina Brun., D. daturae Sacc., D. discriminanda Pass., D. elastica F. Tassi, D. eriobotryae Sacc., D. foeniculina Thüm., D. henriquesii Thüm., D. heteroclita Dur. et Mont., D. hibisci P. Henn., D. kerensis Pass., D. lablab Sacc., D. lagerstroemiae Speg., D. lunariae Jaap. et Died., D. officinalis Ell. et Ev., D. otthiana Allesch., D. oudemansii Sacc. et Syd., D. paliuri Becc. var. microspora Savul. et Sandu., D. palmarum Boom. et Rouss., D. pandani Tassi, D.

persicae Sacc., D. pustulosa Lév., D. radicicola Sacc., D. radiciperda Thüm., D. ravenelli Cke, D. rehmii Bäumler, D. rubi Fr., Berk., D. ruborum (Schw.) Sacc., D. rutaecolae Thüm., D. saccardiniana Tassi, D. sarothamni Oudem., D. scabra Fuck., D. segapolii Scal., D. smyrnii Curt., D. tini Sacc. f. minor Brun., D. tragiae Massee, D. visci de Not., D. vulgaris Lév., D. xylogena Sacc., D. zelcovae A. Wroflewski, Diplodiella camphorae D. Sacc., Microdiplodia bambusae (Ell. et Langl.) Sacc. (Ch. Zambettakis), 1954, 279.

Metadiplodia pustulosa (Lév.) Zamb. f. auerswaldii (Diplodia Bäumler) (Ch. Zambettakis), 1954, 280.

Metadiplodia pustulosa (Lév.) Zamb. f. celastrina (Diplodia Ell. et Ev.)(Ch. Zambettakis), 1954, 280.

Metadiplodia pustulosa (Lév.) Zamb. f. perseana (Diplodia Delacroix) (Ch. Zambettakis), 1954, 280.

Metadiplodia pustulosa (Lév.) Zamb. f. xanthoxyli (Diplodia P. Henn.) (Ch. Zambettakis), 1954, 281.

Metadiplodia radicicola (F. Tassi) Zamb. = Diplodia cathartocarpi B. et Br., D. radicicola F. Tassi (Ch. Zambettakis), 1954, 297.

Metadiplodia ramulicola (Desm.) Zamb. = Diplodia acicola Sacc., D. ampelina Cke, D. ampelopsidis Allesch., Brun., D. aparines Briard., D. arbuticola (Fr.) Berk., D. acerina Sacc., D. aristolochiae Bres. et Krieg., D. cajani Raychaudhuri, D. corchori Desm., Kook., D. coronillae Brun., D. coronillae-junceae Cat., D. cruris-galli Brun., D. ditior Sacc. et Roum., D. ditior f. platani orientalis Sacc. et Roum., D. embryopteridis Cke, D. evonymi West., Fuck., D. griffoni Sacc. et Trav., D. hamamelidis Fairm., D. maura C. et Ell., D. maura var. americana Ell., D. platani Sacc., D. preussii Sacc., D. radicina C. et Ell., D. ramulicola Desm., D. ribis Sacc. f. ribis-aurei Brun., D. ribis Sacc. f. ribis malvacei Brun., D. sarothamni Cke et Harkn., D. suberina Dur. et Mont., D. tini var. ramulicola Sacc., D. ureniana Sacc., D. vineae Pass. et Beltr. (Ch. Zambettakis), 1954, 292.

Metadiplodia ramulicola (Desm.) Zamb. f. eucalypti Cke et Harkn. = Diplodia alaterni Grognon, D. clandestina Dur. et Mont., D. durionis Sacc. et Syd., D. eucalypti Cke et Harkn. (Ch. Zambettakis), 1954, 293.

Metadiplodia ramulicola f. multijugae (Diplodia P. Henn.) (Ch. Zambettakis), 1954, 292.

Metadiplodia rosae (B. et C.) Zamb. = Diplodia rosae B. et C., D. thalictricola Syd. (Ch. Zambettakis), 1954, 301.

Metadiplodia sambucicola (Fautr.) Zamb. = Diplodia sambucicola Fautr., Microdiplodia sambucicola (Fautr.) Allesch. (Ch. Zambettakis), 1954, 301.

Metadiplodia sambucicola (Sacc.)Zamb. = Diplodia albo-tecta Sacc., D. laurina Sacc. var. minor Pass., D. sambucina Sacc., D. scoparia Cke (Ch. Zambettakis), 1954, 284.

Metadiplodia spiraeae (Sacc.) Zamb. = Diplodia aristolochiae-siphonis Vestergr., D. bambusina Died., D. bougainvilleae Da Cam., D. genistae Fr., D. rimicola B. et E., D. spiraeae Sacc. (Ch. Zambettakis), 1954, 285.

Metadiplodia spiraeae f. lagenariae Sacc. (Diplodia Sacc.) (Ch. Zambettakis), 1954, 286.

Metadiplodia subsolitaria (Schw.) Zamb. = Botryodiplodia ananassae (Sacc.) Petr., D. aegyptiaca Tassi var. incrustans, D. ananassae Sacc., D. antiqua Pass., D. arundinacea Dur. et Mont., D. bauhiniae Died., D. camelliaecola P. Brun., D.

cercidis Ell. et Ev., D. characiae Cast., D. citricina Died., D. clematidis Sacc., D. corchori Syd., D. dalbergiae Died., D. diacanthina Sacc., D. euphorbiae Brun., D. exochordae P. Henn., D. forsythiae Hollos var. fortunei, D. frangulae f. cathartica Sacc., D. gallae (Schw.) Cke, D. gmeliae P. Henn., D. horticola f. alni Frag., D. horticola f. carpini Frag., D. horticola f. colutae Frag., D. horticola var. evonymi Frag., D. horticola var. exochordiae Frag., D. horticola f. fraxini Frag., D. horticola f. negundinis Frag., D. horticola f. periplocae Frag., D. horticola f. piri-elaeagnifoliae Frag., D. horticola f. poinciana Frag., D. horticola f. pterocarpae Frag., D. horticola f. typica Frag., D. horticola f. viburni Frag., D. hoveniae Petr., D. hypericina Sacc., D. lauro-cerasi West., D. mori Berk., Cast., Fr., Sacc., D. osyridis (Cast.) Briard, Har. et Briard, D. passiflorae Penz. et Sacc.,D. ramulicola Sacc., D. ramulicola Desm. f. corticola, D. rhodotypi Hollos, D. sanseveriae Syd., D. spiraeae Pass., D. subsolitaria (Schw.) Carr., D. tecta B. et Br., D. tecta f. ramulicola Sacc., D. thevetiae Tassi, D. triacanthina Mont., D. ulicis Sacc. et Penz., D. viburnicola Brun., D. viburnicola var. viburni-rugosi Frag., D. vignae Sacc. (Ch. Zambettakis), 1954, 290.

Metadiplodia subsolitaria (Schw.) Zamb. f. viticola Desm. = Diplodia viticola Desm., D. vitis Desm. (Ch. Zambettakis), 1954, 290.

Metadiplodia tephrostoma (Lév.) Zamb. = Diplodia acericola Tehon. et Sout., D. siphonis P. Henn., D. tephrostoma Lév., D. tephrospora Curtis (Ch. Zambettakis), 1954, 287.

Metadiplodia tephrostoma (Lév.) Zamb. f. viscicola (Diplodia P. Henn.) (Ch. Zambettakis), 1954, 287.

Metadiplodia thujae (West.) Zamb. = Botryodiplodia quercella Cke, Diplodia althaeae Speg., D. elaeagni Pass., D. elaeagni var. ramulicola Pass., D. frangulae f. lycioides Urries., D. ostryae Syd., D. punicae P. Brun., D. quercella Penz. et Sacc., D. sydowiana Allesch., D. thujae Ott., Sacc., West., D. thujana Peck. et Clint., D. thujana f. thujae orientalis Sacc., D. tiliae Fuck., D. wistariae Brun. (Ch. Zambettakis), 1954, 299.

Metadiplodia veratris (Diplodia Earle) (Ch. Zambettakis), 1954, 301.

Metadiplodia visci (D.C.) Zamb. = Diplodia micheliae P. Henn, D. ochrosiae Massee, D. thyoidea C. et Ell. f. juniperi Fautr., D. visci (D.C.) Fr. (Ch. Zambettakis), 1954, 295.

Microbotryodiplodia atra (Berl. et Bres.) Cam. = Botryodiplodia atra Berl. et Bres., B. mirbeckii Pat., Microdiplodia conigena Allesch., M. haplopappi Allesch., M. mafilensis Speg. (Ch. Zambettakis), 1954, 307.

Microbotryodiplodia cyanostroma (B. et Cke) Cam. = Botryodiplodia crataegi Vestergr., B. cyanostroma (B. et Cke) Sacc., B. microsporella Frag., Diplodia cyanostroma B. et Cke, D. nigrita Berk. et Cur. (Ch. Zambettakis), 1954, 308.

Microbotryodiplodia minor (Berl. et Bres.) = Botryodiplodia minor Berl. et Bres., B. rubi Syd. (Ch. Zambettakis), 1954, 307.

Microbotryodiplodia subtectoides (Peck.) = Diplodia linariae Frag., D. subtectoides Peck., Microdiplodia larreae Speg. (Ch. Zambettakis), 1954, 308.

Microdiplodia acervata (Lév.) = Diplodia acervata Lév., D. chrysanthemella Ikata., D. gayii Boy. et Jacz., D. morreniae Syd., D. ampelodesmi R. Maire, D. pittospori Cel., D. pittosporum

Sacc., D. platani B. et Br., D. samarum Brun., D. subtilis Bonorden, D. uvicola N. Speschnew, Diplodiella ampelodesmi (Maire) Sacc., Microdiplodia agni-casti Sacc., M. elaeagni Pot., M. foedans Sacc., M. gayii (Boy. et Jacz.) Sacc., Allesch., M. gayii (B. et Br.) Allesch., M. gayii var. capsularum Sacc., M. illiceti Sacc., M. magnoliae Grove, M. mori Allesch., M. passeriniana Allesch. var. rhachidis Sacc., M. pittospororum (Sacc.) Allesch., M. ricinigena Bubak, M. samararum (Brun.) Allesch., M. spiraeae Hollos, M. viciae Peck. (Ch. Zambettakis), 1954, 250.

Microdiplodia ascochytula Allesch. (Diplodia Sacc.) (Ch. Zambettakis), 1954, 339.

Microdiplodia brachyspora (Sacc.) Allesch = Diplodia brachyspora (Sacc.) Allesch., D. caesii Boy. et Jacz., Microdiplodia caesii (Boy. et Jacz.) Allesch., Urries (Ch. Zambettakis), 1954, 249.

Microdiplodia centrophila (Pass.) Allesch. = Diplodia calycotomes Roll., D. centrophila Pass., D. cotini Thüm., D. rehmii Bäumler, Microdiplodia calycotomes (Roll.) Allesch. (Ch. Zambettakis), 1954, 255.

Microdiplodia clavispora (Ell. et Barth.) = Diplodia citricola Mc Alp., D. clavispora Ell. et Barth., D. cocculi Da Cam., D. subterranea Ell. et Barth., D. tussiana Sacc. et Syd., Microdiplodia cycadella Frag., M. galiicola Fairm., M. jasmini Syd. (Ch. Zambettakis), 1954, 253.

Microdiplodia clavispora f. sterculiae (Diplodia F. Tassi) (Ch. Zambettakis), 1954, 253.

Microdiplodia constrictula Bubak = Microdiplodia iridicola Frag. (Ch. Zambettakis), 1954, 246.

Microdiplodia constrictula f. linderae Ell. et Ev. = Microdiplodia linderae Ell. et Ev. (Ch. Zambettakis), 1954, 246.

Microdiplodia depazeoides Dur. et Mont. = Diplodia depazeoides Dur. et Mont., D. hedericola Sacc., D. insitiva Sacc., D. quisquiliarum B. et C., D. rusci Sacc. et Therry, D. traversiana Cam., Diplodiella tamaricis Maubl., Microdiplodia campylotropodis Frag., M. hedericola (Sacc.) Allesch., M. microsporella f. campylotropi Frag., M. molluginis Naoumoff, M. rusci (S. et T.) Allesch., M. ruthenica Petr. (Ch. Zambettakis), 1954, 248.

Microdiplodia depazeoides (Dur. et Mont.) f. cordiae Passer. = Diplodia microsporella Sacc. var. cordiae Passer. (Ch. Zambettakis), 1954, 249.

Microdiplodia fibricola (Berk.) = Diplodia cacti Roll., D. fibricola Berk., D. microspora B. et C., D. obsoleta Karst., Diplodiella fibricola (Berk.) Sacc., D. ramentacea Tassi, Microdiplodia cacti (Roll.) Allesch., M. obsoleta (Karst.) Allesch., M. ononicola Rhodes, M. wistaria Grove (Ch. Zambettakis), 1954, 255.

Microdiplodia imperialis (Sacc.) Allesch. = Diplodia imperialis Sacc., D. microscopica Cke et Harkn., D. minuscula Penz. et Sacc., D. psoraleae (Cast.) Karst. et Harkn., D. rutae P. Henn., Diplodiella viminis Fautr., Microdiplodia cercidis Died., M. minuscula (Penz. et Sacc.) Allesch., M. nissoliae Grove, M. psoraleae (Cast.) Allesch., M. rutae (P. Henn.) Sacc. et D. Sacc., M. sambuci I. Politis (Ch. Zambettakis), 1954, 251.

Microdiplodia imperialis (Sacc.) Allesch. f. oryzae Miyake = Diplodia oryzae I. Miyake, Microdiplodia sambuci-racemosae Naoumoff (Ch. Zambettakis), 1954, 251.

Microdiplodia koelreuteriae Died. = Microdiplodia betulae Jaap., M. ceanothi Dearn.et House, M. microsporella Tassi f. bupleuri Frag., M. rosarum Died., M. tofieldiae Died., M. togashiana Syd. (Ch. Zambettakis), 1954, 251.

Microdiplodia lecanorae (Diplodia A. Vouaux, Keissl.) (Ch. Zambettakis), 1954, 257.

Microdiplodia lecanorae f. ferrugineae A. Vouaux = Microdiplodia ferrugineae Vouaux (Ch. Zambettakis), 1954, 257.

Microdiplodia maculata (Miyake et Hara) Sacc. = Diplodia maculans Miyake et Hara, Diplodiella ficina Pass. (Ch. Zambettakis), 1954, 255.

Microdiplodia melaena Allesch. = Diplodia dearnessii Ell. et Ev., Microdiplodia fraxini Died., M. gleditschiae Died., M. handelii Bubak, M. juglandis Died., M. microsporella var. anemopaegmae Frag., M. microsporella Tassi f. coryli Fautr., M. raphiolepidis P. Henn., M. spiraeae Died. (Ch. Zambettakis), 1954, 246.

Microdiplodia melaena Allesch. f. carpini Died. = Microdiplodia carpini Died., M. coryli Died. (Ch. Zambettakis), 1954, 247.

Microdiplodia melaspora (Berk.) Griff. et Maubl. = Diplodia hippocrepidis Pat., Microdiplodia brachypodii Unam., M. varia Berk., M. phillyrae Bubak, M. riofrioi Cabal., M. valvuli Fairm. (Ch. Zambettakis), 1954, 253.

Microdiplodia microspora (Ott.) Allesch. = Diplodia adenocarpi Pitard., D. araucariae Penz. et Sacc., D. boyeri Sacc., D. calami Niessl., D. cupressina Cke, D. fructigena Brun., D. mespili Ferr., D. microspora Ott., D. microsporella var. araucariae Penz. et Sacc., D. microsporella Tassi f. carpini Fautr., D. jaczewski ?, D. phyllactinia Cke et Harkn., D. pinnarum Pass., D. narthecii Sacc., Bomm. et Rouss., D. psoralea Boy. et Jacz., D. punctifolia d'Alm. et S. Cam., D. spartii Boy. et Jacz., D. vitalba (Br. et Urr.) Allesch., Microdiplodia alsines Frag., M. boyeri (Sacc.) Allesch., M. cocculicola Frag., M. ephedrae Hollos, M. mespili (Ferr.) Sacc. et D. Sacc., M. microsporella f. cocculicola Frag., M. microsporella f. menispermi Sacc., M. fructigena (Brun.) Allesch., M. indica Syd., M. ischaemi Moens., M. narthecii Sacc., Boum. et Rouss.) Allesch., M. paronychiae Urries, M. pinnarum (Pass.) Allesch., M. microsporella Tassi f. sophorae Frag., M. punctifolia (A. et Cam.) Sacc. et D. Sacc. (Ch. Zambettakis), 1954, 247.

Microdiplodia minor (Sydow) Allesch. = Diplodia minor Syd., D. thalictri E. et D., Diplodiella xanthii Harkn. et Br., Microdiplodia microsporella Tassi f. philadelphi Frag., M. valdiviensis Speg., M. xanthii (Harkn. et Br.) Allesch.(Ch. Zambettakis), 1954, 246.

Microdiplodia minuta (Ell. et Tracy) Zamb. = Diplodia asterigmatica Vertergr., D. desmazieri ?, D. minuta Ell. et Tracy, D. osyridella Tassi, Diplodiella balanitis Bacc., Microdiplodia anograe Fairm., M. evonymi Politis, M. fici Politis, M. helicina Unam., M. junci Died., M. leucelenes Fairm., M. medicaginis Died., M. osyridella (Tassi) Allesch. (Ch. Zambettakis), 1954, 254.

Microdiplodia minuta (Ell. et Tracy) Zamb. f. secalis (Lib.) Speg. et Roum. = Diplodia secalis (Lib.) Speg. et Roum., D. sidae Pass. et Beltr., Microdiplodia secalis Speg. (Ch. Zambettakis), 1954, 254.

Microdiplodia minuta (Ell. et Tracy) Zamb. f. seminutum Pat. =

Diplodia agenoides Welsford, D. seminutum Pat. (Ch. Zambettakis), 1954, 254.

Microdiplodia myriospora (Sacc.) Allesch. = Diplodia myriospora Sacc., Microdiplodia glaucii Grove, M. microsporella Allesch. var. clematidis Unam., M. mycophaga Petr., M. nerii Politis (Ch. Zambettakis),1954, 256.

Microdiplodia myriospora (Sacc.) Allesch. f. physalidis P. Henn. = Diplodiella physalidis P. Henn. (Ch. Zambettakis), 1954, 256.

Microdiplodia nobilis (Berk. et Curt.) Zamb. = Diplodiella angelicae Died., D. milleri Ahmad., D. nobilis Berk. et Curt., Microdiplodia anagyridis Frag., M. sophorae-sinensis Frag. (Ch. Zambettakis), 1954, 247.

Microdiplodia osmanthi Trav. = Diplodia bupleuri Alvroblewski, Microdiplodia microsporella var. fuginea Ferr., M. piperorum Bubak (Ch. Zambettakis), 1954, 256.

Microdiplodia pappiana (Bacc.) Zamb. = Diplodia escalerae Frag., D. pappiana Bacc. (Ch. Zambettakis), 1954, 254.

Microdiplodia paupercula (B. et Br.) Zamb. = Diplodia atropae Siemaszko, D. paupercula B. et Br., D. paupercula B. et Br. var. platani Sacc., Diplodiella caricae Tognini, Microdiplodia calthae W. Kirschst. (Ch. Zambettakis), 1954, 249.

Microdiplodia perpusila (Desm.) Allesch. = Diplodia antirrhini Fautr., D. bryoniae Zimm., D. camelliae Berlèse, D. destruens Mc Alp., D. fabianae F. Tassi, D. fragmites Mont., D. harknessi Sacc., D. jasmini Celotti, D. laurina Cke et Harkn., D. celottiana Sacc., D. cowdelli B. et Br., D. depazeoides Dur. et Mont. f. arecae Mariani, D. perpusila Desm. var. centranthi Cast., D. perpusila Desm. var. ligustri, D. platani F. Tassi, D. myricae Henn. et D. Sacc., D. passeriniana Thüm., D. perpusila Desm., D. spiraeicola Ell. et Ev., D. tulostomatis Pat., Diplodiella banksiae F. Tassi, D. brassicae Grove, D. cowdelli (B. et Br.) Sacc., D. silenes Hollos, Microdiplodia alkannae Hollos, M. alni Allesch., M. alpataci Speg., M. anemopaegmae Frag., M. anthurii Trinchieri, M. bryonae (Zimm.) Sacc. et Trott., M. camelliae (Berl.) Allesch., M. capsici Sarejanni, M. triobotryae Politis, M. fabianae (Tassi) Allesch., M. frangulae Allesch., M. galliseda Sacc., M. harknessi (Sacc.) Tassi, M. heteroclita Frag., M. laurina Grove, M. myricae (Henn.) Sacc., M. celottiana (Sacc.) Allesch., M. clematidina Fautr., M. perpusila (Desm.) Tassi, M. platani (F. Tassi) Allesch., M. salicis Died., M. nyssae Allesch., M. palmarum (Cke) Died., M. passeriniana (Thüm.) Allesch., M. pegani Bubak, M. solitaria Bubak, M. sparti F. Tassi, M. spiraeicola (Ell. et Ev.) Allesch., M. subtecta Allesch., M. visci (D.C.) A. Pot. (Ch. Zambettakis), 1954, 245.

Microdiplodia perpusila (Desm.) Allesch. f. symphoricarpi Died. = Microdiplodia symphoricarpi Died. (Ch. Zambettakis), 1954, 245.

Microdiplodia phyllodiorum (Penz. et Sacc.) Tassi = Diplodia phyllodiorum Penz. et Sacc., Microdiplodia mamma Allesch., M. strelitziae Frag., M. syringae Allesch., M. tilliae Allesch. (Ch. Zambettakis), 1954, 251.

Microdiplodia ribesia Bubak (Ascochyta Sacc. et Fautr.) (Ch. Zambettakis), 1954, 339.

Microdiplodia tenaceti Allesch. (Diplodia Karst. et Harkn.) (Ch. Zambettakis), 1954, 252.

Microdiplodia tenaceti (Karst. et Harkn.) Allesch. f. oryzae Mi-

yake = Diplodiella oryzae J. Miyake (Ch. Zambettakis), 1954, 252.
Microdiplodia warburgiana (Reichert) Nattrass. (Diplodia Reichert) (Ch. Zambettakis), 1954, 257.
Nemadiplodia anomala (Mont.) Zamb. = Diplodia aegyptiaca F. Tassi, D. anomala Mont., D. arthrophylli Penz. et Sacc., D. mangiferae Koord., D. wurthui Koord., D. yerbae Speg. (Ch. Zambettakis), 1954, 227.
Nemadiplodia gongrogena (Diplodia Temme) (Ch. Zambettakis), 1954, 228.
Nemadiplodia guaranitica (Speg.) Zamb. = Botryodiplodia ulmicola (Ell. et Ev.) Quisman., Diplodia guaranitica Speg. (Ch. Zambettakis), 1954, 228.
Nemadiplodia nematospora (Sacc.) Zamb. = Diplodia decundissima Sacc., D. moringae Sacc., D. nematospora Sacc. (Ch. Zambettakis), 1954, 227.
Nemadiplodia paraphysaria (Sacc.) Zamb. = Diplodia cinchonae Koord., D. paraphysaria Sacc. (Ch. Zambettakis), 1954, 228.
Paradiplodiella Zamb. = Paradiplodia Speg., Pseudodiplodia Speg., Pseudodiplodiella Bender. (Ch. Zambettakis), 1954, 221, 320.
Paradiplodiella acinosa (Fr.) Zamb. = Botryodiplodia acinosa (Fr.) Cke, Diplodia acinosa Tul. (Ch. Zambettakis), 1954, 321.
Paradiplodiella arecae (Diplodia Massee) (Ch. Zambettakis), 1954, 322.
Paradiplodiella aurantiorum (Speg.) Zamb. = Paradiplodia aurantiorum Speg., Pseudodiplodia aurantiorum Speg., Pseudodiplodiella anrantiorum (Speg.) Bender. (Ch. Zambettakis), 1954, 321.
Paradiplodiella macrosperma (Diplodia Desm.) (Ch. Zambettakis), 1954, 322.
Paradiplodiella microspora (Diplodiopsis Sacc.) (Ch. Zambettakis), 1954, 323.
Paradiplodiella pritzeliana (Botryodiplodia P. Henn.) (Ch. Zambettakis), 1954, 322.
Pellionella cardonia (Diplodiella Flag. et Sacc.) (Ch. Zambettakis), 1954, 272.
Phaeostagonosporopsis Woronichin. = Stenocarpella Syd. (Ch. Zambettakis), 1954, 221, 336.
Phaeostagonosporopsis zeae (Schw.) Woronich. = Diplodia macrospora Earle, D. maydicola Speg., D. maydis (Berk.) Sacc., Dothiora zeae (Schw.) Lév., Hendersonia zeae (Curr.) Hazsl., Macrodiplodia zeae (Schw.) P. et S., Sphaeria striaeformis von L.D. Schw., Stenocarpella zeae Sydow (Ch. Zambettakis), 1954, 336.
Phleospora heraclei Maire = Ascoxyta heraclei Lib., Cylindrosporium hamatum Bres., Cylindrosporium heraclei (Höhn.) Ell. et Ev., Septoria heraclei Desm., Septoria heraclei-palmati Maire (R. Maire), 1930, 241.
Phyllosticta saponariae (Fuck.) Sacc. (Ascochyta Fuck.) (Dr T. Rayss), 1933, 400.
Placodiplodia Bubak = Dothideo-diplodia Muraskinsky (Ch. Zambettakis), 1954, 326.
Placodiplodia agropyri Speg. = Dothideo-diplodia agropyri Murask., Microdiplodia agropyri Unam., Paradiplodia agropyri Speg. (Ch. Zambettakis), 1954, 330.
Placodiplodia chamaeropsis (Delacr.) Zamb. = Botryodiplodia atroviolacea P. Henn., B. chamaeropsis Delacr., Diplodia chamaeropsis Cast. (Ch. Zambettakis), 1954, 327.
Placodiplodia ficina (Botryodiplodia Sydow) (Ch. Zambettakis), 1954, 328.

Placodiplodia ingae (Botryodiplodia Syd.) (Ch. Zambettakis), 1954, 329.
Placodiplodia insitiva (Botryodiplodia Ranoj.) (Ch. Zambettakis), 1954, 327.
Placodiplodia saginata (Botryodiplodia Petr.) (Ch. Zambettakis), 1954, 329.
Placodiplodia spiraeae (Botryodiplodia Oud.) (Ch. Zambettakis), 1954, 328.
Placodiplodia tanaria (Botryodiplodia Sacc.) (Ch. Zambettakis), 1954, 328.
Placodiplodia yuccae (Diplodia Speg.)(Ch. Zambettakis), 1954, 329.
Schizodiplodia Zamb. = Didymosporis F.E. Clem. et Chear., Didymosporiella Trav. et Migliardi (Ch. Zambettakis), 1954, 221, 302.
Schizodiplodia aeluropodis (Didymosporiella Trav. et Migl.) (Ch. Zambettakis), 1954, 304.
Schizodiplodia australis (Diplodia Passer.) (Ch. Zambettakis), 1954, 306.
Schizodiplodia catalpae (Diplodia Frag.) (Ch. Zambettakis), 1954, 306.
Schizodiplodia centaurae (Diplodia herbarum f. centaurae Frag.) (Ch. Zambettakis), 1954, 304.
Schizodiplodia epilobii (Brun.) Zamb. = Diplodia epilobii Brun., D. herbarum var. marrubii Brun. (Ch. Zambettakis), 1954, 304.
Schizodiplodia herbarum (Corda) Zamb. = Diplodia baccharidicola Viégas, D. caerulescens Passer., D. calycanthi (Schw.) Speg., D. camphorae F. Tassi, D. chrysanthemi F. Tassi, D. hellebori Brun., D. herbarum (Corda) Lév., D. herbarum var. compressa Mont., D. herbarum var. conyzae Brun., D. herbarum var. dianthi Sacc., D. herbarum var. lactucae Rabenh., D. herbarum var. menthae Sacc., D. herbarum var. prasiicola Tassi, D. herbarum var. trifolii ?, D. medicaginis Brun., D. menthae Sacc., D. paulowniae Cke, D. sedicola Cke et Harkn., D. yuccae West. f. asterostomoides Roum. (Ch. Zambettakis), 1954, 303.
Schizodiplodia leptodactyli (Diplodia Earle) (Ch. Zambettakis), 1954, 305.
Schizodiplodia leptospora (Diplodia Sacc.) (Ch. Zambettakis), 1954, 305.
Schizodiplodia resurgens (Diplodia Cke et Harkn.) (Ch. Zambettakis), 1954, 305.
Septoria dubia Sacc. et Sydow = Septoria quercina Fautr. (Dr T. Rayss), 1946, 201.
Sphaeropsis asterici (Diplodia et Microdiplodia Pat.) (Ch. Zambettakis), 1954, 340.
Sphaeropsis auwata (Diplodia Lév.) (Ch. Zambettakis), 1954, 340.
Sphaeropsis bexleyana (Diplodia ?) (Ch. Zambettakis), 1954, 340.
Sphaeropsis caryae (Diplodia Cke et Ell.) (Ch. Zambettakis), 1954, 340.
Sphaeropsis desmodiicola (Microdiplodia Frag.) (Ch. Zambettakis), 1954, 340.
Sphaeropsis erinaceae (Microdiplodia ?) (Ch. Zambettakis), 1954, 340.
Sphaeropsis hassani (Diplodia Unam.) (Ch. Zambettakis), 1954, 340.
Sphaeropsis hederaecola (Diplodia de Not.) (Ch. Zambettakis), 1954, 340.
Sphaeropsis linariae (Diplodia Rabenh.) (Ch. Zambettakis), 1954, 340.

Sphaeropsis mamillaris (Diplodia B. et E.) (Ch. Zambettakis), 1954, 340.
Sphaeropsis spinulosa (Diplodia P. Henn.) (Ch. Zambettakis), 1954, 341.
Stagonospora sexseptata Trail. = Stagonospora aquatica Sacc. var. sexseptata Trail. (A.L. Guyot), 1946, 78.
Striodiplodia agaves (Niessl.) Zamb. = Diplodia agaves Niessl., Microdiplodia agaves (Niessl.) Tassi (Ch. Zambettakis), 1954, 334.
Striodiplodia palmarum (Cke) Zamb. = Botryodiplodia palmarum (Cke) Patr. et Syd., Diplodia palmarum (Cke) Wr., Macrophoma palmarum Berl. et Vogel., Phoma palmarum Sacc. (Ch. Zambettakis), 1954, 335.
Striodiplodia striata (Diplodia F. Tassi) (Ch. Zambettakis), 1954, 335.
Strionemadiplodia cactorum (Diplodia Speg.) (Ch. Zambettakis), 1954, 234.
Strionemadiplodia frumenti (Ell. et Ev.) Zamb. = Diplodia frumenti Ell. et Ev., D. natalensis P. Evans, D. orchidea B., Diplodiella striispore Ell. et Barth., Pellionella macrostoma Spenser. (Ch. Zambettakis), 1954, 234.
Strionemadiplodia phoenicum (Sacc.) Zamb. = Diplodia phoenicum (Sacc.) Faucett., Macrophoma phoenicum (Fautr.) Sacc. (Ch. Zambettakis), 1954, 235.
Syndiplodia hypoxyloidea (Cke) Zamb. = Botryodiplodia gleditschiae Berl., B. hypoxyloidea (Cke) Sacc., B. sycina Sacc., Diplodia hypoxyloidea Cke (Ch. Zambettakis), 1954, 325.
Syndiplodia loculata (Mont.) Zamb. = Botryodiplodia aterrina Scalia., B. gigantea Berk., D. loculata (Mont.) Sacc., B. moringae Sacc., B. nerii Syd., Diplodia loculata Mont. (Ch. Zambettakis), 1954, 325.
Syndiplodia robiniae (Diplodiopsis Dearn. et Barth.) (Ch. Zambettakis), 1954, 326.
Synnemadiplodia fiorii (Bacc.) Zamb. = Botryodiplodia filigera Sacc., Lasiodiplodia fiorii Bacc. (Ch. Zambettakis), 1954, 232.
Synnemadiplodia marantae (Speg.) Zamb. = Botryodiplodia marantae Speg., B. persicae Died. (Ch. Zambettakis), 1954, 232.
Synnemadiplodia morina (Syd.) Zamb. = Diplodia morina Syd. (Ch. Zambettakis), 1954, 232.
Synnemadiplodia mutans (Diplodia Speg.) (Ch. Zambettakis), 1954, 231.
Synnemadiplodia nutans (Diplodia Speg.) (Ch. Zambettakis), 1954, 231.

MYCELIA STERILIA

Overeemia glomerelae (Overeem) = Clasterosporium glomerelae Overeem, Hormiscium pithyophilum (Wallr.) Sacc. var. myrmecophilum Bayliss. Elliott (G. Arnaud), 1953, 300.

Acrotrixis actinostoma (Pers.) Trevi.= Diploschistes actinostomus Zahlbr., Lumboria actinostoma Mass., Urceolaria actinostoma Persoon (M. Choisy), 1954, 164 et 179.

Acrotrixis corrosa Trevis. = Lumboria corrosa Koerber, Microglaena corrosa Arnold, Zahlbr. (M. Choisy), 1954, 179.

Amphoridium section Placidium Massal. = Dermatocarpon Mann. non Eschweiler; section Enthosthelia (Wallroth) Stizenb. = Rhodocarpon Lönnr. ; section Endopyrenium (Flotow) Stizenb. = Placidium Mass. ; section Euamphoridium Choisy = Amphoridium Mass., Verrucaria sect. Amphoridium Müll.-Arg., Zahlbr. (M. Choisy), 1954, 179.

Baeomyces roseus Pers. = Leotia batailleana Bres. (Mme Le Gal), 1946, 50.

Dermatiocum viride Zahlbruckner = Endocarpon thunbergii Ach. (M. Choisy), 1954, 169.

Dermatocarpon weberi (Humboldt) Mann. = Dermatocarpon aquaticum (Weis.) Zahlbr. (M. Choisy), 1954, 171.

Dermatocarpon tephroides (Ach.) Mann. = Dermatocarpon cinereum (Pers.) Th. Fr. (M. Choisy), 1954, 171.

Endocarpon section Leightonia Trevisano = Dermatocarpon Eschweiler ; section Pyrenothamnia Duckermann = Pyrenothamnia Duck., Zahlbr. ; section Staurothele (Norm.) Stizenb. = Staurothele (Norm.) Zahlbr. (M. Choisy), 1954, 175.

Gyrophora Ach. section Actinogyra Schol. (M. Choisy), 1952, 145. Section Psychophora = Omphalodiscus sect. Decussatae Schol. (M. Choisy), 1952, 145.

Gyrophoropsis Elen. et Sav. section Spadochroae Schol. (M. Choisy) 1952, 145.

Heppia desmazierii (Mont.) Tuck. = Endocarpon urceolatum Schaerer.

Heppia guepini (Del.) Nyl., ap. Hue = Endocarpon guepini Delise ap. Duby, Endocarpon leptophyllum var. polyphyllum Wallroth., Endocarpon maravignae Tornabene, Dermatocarpon guepini Tuck.

Heppia lacinlata (Bagl. et Car.) Lettau = Endocarpon lacinlatum (Bagl. et Car.).

Heppia reticulata (Duf.) Nyl. = Endocarpon reticulatum Duf. ap. Fr.

Heppia turgida Nyl. ap. Hue = Endocarpon turgidum Ach. (M. Choisy), 1954, 169.

Involucrocarpon Servit.emend. Choisy : section Eninvolucrocarpon Choisy = Involucrocarpon Servit.; section Eschackea Choisy = Verrucaria sect. Euverrucaria Koerber, Zahlbr. em. Servit. (M. Choisy), 1954, 178.

Microglaena Koerb. section Dumicroglaena Jatta : sous-section Chromatochlamys (Trevisani) Choisy = Microglaena Koerb., Zahlbr. p. max. parte ; sous-section Acrotrixis (Trev.) Choisy ; section Gongylia (Koerber) Choisy (M. Choisy), 1954, 176.

Omphalodium Mey. et Flot. emend. Rabenh. section Agyrophora Nyl. (M. Choisy), 1952, 147.

Phyllisoum demangeonii Nyl. = Endocarpon phyllisoum Wahlen. ap. Ach. (M. Choisy), 1954, 169.

Placidiopsis Beltr. section Endocarpidium (Müll.-Arg.) Choisy ; sous-section Agonimia Zahlbr. Choisy ; section Bonleria (Trevisano) Choisy ; sous-section Amphoroblastia (Servit.) Choisy ; sous-section Euthelidium Choisy = Thelidium Mass. (M. Choisy), 1954, 178.

Polybastia Massee, Ricerc., Auton. : section Eupolybastia Jatta emend. Choisy ; section Involucrothele Servit., Choisy ; sous-section Paraplacidiopsis Servit., Choisy = Paraplacidiopsis Servit. ; sous-section Euinvolucrothele Choisy = Involucrothele Servit. (M. Choisy), 1954, 177.

Thrombium bacillare Wallroth = Leptogium schraderi (Bernh.) Nyl. (M. Choisy), 1954, 173.

Thrombium epigaeum (Pers.) Wallr. = Verrucaria epigaea Ach., Inoderma epigaea S. Gray (M. Choisy), 1954, 173.

Thrombium glaciale Wallr. = Lichina pygmaea (Lightf.) A.C. Agardh. (M. Choisy), 1954, 173.

Thrombium insculptum Wallr. = Arthonia byssacea Almquist, Verrucaria byssacea (Weigel) Ach. (M. Choisy), 1954, 173.

Thrombium spongiosum Wallr. = Verrucaria spongiosa Ach., Leptogium tenuissimum (Dicks.) Fr. (M. Choisy), 1954, 173.

Umbilicaria Hoffm. emend. non Llano. : section Agyrophoropsis Choisy = Agyrophora section Dichroae Llano. (M. Choisy), 1952, 145.

TABLE RECAPITULATIVE

Pages

Table alphabétique des auteurs de notes et mémoires 1

Table des matières, genres et espèces.
Table des flores régionales 24
Table des articles généraux 27
Empoisonnements et traitements 29

Myxomycètes 30
Exosporées 30
Endosporées. I, Amaurosporales calcariées 30
II, Amaurosporales acalcariées 32
III, Lamprosporales. A, Aneminées 32
B, Caloneminées . . 33
Phycomycètes ou Siphomycètes 34
A, Uniflagellés 34
B, Biflagellés 34
Ascomycètes 36
I, Levures 37
II, Pyrénomycètes, Sphériales, etc. 37
III, Erysiphales 38
IV, Discomycètes 39
V, Ascomycètes hypogés ou Tubérales 40
VI, Taphrinales ou Exoascales 40
VII, Laboulbéniales 41
Ustilaginales 41
Urédinales 42
A, Mélampsoracées 43
B, Coleosporiacées 43
C, Cronartiacées 43
D, Pucciniacées 44
I, Auriculariacées 48
II, Tremellacées 49
III, Tulasnellacées 49
IV, Calocéracées = Dacrymycétacées 49
V, Exobasidiacées 49
VI, Aphyllophorales.
Groupe 1, Clavariacées 49
Groupe 2, Porohydnés. A, Corticiés 50
B, Asterostromés 53
C, Hydnés 53
D, Phylactériés 54
E, Porés 54
Bolétacées. A, Bolétacées porées 62
B, Bolétacées lamellées 63
Agaricales 63
Cantharellacées 63
Hygrophoracées 63

Pleurotacées 64
Marasmiacées 65
Tricholomacées.
A, Tricholomées 66
B, Lyophyllées 68
C, Orcellées 68
Rhodophyllacées 68
Naucoriacées.
A, Cortinariées 69
B, Géophilées 75
C, Bolbitiées 76
Coprinacées 76
Lépiotacées 77
Volvariacées 79
Amanitacées 79
Russulacées 79
Gastéromycètes 85
Adelomycètes ou Hyphomycètes ou Fungi Imperfecti 96
Hyphales ou Moliniales.
A, Mucédinées 86
B, Dématiées 88
Mélanconiales 90
Sphaerioïdales ou Sphaeropsidales 91
Lycelia sterilia 95
Lichens 95

Table des planches et des figures. 97
Myxomycètes. Chytrydiales 97
Phycomycètes 98
Ascomycètes. Levures 98
Discomycètes. Discales 98
Pyrénomycètes.
Sphériales 101
Erysiphales 102
Laboulbéniales 102
Ustilaginales 102
Urédinales 103
Auriculariacées 105
Trémellacées 105
Calocéracées 105
Aphyllophorales 105
Bolétacées 111
Agaricacées 112
Russulacées 122
Gastéromycètes 124
Fungi Imperfecti (Adélomycètes) 125
Lichens 131

Atlas. Planches I à C 131
Classement chronologique 136

Table des synonymies et des combinaisons nouvelles.
Myxomycètes. Endosporées
I, Amaurosporales calcariées 139
II, Amaurosporales acalcariées 140
III, Lamprosporales 140
Phycomycètes ou Siphomycètes 140
Ascomycètes.
Levures 141

Pyrénomycètes, Sphériales, Erysiphales, Exoascales . . . 142
Discomycètes 143
Basidiomycètes.
Ustilaginales 144
Urédinales.
Mélampsoracées, Coléosporiacées, Cronartiacées . . . 146
Pucciniacées 146
Trémellacées 148
Tulasnellacées 148
Aphyllophorales.
Clavariacées 149
Porohydnées.
A, Corticiés 149
B, Hydnés 151
C, Phylactériés 151
D, Porés 152
Bolétacées.
A, Porées 153
B, Lamellées 154
Agaricales.
Cantharellacées 155
Hygrophoracées 155
Pleurotacées 155
Marasmiacées 156
Tricholomacées.
A, Tricholomées 158
B, Lyophyllées 160
C, Orcellées 160
Rhodophyllacées 160
Naucoriacées.
A, Cortinariées 161
B, Géophilées 168
C, Bolbitiées 168
Coprinacées 169
Lépiotacées 169
Volvariacées 170
Amanitacées 171
Russulacées 172
Gastéromycètes 176
Adelomycètes ou Hyphomycètes ou Fungi Imperfecti .
Hyphales ou Moliniales.
A, Mucédinées 177
B, Dématiées 177
Mélanconiales 178
Sphaerioïdales ou Sphaeropsidales 179
Mycelia sterilia 195
Lichens 196

Achevé d'imprimer le 28 Avril 1972
Directeur de la publication : P.JOLY
Dépôt légal 2º trimestre 1972